

费定晖 周学圣编演  
郭大钧 邵品琮主审

Б. П. 吉米多维奇  
Б. П. ДЕМИДОВИЧ

数学分析  
习题集题解

山东科学技术出版社



Б. П. 吉米多维奇

# 数学分析习题集题解

(一)

费定晖 周学圣 编演  
郭大钧 邵品琮 主审

山东科学技术出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

B. П. 吉米多维奇数学分析习题集题解 (1)/费定晖编. —2 版—济南: 山东科学技术出版社, 1999. 9  
ISBN 7-5331-0099-9

I. Б… II. 费… III. 数学分析-高等学校-解题 IV. O  
17-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 43960 号

B. П. 吉米多维奇  
**数学分析习题集题解**  
(一)

费定晖 周学圣 编演  
郭大钧 邵品琮 主审

山东科学技术出版社出版  
山东省新华书店发行  
山东莒县印刷厂印刷

787mm×1092mm 32 开本 15·125 印张 331 千字

1999 年 11 月第 2 版第 8 次印刷

印数: 212 601—222 600

ISBN 7—5331—0099—9  
0·5 定价: 13.30 元

## 出版说明

吉米多维奇(Б. П. ДЕМИДОВИЧ)著《数学分析习题集》一书的中译本,自50年代初在我国翻译出版以来,引起了全国各大专院校广大师生的巨大反响。凡从事数学分析教学的师生,常以试解该习题集中的习题,作为检验掌握数学分析基本知识和基本技能的一项重要手段。二十多年来,对我国数学分析的教学工作是甚为有益的。

该书四千多道习题,数量多,内容丰富,由浅入深,部分题目难度大。涉及的内容有函数与极限,单变量函数的微分学,不定积分,定积分,级数,多变量函数的微分学,带参变量积分以及重积分与曲线积分、曲面积分等等,概括了数学分析的全部主题。当前,我国广大读者,特别是肯于刻苦自学的广大数学爱好者,在为四个现代化而勤奋学习的热潮中,迫切需要对一些疑难习题有一个较明确的回答。有鉴于此,我们特约作者,将全书4462题的所有解答汇辑成书,共分六册出版。本书可以作为高等院校的教学参考用书,同时也可为广大读者在自学微积分过程中的参考用书。

众所周知,原习题集,题多难度大,其中不少习题如果认真习作的话,既可以深刻地巩固我们所学到的基本概念,又可以有效地提高我们的运算能力,特别是有些难题还可以迫使我们学会综合分析的思维方法。正由于这样,我们殷切期望初学数学分析的青年读者,一定要刻苦钻研,千万不要轻易查抄本书的解答,因为任何削弱独立思索的作法,都是违背我们出

版此书的本意。何况所作解答并非一定标准，仅作参考而已。如有某些误解、差错也在所难免，一经发觉，恳请指正，不胜感谢。

本书蒙潘承洞教授对部分难题进行了审校。特请郭大钧教授、邵品琮教授对全书作了重要仔细的审校。其中相当数量的难度大的题，都是郭大钧、邵品琮亲自作的解答。

参加本册审校工作的还有楼世拓、姚琦、陈兆寬同志。

参加编演工作的还有黃春朝同志。

本书在编审过程中，还得到山东大学、山东工业大学、山东师范大学和曲阜师范大学的领导和同志们的大力支持，特在此一并致谢。

# 目 录

<b>第一章 分析引论</b>	<b>1</b>
§ 1. 实数	1
§ 2. 叙列的理论	25
§ 3. 函数的概念	95
§ 4. 函数的图形表示法	128
§ 5. 函数的极限	226
§ 6. 函数无穷小和无穷大的阶	357
§ 7. 函数的连续性	375
§ 8. 反函数, 用参数表示的函数	425
§ 9. 函数的一致连续性	444
§ 10. 函数方程	463

# 第一章 分析引论

## § 1. 实 数

1° 数学归纳法 为了证明某定理对任意的自然数  $n$  为真, 只须证明下面两点就够了:(1) 这定理对  $n = 1$  为真,(2) 设这定理对任何一个自然数  $n$  为真, 则它对其次的一自然数  $n + 1$  也为真.

2° 分割 假设分有理数为  $A$  和  $B$  两类, 使其满足于下列条件:(1) 两类均非空集,(2) 每一个有理数必属于一类, 且仅属于一类,(3) 属于  $A$  类(下类) 的任一数小于属于  $B$  类(上类) 的任何数, 这样的一个分类法称为分割.(a) 若或是下类  $A$  有最大的数, 或是上类  $B$  有最小的数, 则分割  $A/B$  确定一个有理数.(b) 若  $A$  类无最大数, 而  $B$  类亦无最小数, 则分割  $A/B$  确定一个无理数. 有理数和无理数统称为实数\*

3° 绝对值 假若  $x$  为实数, 则用下列条件所确定的非负数  $|x|$ , 称为  $x$  的绝对值:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{若 } x \geq 0 \\ -x, & \text{若 } x < 0. \end{cases}$$

对于任何的实数  $x$  和  $y$ , 有以下的不等式成立:

$$|x| - |y| \leq |x + y| \leq |x| + |y|.$$

4° 上确界和下确界 设  $X = \{x\}$  为实数的有界集合. 若:

\* 以后若没有相反的附带说明, 数这个字我们将理解为实数.

(1) 每一个  $x \in X^*$  满足不等式

$$x \geq m;$$

(2) 对于任何的  $\epsilon > 0$ , 存在有  $x' \in X$ , 使

$$x' < m + \epsilon,$$

则数  $m = \inf\{x\}$  称为集合  $X$  的下确界.

同样, 若:

(1) 每一个  $x \in X$  满足不等式

$$x \leq M,$$

(2) 对于任何的  $\epsilon > 0$ , 存在有  $x'' \in X$ , 使

$$x'' > M - \epsilon,$$

则数  $M = \sup\{x\}$  称为集合  $X$  的上确界.

若集合  $X$  下方无界, 则通常说

$$\inf\{x\} = -\infty;$$

若集合  $X$  上方无界, 则认为

$$\sup\{x\} = +\infty.$$

5° 绝对误差和相对误差 设  $a (a \neq 0)$  是被测的量的准确数值, 而  $x$  是这个量的近似值, 则

$$\Delta = |x - a|$$

称为绝对误差, 而

$$\delta = \frac{\Delta}{|a|}$$

称为被测的量的相对误差.

假若  $x$  的绝对误差不超过它的第  $n$  个有效数字的单位的一半, 则说  $x$  有  $n$  位准确的数字.

利用数学归纳法求证下列等式对任何自然数  $n$  皆成立:

1.  $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$

---

\* 符号  $x \in X$  表示  $x$  属于集合  $X$ .

证 当  $n = 1$  时, 等式成立.

设对于  $n = k$  (自然数) 时, 等式成立, 即

$$1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2},$$

则对于  $n = k + 1$  时, 有

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \cdots + k + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + k + 1 \\ &= \frac{(k+1)[(k+1)+1]}{2}, \end{aligned}$$

即对于  $n = k + 1$  时等式也成立.

于是, 由数学归纳法知, 对于任何自然数  $n$ , 有

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

2.  $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$

证 当  $n = 1$  时, 等式成立.

设  $n = k$  时, 等式成立, 即

$$1^2 + 2^2 + \cdots + k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6},$$

则对于  $n = k + 1$  时, 有

$$\begin{aligned} 1^2 + 2^2 + \cdots + k^2 + (k+1)^2 &= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 \\ &= \frac{1}{6}(k+1)[k(2k+1) + 6(k+1)] \\ &= \frac{(k+1)[(k+1)+1](2(k+1)+1)}{6}, \end{aligned}$$

即对于  $n = k + 1$ , 时等式也成立.

于是, 对于任何自然数  $n$ , 有

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

$$3. \quad 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = (1 + 2 + \cdots + n)^2.$$

证 当  $n = 1$  时, 等式成立.

设  $n = k$  时, 等式成立, 即

$$1^3 + 2^3 + \cdots + k^3 = (1 + 2 + \cdots + k)^2,$$

则对于  $n = k + 1$  时, 有

$$\begin{aligned} & 1^3 + 2^3 + \cdots + k^3 + (k+1)^3 \\ &= (1 + 2 + \cdots + k)^2 + (k+1)^3 \\ &= \frac{k^2(k+1)^2}{4} + (k+1)^3 \\ &= \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \\ &= \left\{ \frac{(k+1)[(k+1)+1]}{2} \right\}^2 \\ &= [1 + 2 + \cdots + (k+1)]^2, \end{aligned}$$

即对于  $n = k + 1$  时, 等式也成立.

于是, 对于任何自然数  $n$ , 有

$$1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = (1 + 2 + \cdots + n)^2.$$

$$4. \quad 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1.$$

证 当  $n = 1$  时, 等式成立.

设  $n = k$  时, 等式成立, 即

$$1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{k-1} = 2^k - 1,$$

则对于  $n = k + 1$  时, 有

$$\begin{aligned} & 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{k-1} + 2^k \\ &= (2^k - 1) + 2^k = 2^{k+1} - 1, \end{aligned}$$

即对于  $n = k + 1$  时, 等式也成立.

于是, 对于任何自然数  $n$ , 有

$$1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1.$$

5. 设  $a^{(n)} = a(a - h) \cdots [a - (n - 1)h]$  及  $a^{(0)} = 1$ , 求证

$$(a + b)^{(n)} = \sum_{m=0}^n C_n^m a^{(n-m)} b^{(m)},$$

其中  $C_n^m$  是由  $n$  个元素中选取  $m$  个的组合数, 由此推出牛顿的二项式公式.

证 当  $n = 1$  时, 由于

$$(a + b)^{(1)} = a + b$$

$$\text{及 } \sum_{m=0}^1 C_1^m a^{(1-m)} b^{(m)} = a + b,$$

所以等式成立.

设  $n = k$  时, 等式成立, 即

$$(a + b)^{(k)} = \sum_{m=0}^k C_k^m a^{(k-m)} b^{(m)}, \quad (1)$$

则对于  $n = k + 1$  时, 有

$$(a + b)^{(k+1)} = (a + b)^{(k)} \cdot (a + b - kh). \quad (2)$$

将(1)式代入(2)式得

$$\begin{aligned} (a + b)^{(k+1)} &= (a + b - kh) \cdot \sum_{m=0}^k C_k^m a^{(k-m)} b^{(m)} \\ &= (a + b - kh) \{ C_k^0 a^{(0)} b^{(0)} + C_k^1 a^{(k-1)} b^{(1)} \\ &\quad + \cdots + C_k^k a^{(0)} b^{(k)} \} \\ &= \{ (a - kh) + b \} C_k^0 a^{(0)} b^{(0)} \\ &\quad + \{ [a - (k-1)h] + (b - h) \} C_k^1 a^{(k-1)} b^{(1)} \\ &\quad + \cdots + \{ a + (b - kh) \} C_k^k a^{(0)} b^{(k)} \\ &= C_k^0 a^{(k+1)} b^{(0)} + C_k^1 a^{(k)} b^{(1)} + C_k^2 a^{(k-1)} b^{(2)} \\ &\quad + C_k^3 a^{(k-2)} b^{(3)} + \cdots + C_k^k a^{(1)} b^{(k)} \\ &\quad + C_k^{k+1} a^{(0)} b^{(k+1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= C_{k+1}^0 a^{(k+1)} b^{(0)} + (C_k^0 + C_k^1) a^{(k)} b^{(1)} \\
&\quad + \cdots + (C_k^{k-1} + C_k^k) a^{(1)} b^{(k)} + C_{k+1}^{k+1} a^{(0)} b^{(k+1)} \\
&= C_{k+1}^0 a^{(k+1)} b^{(0)} + (C_{k+1}^0 a^{(k)} b^{(1)} \\
&\quad + \cdots + C_{k+1}^k a^{(1)} b^{(k)}) + C_{k+1}^{k+1} a^{(0)} b^{(k+1)} \\
&= \sum_{m=0}^{k+1} C_{k+1}^m a^{(k+1-m)} b^{(m)},
\end{aligned}$$

故由  $(a+b)^{(k)} = \sum_{m=0}^k C_k^m a^{(k-m)} b^{(m)}$  可推得下式成立：

$$(a+b)^{(k+1)} = \sum_{m=0}^{k+1} C_{k+1}^m a^{(k+1-m)} b^{(m)},$$

即对于  $n = k+1$  时，等式也成立。

于是，对于任何自然数  $n$ ，有

$$(a+b)^{(n)} = \sum_{m=0}^n C_n^m a^{(n-m)} b^{(m)}. \quad (3)$$

在式子

$$a^{(n)} = a(a-h)\cdots(a-(n-1)h)$$

中，令  $h = 0$ ，即得

$$a^{(n)} = a^n. \quad (4)$$

将(4)式代入(3)式，得牛顿二项式公式

$$(a+b)^n = \sum_{m=0}^n C_n^m a^{n-m} b^m.$$

## 6. 证明贝努里不等式

$$(1+x_1)(1+x_2)\cdots(1+x_n) \geq 1+x_1+x_2+\cdots+x_n.$$

式中  $x_1, x_2, \dots, x_n$  是符号相同且大于  $-1$  的数。

证 当  $n = 1$  时，此式取等号。

设  $n = k$  时，不等式成立，即

$(1+x_1)(1+x_2)\cdots(1+x_k) \geq 1+x_1+x_2+\cdots+x_k$ ,

则对于  $n = k+1$  时, 由于  $x_i (i=1, 2, \dots, n)$  大于  $-1$ ,  
所以  $1+x_i > 0$ . 因而有

$$\begin{aligned} &(1+x_1)(1+x_2)\cdots(1+x_k)(1+x_{k+1}) \\ &\geq (1+x_1+x_2+\cdots+x_k)(1+x_{k+1}) \\ &= (1+x_1+x_2+\cdots+x_k+x_{k+1}) \\ &\quad + (x_1x_{k+1}+x_2x_{k+1}+\cdots+x_kx_{k+1}). \end{aligned}$$

由于  $x_i x_j \geq 0$ , 所以

$$\begin{aligned} &(1+x_1)(1+x_2)\cdots(1+x_{k+1}) \\ &\geq 1+x_1+x_2+\cdots+x_{k+1}, \end{aligned}$$

即对于  $n = k+1$  时, 不等式也成立,

于是, 对于任何自然数  $n$ , 有

$$\begin{aligned} &(1+x_1)(1+x_2)\cdots(1+x_n) \\ &\geq 1+x_1+x_2+\cdots+x_n. \end{aligned}$$

### 7. 证明若 $x > -1$ , 则不等式

$$(1+x)^n \geq 1+nx \quad (n > 1)$$

为真, 且仅当  $x = 0$  时, 等号成立.

证 只要在 6 题的贝努里不等式中, 设

$$x_i = x \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

即得证

$$(1+x)^n \geq 1+nx,$$

从 6 题的证明过程中看出, 仅当  $x = 0$  时, 上式才取等号.

### 8. 证明不等式

$$n! < \left(\frac{n+1}{2}\right)^n \quad \text{当 } n > 1.$$

**证** 当  $n = 2$ , 因为  $\left(\frac{2+1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} > 2 = 2!$ , 故不等式成立.

设  $n = k$  时, 不等式成立, 则

$$k! < \left(\frac{k+1}{2}\right)^k,$$

则对于  $n = k + 1$  时, 有

$$(k+1)! < \left(\frac{k+1}{2}\right)^k (k+1) = 2 \left(\frac{k+1}{2}\right)^{k+1}.$$

由于

$$\left(\frac{k+2}{k+1}\right)^{k+1} = \left(1 + \frac{1}{k+1}\right)^{k+1} > 2 (k = 1, 2, \dots),$$

从而有

$$(k+1)! < \left[\frac{(k+1)+1}{2}\right]^{k+1},$$

即对于  $n = k + 1$  时, 不等式也成立.

于是, 对于任何自然数  $n$ , 有

$$n! < \left(\frac{n+1}{2}\right)^n.$$

## 9. 证明不等式

$$2! \cdot 4! \cdots (2n)! > [(n+1)!]^n \quad \text{当 } n > 1.$$

**证** 当  $n = 2$  时, 因为  $2! \cdot 4! = 48$ , 及  $[(2+1)!]^2 = 36$ , 所以,  $2! \cdot 4! > [(2+1)!]^2$ , 故不等式成立.

设  $n = k$  时, 不等式成立, 即

$$2! \cdot 4! \cdots (2k)! > [(k+1)!]^k,$$

则对于  $n = k + 1$  时, 有

$$2! \cdot 4! \cdots (2k+2)! > [(k+1)!]^k k(2k+2)!,$$

$= [(k+1)!]^{k+1}(k+2)(k+3)\cdots(2k+2)$   
 $> [(k+1)!]^{k+1}(k+2)^{k+1} = [(k+2)!]^{k+1},$   
 即对于  $n = k+1$  时, 不等式也成立. 于是, 据归纳法原理, 本题证毕.

### 10. 证明不等式

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}.$$

证 当  $n=1$  时, 因为  $\frac{1}{2} < \frac{1}{\sqrt{3}}$ , 不等式显然成立.

设  $n=k$  时, 不等式成立, 即

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2k-1}{2k} < \frac{1}{\sqrt{2k+1}}.$$

对于  $n=k+1$  而言, 由于

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2k+1}{2k+2} &< \frac{1}{\sqrt{2k+1}} \cdot \frac{2k+1}{2k+2} \\
 &= \frac{\sqrt{2k+1}}{2k+2},
 \end{aligned}$$

故只要证

$$\frac{\sqrt{2k+1}}{2k+2} < \frac{1}{\sqrt{2k+3}},$$

即证  $(2k+1)(2k+3) < (2k+2)^2$ ,

而上述不等式由于

$$4k^2 + 8k + 3 < 4k^2 + 8k + 4,$$

因而是成立的. 于是, 最后得

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2k+1}{2k+2} < \frac{1}{\sqrt{2k+3}},$$

即对于  $n=k+1$  时, 不等式也成立. 由归纳法证毕.

11. 设  $c$  为正整数, 而不为整数的平方, 且  $A/B$  为确定实数  $\sqrt{c}$  的分割, 其中  $B$  类包含所有合于  $b^2 > c$  的正有理数  $b$ , 而  $A$  类包含所有其余的有理数. 求证在  $A$  类中无最大数, 而在  $B$  类中也无最小数.

证 设  $a \in A$ . 若  $a \leq 0$ , 则显然存在  $a' > a$  ( $a' > 0$ ) 且  $a' \in A$ . 故可设  $a > 0$ , 于是  $a^2 \leq c$ . 但不可能有  $a^2 = c$ . 因若  $a^2 = c$ , 设  $a = \frac{p}{q}$ ,  $p$  与  $q$  为互质的正整数, 则  $\frac{p^2}{q^2} = c$ . 由于  $c$  是正整数, 而  $p^2$  与  $q^2$  也是互质的, 故必  $q = 1$ , 从而  $c = p^2$ , 此与假定矛盾, 故必  $a^2 < c$ . 下面我们证明, 存在正整数  $n$ , 使

$$\left(a + \frac{1}{n}\right)^2 < c,$$

于是  $a + \frac{1}{n}$  也属于  $A$ .

上述不等式相当于:

$$a^2 + \frac{2a}{n} + \frac{1}{n^2} < c, \quad \frac{2a}{n} + \frac{1}{n^2} < c - a^2,$$

若  $n$  满足不等式

$$\frac{2a+1}{n} < c - a^2,$$

则上面的第二个不等式也自然能满足了.

为此, 只要取

$$n > \frac{2a+1}{c-a^2},$$

而这是恒为可能的. 因此, 不论  $a$  为  $A$  类内的怎样的数, 在  $A$  类内总能找到大于它的数, 故  $A$  类中无最大数.

同法可证  $B$  类中也无最小数.

实质上, 此处分割  $A/B$  确定了一个无理数  $\sqrt{c}$ .

12. 确定数  $\sqrt[3]{2}$  的分割  $A/B$  用下面的方法来作成:  $A$  类包含所有的有理数  $a$ , 而  $a^3 < 2$ ;  $B$  类包含所有其余的有理数. 证明在  $A$  类中无最大数, 而在  $B$  类中也无最小数.

证 设  $a \in A$ , 即  $a^3 < 2$ . 下证必可取正整数  $n$ , 使

$$\left(a + \frac{1}{n}\right)^3 < 2.$$

事实上, 上式相当于  $\frac{3a^2}{n} + \frac{3a}{n^2} + \frac{1}{n^3} < 2 - a^3$ . 若  $a \leq 0$ , 取  $n = 1$  即可. 若  $a > 0$ , 注意到  $n \geq 1$ , 即知若取  $n$  充分大, 使  $n > \frac{3a^2 + 3a + 1}{2 - a^3}$ , 则上列各式均成立. 从而  $a + \frac{1}{n} \in A$ . 故  $A$  中无最大数.

下设  $b \in B$ , 则  $b^3 \geq 2$ . 下证不可能有  $b^3 = 2$ . 事实上, 若  $b^3 = 2$ , 设  $b = \frac{p}{q}$ ,  $p$  与  $q$  为互质的正整数, 则  $\frac{p^3}{q^3} = 2$ ,  $p^3 = 2q^3$ , 从而  $p^3$  为偶数, 因此  $p$  必为偶数:  $p = 2r$ ,  $r$  为正整数. 由于  $q$  与  $p$  是互质的, 故  $q$  必为奇数, 从而  $q^3$  也为奇数. 但  $q^3 = 4r^3$ , 故  $q^3$  又必是偶数, 因此矛盾. 由此可知必有  $b^3 > 2$ . 仿前面之证, 可取正整数  $n$ , 使  $\left(b - \frac{1}{n}\right)^3 > 2$ , 从而  $b - \frac{1}{n} \in B$ . 由此可知  $B$  类中无最小数. 实质上, 此处分割  $A/B$  确定了一个无理数  $\sqrt[3]{2}$ .

13. 作出适当的分割, 然后证明等式:

$$(a) \sqrt{2} + \sqrt{8} = \sqrt{18};$$

$$(b) \sqrt{2} \sqrt{3} = \sqrt{6}.$$

证 (a) 作确定  $\sqrt{2}$  的分割  $A/B$ : 一切有理数  $a \leq 0$  以及满足  $a^2 < 2$  的正有理数  $a$  都归于  $A$  类, 一切满足  $b^2 > 2$  的

正有理数  $b$  归入  $B$  类. 又作确定  $\sqrt{8}$  的分割  $A'/B'$ : 一切有理数  $a' \leq 0$  以及满足  $a'^2 < 8$  的正有理数  $a'$  归入  $A'$  类, 一切满足  $b'^2 > 8$  的正有理数  $b'$  归入  $B'$  类. 我们知道, 根据实数加法的定义, 满足不等式.

$$a + a' < c < b + b' \quad (\text{对任何 } a \in A, b \in B, a' \in A', b' \in B')$$

的唯一实数  $c$  就是  $\sqrt{2} + \sqrt{8}$ . 因此, 如果我们能证明恒有  $(a + a')^2 < 18$  (当  $a + a' > 0$  时),  $(b + b')^2 > 18$ , 则有  $a + a' < \sqrt{18} < b + b'$ . 于是得知  $\sqrt{18} = c = \sqrt{2} + \sqrt{8}$ .

若  $a + a' > 0$ , 则  $a$  与  $a'$  中至少有一个为正, 从而由  $a^2 a'^2 < 16$  知  $aa' < 4$ , 从而  $(a + a')^2 = a^2 + a'^2 + 2aa' < 2 + 8 + 8 = 18$ ; 同样, 因  $b^2 > 2, b'^2 > 8, b > 0, b' > 0$ , 故  $b^2 b'^2 > 16, bb' > 4, (b + b')^2 = b^2 + b'^2 + 2bb' > 2 + 8 + 8 = 18$ . 于是证毕.

(6) 作确定  $\sqrt{2}$  的分割  $A/B$  如(a) 中所示, 再作确定  $\sqrt{3}$  的分割  $A_1/B_1$ : 一切有理数  $a_1 \leq 0$  以及满足  $a_1^2 < 3$  的正有理数  $a_1$  归入  $A_1$  类, 一切满足  $b_1^2 > 3$  的正有理数  $b_1$  归入  $B_1$  类. 根据实数乘法的定义, 满足

$$aa_1 < c_1 < bb_1 \quad (\text{对任何 } a \in A, a > 0, a_1 \in A_1, a_1 > 0, b \in B, b_1 \in B_1)$$

的(正) 实数  $c_1$  存在唯一, 它就是  $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}$ . 但由于当  $a \in A, a > 0, a_1 \in A_1, a_1 > 0$  时  $(aa_1)^2 < 6$ , 而当  $b \in B, b_1 \in B_1$  时,  $(bb_1)^2 > 6$ . 故恒有  $aa_1 < \sqrt{6} < bb_1$ . 由此可知  $\sqrt{6} = c_1 = \sqrt{2} \cdot \sqrt{3}$ . 证完.

14. 建立确定数  $2^{\sqrt{2}}$  的分割.

解 先作分割  $A_1/B_1$ , 使之确定数  $\sqrt{2}$ .

其次, 作分割  $A/B$ , 其中  $A$  类包含全体负有理数、零以及满足下述条件的正有理数  $a$ :

如果有  $\frac{p}{q}$  ( $p, q$  互质) 属于  $A_1$ , 则有

$$a^q < 2^p;$$

而其余的正有理数归入  $B$  类.

这样的分割  $A/B$  就确定数  $2^{\sqrt{2}}$ .

15. 求证任何非空且下方有界的数集有下确界, 而任何非空且上方有界的数集有上确界.

证 不失一般性, 只证本题的后半部分, 分两种情形:

(1)  $A$  中有最大数  $\bar{a}$ . 设  $a \in A$ , 此时则有  $a \leq \bar{a}$ , 说明  $\bar{a}$  为  $A$  的上界. 又由于  $\bar{a} \in A$ , 故对  $A$  的任何上界  $M$ , 均有  $\bar{a} \leq M$ , 故  $\bar{a}$  为  $A$  的上确界.

(2)  $A$  中无最大数. 此时, 作分割  $A_1/B_1$ : 取集  $A$  的一切上界归入  $B_1$  类, 而其余的数归入  $A_1$  类. 这样,  $A$  中一切数全部落在  $A_1$  内,  $A_1$  及  $A_2$  均非空, 且  $A_1$  中的数小于  $B_1$  中的数, 这确实是一个实数分割, 易知由此分割所产生的实数  $\beta$  是  $B_1$  类中的最小数, 即  $\beta$  是  $A$  的最小上界, 从而  $\beta$  是  $A$  的上确界.

16. 证明一切有理真分式  $\frac{m}{n}$  (式中  $m$  及  $n$  为自然数, 且  $0 < m < n$ ) 的集合无最小及最大的元素. 并求集合的上确界及下确界.

证 令  $E$  表一切有理真分式  $\frac{m}{n}$  (式中正整数  $m, n$  满足  $0 <$

$< m < n$ ) 所成的集合. 对任何  $\frac{m}{n} \in E$ , 显然  $\frac{m+1}{n+1} \in E$  且  $\frac{m+1}{n+1} > \frac{m}{n}$ , 又  $\frac{m^2}{n^2} \in E$ , 且  $\frac{m^2}{n^2} < \frac{m}{n}$ ; 故  $E$  中既无最大数, 也无最小数. 显然

$$\sup E = 1, \quad \inf E = 0.$$

### 17. 有理数 $r$ 满足不等式

$$r^2 < 2.$$

求这些有理数  $r$  所成集合的下确界和上确界.

解 用  $E$  表所有满足  $r^2 < 2$  的有理数  $r$  所成的集合. 我们知道, 分割  $A/B$  确定无理数  $\sqrt{2}$ , 这里  $A$  表由一切非正有理数以及满足  $r^2 < 2$  的正有理数  $r$  所成的类,  $B$  表其余有理数构成的类, 并且已证  $A$  中无最大数, 于是

$$\sup E = \sup A = \sqrt{2}.$$

同样, 分割  $A'/B'$  确定无理数  $-\sqrt{2}$ , 这里  $B'$  表由所有非负有理数以及满足  $r^2 < 2$  的负有理数  $r$  构成的类,  $A'$  表其余有理数构成的类, 并且  $B'$  中无最小数. 于是, 显然有

$$\inf E = \inf B' = -\sqrt{2}.$$

### 18. 设 $\{-x\}$ 为数的集合, 这些数是与 $x \in \{x\}$ 符号相反的数. 证明等式:

$$(a) \inf \{-x\} = -\sup \{x\}; (b) \sup \{-x\} = -\inf \{x\}.$$

证 (a) 设  $\inf \{-x\} = m'$ , 则有:

(1) 当  $-x \in \{-x\}$  时,  $-x \geq m'$ ;

(2) 对于任何的正数  $\epsilon$ , 存在有  $-x' \in \{-x\}$ , 使

$$-x' < m' + \epsilon.$$

由(1) 及(2) 推得:

(3) 当  $x \in \{x\}$  时,  $x \leq -m'$ ;

(4) 对于任何的正数  $\epsilon$ , 存在有  $x' \in \{x\}$ , 使

$$x' > -m' - \epsilon.$$

由(3)及(4)知数  $-m' = \sup\{x\}$ , 即  $m' = -\sup\{x\}$ , 所以  $\inf\{-x\} = -\sup\{x\}$ .

(5) 设  $\sup\{-x\} = M'$ , 则有:

(6) 当  $-x \in \{-x\}$  时,  $-x \leq M'$ ;

(7) 对于任何的正数  $\epsilon$ , 存在有  $-x' \in \{-x\}$ , 使

$$-x' > M' + \epsilon.$$

由(5)及(6)推得:

(8) 当  $x \in \{x\}$  时,  $x \geq -M'$ ;

(9) 对于任何的正数  $\epsilon$ , 存在有  $x' \in \{x\}$ , 使

$$x' < -M' + \epsilon.$$

由(7)及(8)知数  $-M' = \inf\{x\}$ , 即  $M' = -\inf\{x\}$ , 所以,  $\sup\{-x\} = -\inf\{x\}$ .

19. 设  $\{x+y\}$  为所有  $x+y$  这些和的集合, 其中  $x \in \{x\}$  及  $y \in \{y\}$ . 证明等式:

(a)  $\inf\{x+y\} = \inf\{x\} + \inf\{y\}$ ;

(b)  $\sup\{x+y\} = \sup\{x\} + \sup\{y\}$ .

证 (a) 设  $\inf\{x\} = m_1$ ,  $\inf\{y\} = m_2$ , 则有:

(1) 当  $x \in \{x\}$ ,  $y \in \{y\}$  时,  $x \geq m_1$ ,  $y \geq m_2$ ;

(2) 对于任何的正数  $\epsilon$ , 存在有数  $x' \in \{x\}$ ,  $y' \in \{y\}$ , 使

$$x' < m_1 + \frac{\epsilon}{2}, \quad y' < m_2 + \frac{\epsilon}{2}.$$

由(1)及(2)推得:

(3) 当  $x+y \in \{x+y\}$  时(其中  $x \in \{x\}$ ,  $y \in \{y\}\rangle$ ,

$$x + y \geq m_1 + m_2;$$

(4) 对于任何的正数  $\epsilon$ , 存在有  $x' + y' \in \{x + y\}$  (其中  $x' \in \{x\}, y' \in \{y\}$ ), 使

$$x' + y' < (m_1 + m_2) + \epsilon.$$

由(3) 及(4) 知数  $m_1 + m_2 = \inf\{x + y\}$ , 即

$$\inf\{x + y\} = \inf\{x\} + \inf\{y\}.$$

(6) 同法可证

$$\sup\{x + y\} = \sup\{x\} + \sup\{y\}.$$

20. 设  $\{xy\}$  为所有  $xy$  乘积的集合, 其中  $x \in \{x\}$  及  $y \in \{y\}$ , 且  $x \geq 0$  及  $y \geq 0$ . 证明等式:

(a)  $\inf\{xy\} = \inf\{x\}\inf\{y\}$ ;

(b)  $\sup\{x\}\sup\{y\} = \sup\{xy\}$ .

证 (a) 设  $\inf\{x\} = m_1, \inf\{y\} = m_2$ , 由于恒有  $x \geq 0, y \geq 0$ . 故必  $m_1 \geq 0, m_2 \geq 0$ . 于是

(1) 当  $x \in \{x\}, y \in \{y\}$  时,  $x \geq m_1 \geq 0, y \geq m_2 \geq 0$ ;

(2) 对任何的正数  $\epsilon$ , 存在有数  $x' \in \{x\}, y' \in \{y\}$ , 使

$$0 \leq x' < m_1 + \epsilon, 0 \leq y' < m_2 + \epsilon.$$

由(1) 及(2) 推得:

(3) 当  $xy \in \{xy\}$ , 其中  $x \in \{x\}, y \in \{y\}, xy \geq m_1 m_2$ ;

(4) 对于任何的正数  $\epsilon$ , 存在有  $x' y' \in \{xy\}$  (其中  $x' \in \{x\}, y' \in \{y\}$ ), 使

$$0 \leq x' y' < (m_1 + \epsilon)(m_2 + \epsilon) = m_1 m_2 + \epsilon',$$

其中  $\epsilon' = (m_1 + m_2)\epsilon + \epsilon^2$ .

由(3) 及(4) 知数  $m_1 m_2 = \inf\{xy\}$ , 即

$$\inf\{xy\} = \inf\{x\}\inf\{y\}.$$

(6) 同法可证

$$\sup\{xy\} = \sup\{x\}\sup\{y\}.$$

21. 求证不等式:

$$(a) |x - y| \geqslant | |x| - |y| |;$$

$$(b) |x + x_1 + \dots + x_n| \geqslant |x| - (|x_1| + \dots + |x_n|).$$

证 (a) 由  $|x - y| = |x + (-y)| \geqslant |x| - |-y|$   
 $= |x| - |y|,$

及  $|x - y| = |y - x| \geqslant |y| - |x|$   
 $= -(|x| - |y|),$

即得

$$|x - y| \geqslant | |x| - |y| |$$

也可如下证明: 由  $|xy| \geqslant xy$  知

$$x^2 - 2xy + y^2 \geqslant x^2 - 2|xy| + y^2,$$

则  $(x - y)^2 \geqslant (|x| - |y|)^2,$

开方即得

$$|x - y| \geqslant | |x| - |y| |.$$

(b)  $|x + x_1 + \dots + x_n| \geqslant |x| - |x_1 + \dots + x_n|,$

而  $|x_1 + \dots + x_n| \leqslant |x_1| + |x_2 + \dots + x_n| \leqslant \dots$   
 $\leqslant |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|,$

所以,

$$|x + x_1 + \dots + x_n| \geqslant |x| - (|x_1| + \dots + |x_n|).$$

解不等式:

22.  $|x + 1| < 0.01.$

解 由  $|x + 1| < 0.01$  推得

$$-0.01 < x + 1 < 0.01,$$

所以,

$$-1.01 < x < -0.99.$$

23.  $|x - 2| \geq 10$ .

解 由  $|x - 2| \geq 10$  推得

$$x - 2 \geq 10 \quad \text{或} \quad x - 2 \leq -10,$$

所以,

$$x \geq 12 \quad \text{或} \quad x \leq -8.$$

24.  $|x| > |x + 1|$ .

解 两边平方, 即得

$$x^2 > (x + 1)^2 \quad \text{或} \quad 2x + 1 < 0,$$

于是, 有

$$x < -\frac{1}{2}.$$

25.  $|2x - 1| < |x - 1|$ .

解 两边平方, 即得

$$(2x - 1)^2 < (x - 1)^2 \quad \text{或} \quad 3x^2 - 2x < 0,$$

解之, 得

$$0 < x < \frac{2}{3}.$$

26.  $|x + 2| + |x - 2| \leq 12$ .

解 令  $x - 2 = t$ , 则得

$$|t + 4| + |t| \leq 12 \quad \text{或} \quad |t + 4| \leq 12 - |t|.$$

两边平方, 即有

$$t^2 + 8t + 16 \leq 144 - 24|t| + t^2,$$

或

$$3|t| \leq 16 - t.$$

将上式两端再平方, 化简整理得

$$t^2 + 4t - 32 \leq 0,$$

于是,有

$$-8 \leq t \leq 4.$$

从而得

$$-8 \leq x - 2 \leq 4,$$

即

$$-6 \leq x \leq 6 \quad \text{或} \quad |x| \leq 6.$$

27.  $|x+2| - |x| > 1.$

解  $1 + |x| < |x+2|$ , 将此式两端平方, 化简得

$$2|x| < 4x + 3.$$

再平方之, 化简得

$$4x^2 + 8x + 3 > 0.$$

于是,有

$$x > -\frac{1}{2} \quad \text{或} \quad x < -\frac{3}{2}.$$

后者不适合, 所以,

$$x > -\frac{1}{2}.$$

28.  $\left| |x+1| - |x-1| \right| < 1.$

解 两端平方, 化简得

$$x^2 + \frac{1}{2} < |x^2 - 1|,$$

即

$$x^2 - 1 > x^2 + \frac{1}{2} \quad \text{或} \quad x^2 - 1 < -\left(x^2 + \frac{1}{2}\right).$$

前者不可能, 所以,

$$x^2 - 1 < -\left(x^2 + \frac{1}{2}\right),$$

即  $x^2 < \frac{1}{4}$ , 解之得

$$|x| < \frac{1}{2}.$$

29.  $|x(1-x)| < 0.05$ .

解 由  $|x - x^2| < \frac{1}{20}$  得

$$x^2 - x + \frac{1}{20} > 0 \quad \text{或} \quad x^2 - x - \frac{1}{20} < 0,$$

解之得

$$\begin{cases} \frac{5 - \sqrt{30}}{10} < x < \frac{5 + \sqrt{30}}{10} \\ \frac{5 + \sqrt{20}}{10} < x \quad \text{或} \quad x < \frac{5 - \sqrt{20}}{10}, \end{cases}$$

即

$$\frac{5 - \sqrt{30}}{10} < x < \frac{5 + \sqrt{20}}{10} \quad \text{或}$$

$$\frac{5 + \sqrt{20}}{10} < x < \frac{5 + \sqrt{30}}{10}.$$

30. 证明恒等式

$$\left(\frac{x+|x|}{2}\right)^2 + \left(\frac{x-|x|}{2}\right)^2 = x^2.$$

证  $\left(\frac{x+|x|}{2}\right)^2 + \left(\frac{x-|x|}{2}\right)^2$

$$= \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x|x| + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x|x| = x^2.$$

31. 当测量长度 10 厘米时, 绝对误差为 0.5 毫米; 当测量距离 500 千米时, 绝对误差等于 200 米. 哪种测量较为精确?

解 用相对误差

$$\delta = \frac{\Delta}{|\alpha|}$$

进行比较,其中  $a$  为被测量的精确值,而  $\Delta$  是绝对误差.

对于前者,  $\delta = \frac{0.5 \times 0.1}{10} = 0.5\%$ ,

对于后者,  $\delta = \frac{200}{500 \times 1000} = 0.04\%$ ,

所以,后者测量较为精确.

### 32. 设数

$$x = 2.3752$$

的相对误差为  $1\%$ ,试求此数包含若干位准确数字?

解 因为  $\frac{\Delta}{x} = 0.01$ , 所以  $\Delta = 0.023752$ .

因而,此数包含两位准确数字.

### 33. 数

$$x = 12.125$$

包含三位准确数字. 试求此数的相对误差?

解 因为  $x$  包含三位准确数字, 所以  $\Delta < 0.05$ . 于是得  
相对误差

$$\delta = \frac{\Delta}{|x|} < \frac{0.05}{12.125} < 0.42\%$$

即

$$\delta < 0.42\%.$$

### 34. 矩形的边等于:

$$x = 2.50 \text{ 厘米} \pm 0.01 \text{ 厘米},$$

$$y = 4.00 \text{ 厘米} \pm 0.02 \text{ 厘米}.$$

这个矩形的面积  $S$  界于甚么范围内? 设其边长取平均值时, 矩形面积的绝对误差  $\Delta$  和相对误差  $\delta$  为何?

解  $S_{\min} = (2.50 - 0.01)(4.00 - 0.02)$   
 $= 9.9102(\text{平方厘米})$ ,

$$S_{\max} = (2.50 + 0.01)(4.00 + 0.02) \\ = 10.0902(\text{平方厘米}),$$

$$S_{\min} \leq S \leq S_{\max},$$

$$S_{\text{平均}} = 2.50 \times 4.00 = 10(\text{平方厘米}),$$

$$\Delta_1 = 10.0902 - 10 = 0.0902(\text{平方厘米}),$$

$$\Delta_2 = 10 - 9.9102 = 0.0898(\text{平方厘米});$$

$$\Delta \leq \max(\Delta_1, \Delta_2) = 0.0902(\text{平方厘米}),$$

$$\delta = \frac{\Delta}{10} \leq \frac{0.0902}{10} < 0.91\%.$$

\* ) 以后各题简写为厘米<sup>2</sup>, 厘米<sup>3</sup>等.

35. 物体的重量  $P = 12.59$  克  $\pm 0.01$  克, 其体积  $V = 3.2$  厘米<sup>3</sup>  $\pm 0.2$  厘米<sup>3</sup>. 若对物体的重量和体积都取其平均值, 试求物体的比重, 并估计比重的绝对误差和相对误差.

解 比重  $C = \frac{12.59}{3.2}$  克 / 厘米<sup>3</sup> = 3.93 克 / 厘米<sup>3</sup>.

$$C_{\max} = \frac{12.60}{3.0} \text{ 克 / 厘米}^3 = 4.20 \text{ 克 / 厘米}^3,$$

$$C_{\min} = \frac{12.58}{3.4} \text{ 克 / 厘米}^3 = 3.70 \text{ 克 / 厘米}^3,$$

$$C_{\min} \leq C \leq C_{\max},$$

$$\Delta_1 = C_{\max} - C = 0.27 \text{ 克 / 厘米}^3,$$

$$\Delta_2 = C - C_{\min} = 0.23 \text{ 克 / 厘米}^3;$$

$$\Delta \leq \max(\Delta_1, \Delta_2) = 0.27 \text{ 克 / 厘米}^3,$$

一般地, 比重为  $(3.93 \pm 0.27)$  克 / 厘米<sup>3</sup>,

$$\delta \leq \frac{0.27}{3.70} < 7.3\%.$$

### 36+. \*圆半径

$$r = 7.2 \text{ 米} \pm 0.1 \text{ 米}.$$

若取  $\pi = 3.14$ , 则求出的圆面积的最小相对误差为何?

解 圆面积  $A = \pi \times 7.2^2 \approx 51.84\pi (\text{米}^2)$

$$\Delta_1 = \pi(7.2 + 0.1)^2 - \pi \cdot 7.2^2 = 1.45\pi.$$

$$\Delta_2 = |\pi(7.2 - 0.1)^2 - \pi \cdot 7.2^2| = 1.43\pi.$$

$$\Delta \leq \max(\Delta_1, \Delta_2) = 1.45\pi (\text{米}^2)$$

即一般的圆面积  $A$  为  $(51.84 \pm 1.45)\pi (\text{米}^2)$ , 故

$$\delta \leq \frac{1.45\pi}{51.84\pi} < 2.80\%.$$

### 37. 对直角平行六面体测得

$$x = 24.7 \text{ 米} \pm 0.2 \text{ 米};$$

$$y = 6.5 \text{ 米} \pm 0.1 \text{ 米};$$

$$z = 1.2 \text{ 米} \pm 0.1 \text{ 米}.$$

这个平行六面体的体积  $V$  界于甚么范围内? 若测量的各结果都取其平均值, 则求出的平行六面体的体积可能有的绝对误差和相对误差为何?

解  $24.5 \times 6.4 \times 1.1 \leq V \leq 24.9 \times 6.6 \times 1.3$

即  $172.480 \text{ 米}^3 \leq V \leq 213.642 \text{ 米}^3$ .

当  $x, y, z$  均取平均值时,

$$V = 24.7 \times 6.5 \times 1.2 = 192.660 \text{ 米}^3.$$

$$\Delta_1 = 213.642 - 192.660 = 20.982 (\text{米}^3),$$

$$\Delta_2 = 192.660 - 172.480 = 20.180 (\text{米}^3).$$

---

\* 题号右上角带“+”号表示题解答案与原习题集中译本所附答案不一致, 以后不再说明. 中译本基本是按俄文第二版翻译的. 俄文第二版中有一些错误已在俄文第三版中改正.

于是,

$$\Delta \leq 20.982 \text{ 米}^3;$$

$$\delta \leq \frac{20.982}{172.480} \approx 12.2\%.$$

38. 测量正方形的边  $x$ , 此处  $2 \text{ 米} < x < 3 \text{ 米}$ , 应有多小的绝对误差, 才能使此正方形面积有可能精确到  $0.001 \text{ 米}^2$ ?

解 按题设我们有  $0 < x^2 - 4 < 0.001$  或  $0 < 9 - x^2 < 0.001$ , 解之得

$$2.99983 < x < 3 \quad \text{或} \quad 2 < x < 2.00024.$$

因此,  $\Delta$  取二者中误差较小者, 即

$$\Delta \leq 0.00017(\text{米}) = 0.17 \text{ 毫米},$$

故当边长  $x$  的绝对误差不超过  $0.17$  毫米时, 就能使此正方形的面积精确到  $0.001 \text{ 米}^2$ .

39. 假定矩形每边的长皆不超过  $10 \text{ 米}$ , 为了使根据测量所计算出来的面积与原面积之差不超过  $0.01 \text{ 平方米}$ , 问测量矩形的边  $x$  与  $y$  时, 许可的绝对误差  $\Delta$  的值多大\*)?

解 按题设我们有

$$(x + \Delta)(y + \Delta) - xy \leq 0.01,$$

$$\text{即 } \Delta^2 + (x + y)\Delta \leq 0.01,$$

由于  $x \leq 10$  及  $y \leq 10$ , 所以只要

$$\Delta^2 + 20\Delta \leq 0.01 \quad \text{或} \quad \Delta^2 + 20\Delta - 0.01 \leq 0$$

即可. 解之, 得

$$\begin{aligned}\Delta &\leq \frac{-20 + \sqrt{20^2 + 0.04}}{2} = -10 + \frac{20.00099}{2} \\ &= 0.000499 < 0.0005(\text{米}).\end{aligned}$$

\*) 此题假设  $x, y$  有相等的绝对误差. 又原著上为“ $0.01 \text{ 平方米}$ ”, 而误译为“ $0.01 \text{ 平方厘米}$ ”.

40. 设  $\delta(x)$  及  $\delta(y)$  为数  $x$  和  $y$  的相对误差,  $\delta(xy)$  为数  $xy$  的相对误差, 求证:

$$\delta(xy) \leq \delta(x) + \delta(y) + \delta(x)\delta(y).$$

证 设  $x = a + \Delta_x$ ,  $y = b + \Delta_y$ ,

其中  $a$  及  $b$  分别是  $x$  及  $y$  的精确值,  $\Delta_x$  及  $\Delta_y$  是绝对误差, 则有

$$xy - ab = b\Delta_x + a\Delta_y + \Delta_x \cdot \Delta_y$$

于是,

$$\begin{aligned}\Delta &= |xy - ab| \\ &\leq |b| \cdot \Delta_x + |a| \cdot \Delta_y + \Delta_x \cdot \Delta_y\end{aligned}$$

最后即得

$$\delta(xy) = \frac{\Delta}{|ab|} \leq \frac{\Delta_x}{|a|} + \frac{\Delta_y}{|b|} + \frac{\Delta_x}{|a|} \cdot \frac{\Delta_y}{|b|}.$$

此即

$$\delta(xy) \leq \delta(x) + \delta(y) + \delta(x)\delta(y).$$

## § 2. 叙列的理论

1° 叙列的极限的概念: 假设对于任何的  $\epsilon > 0$ , 有数  $N = N(\epsilon)$ , 使

当  $n > N$  时,  $|x_n - a| < \epsilon$ ,

则称叙列  $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$  有极限  $a$  (或者说, 收敛于  $a$ ) 亦即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

其中, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0,$$

则称  $x_n$  为无穷小.

没有极限的叙列, 称为发散的.

2° 极限存在的准则

(1) 设

$$y_n \leq x_n \leq z_n$$

及

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = c,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c.$$

(2) 单调而且有界的数列有极限.

(3) 哥西判别法 数列  $\{x_n\}$  的极限存在的必要而且充分的条件是: 对于任何的  $\epsilon > 0$ , 有数  $N = N(\epsilon)$ , 使当  $n > N$  和  $p > 0$  时,  $|x_n - x_{n+p}| < \epsilon$ .

3° 关于数列的极限的基本定理 设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ 和 } \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$$

存在, 则有:

(1) 若  $x_n \leq y_n$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ ;

(2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ ;

(3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ ;

(4) 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n \neq 0$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n}$ .

4° 数  $e$ , 数列

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad (n = 1, 2, \dots)$$

有确定的极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e = 2.7182818284\dots$$

5° 无穷极限 符号

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$$

表示对于任何的  $E > 0$ , 有数  $N = N(E)$ , 使

当  $n > N$  时,  $|x_n| > E$ .

6° 聚点 设已知数列  $x_n (n = 1, 2, \dots)$  有子数列

$$xp_1, xp_2, \dots, xp_s \dots$$

适合

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{p_n} = \xi,$$

则称数  $\xi$  (或符号  $\infty$ ) 为已知数列  $a_n (n = 1, 2, \dots)$  的聚点.

一切有界的叙列至少有一个有穷的聚点(波尔查诺 外尔斯特拉斯原理). 若这个聚点是唯一的, 则它即为已知叙列的有穷极限.

叙列  $x_n$  的最小聚点(有穷的或无穷的)

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$$

称为下极限, 而它的最大聚点

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$$

称为此叙列的上极限

等式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$$

为叙列  $x_n$  的(有穷或无穷)极限存在的必要而且充分的条件.

41. 设

$$x_n = \frac{n}{n+1} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1,$$

即: 对于任一个给定的  $\epsilon > 0$ , 求数  $N = N(\epsilon)$

使得

在  $n > N$  时,  $|x_n - 1| < \epsilon$ .

填下表:

$\epsilon$	0.1	0.01	0.001	0.0001	...
$N$					

证  $|x_n - 1| = \frac{1}{n+1}$ . 任给  $\epsilon > 0$ , 要  $|x_n - 1| < \epsilon$ , 只

要

$$\frac{1}{n+1} < \epsilon.$$

即只要  $n > \frac{1}{\epsilon} - 1$ , 可取

$$N = N(\epsilon) = \left[ \frac{1}{\epsilon} \right],$$

则当  $n > N$  时,  $|x_n - 1| < \epsilon$ . 所以,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1.$$

$\epsilon$	0.1	0.01	0.001	0.0001	...
$N$	10	100	1000	10000	...

42. 假若:

(a)  $x_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ ; (b)  $\frac{2n}{n^3 + 1}$ ;

(c)  $x_n = \frac{1}{n!}$ ; (d)  $x_n = (-1)^n \cdot 0.999^n$ .

对于任何的  $\epsilon > 0$ , 求出数  $N = N(\epsilon)$ , 使

当  $n > N$  时,  $|x_n| < \epsilon$ ;

即证明  $x_n (n = 1, 2, \dots)$  为无穷小(就是说, 有极限值为 0)

对应着上面四种情形, 填下表:

$\epsilon$	0.1	0.01	0.001	...	
$N$					

证 (a)  $|x_n| = \frac{1}{n}$ . 任给  $\epsilon > 0$ , 要  $|x_n| < \epsilon$ , 只要

$$\frac{1}{n} < \epsilon,$$

即只要  $n > \frac{1}{\epsilon}$ . 取  $N = \left(\frac{1}{\epsilon}\right)^{\frac{1}{2}}$ , 则当  $n > N$  时,  $|x_n| < \epsilon$ , 所以,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

(6)  $|x_n| = \frac{2n}{n^3 + 1} < \frac{2}{n^2}$ . 任给  $\epsilon > 0$ , 要  $|x_n| < \epsilon$ , 只要

$$\frac{2}{n^2} < \epsilon,$$

即只要  $n > \sqrt{\frac{2}{\epsilon}}$ . 取  $N = \left(\sqrt{\frac{2}{\epsilon}}\right)$ , 则当  $n > N$  时,  $|x_n| < \epsilon$ , 所以,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

(b)  $|x_n| = \frac{1}{n!} \leq \frac{1}{2^{n-1}}$ . 任给  $\epsilon > 0$ , 要  $|x_n| < \epsilon$ , 只要

$$\frac{1}{2^{n-1}} < \epsilon,$$

即只要  $n > 1 + \log_2 \frac{1}{\epsilon}$ . 取

$$N = \left(\log_2 \frac{1}{\epsilon}\right) + 1,$$

则当  $n > N$  时,  $|x_n| < \epsilon$ , 所以,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

(r)  $|x_n| = 0.999^n$ . 任给  $\epsilon > 0$ , 要  $|x_n| < \epsilon$ , 只要  
 $n \lg 0.999 < \lg \epsilon$ .

由于  $\lg 0.999 < 0$ , 故只要  $n > \frac{\lg \epsilon}{\lg 0.999} \approx 2500 \lg \frac{1}{\epsilon}$ .

取

$$N = \left\lceil 2500 \lg \frac{1}{\epsilon} \right\rceil,$$

则当  $n > N$  时,  $|x_n| < \epsilon$ , 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

填下表:

$\epsilon$	0.1	0.01	0.001	...
(a) $N$	10	100	1000	...
(b) $N$	4	14	44	...
(c) $N$	4	7	10	...
(d) $N$	2500	5000	7500	...

\* ) 或取  $N \geq \frac{1}{\epsilon}$ . 以下各题类似, 不再一一说明.

\* \* ) 查四位数学用表所得的数据.

### 43. 证明数列

(a)  $x_n = (-1)^n n$ , (b)  $x_n = 2^{\sqrt{n}}$ , (c)  $x_n = \lg(\lg n)$  ( $n \geq 2$ )

当  $n \rightarrow \infty$  时, 有无穷极限(即成为无穷大), 即:

对任意的  $E > 0$ , 求数  $N = N(E)$ , 使

当  $n > N$  时,  $|x_n| > E$ .

对应着上面的每一种情形, 填下表:

$E$	10	100	1000	10000	...
$N$					

证 (a)  $|x_n| = n$ , 任给  $E > 0$ , 要  $|x_n| > E$ , 只要  
 $n > E$ .

取  $N = \lceil E \rceil$ , 则当  $n > N$  时,  $|x_n| > E$ , 所以,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty.$$

(b)  $|x_n| = 2^{\sqrt{n}}$ , 任给  $E > 0$ , 要  $|x_n| > E$ , 只要  $2^{\sqrt{n}} > E$ .

即只要  $n > \left(\frac{\lg E}{\lg 2}\right)^2$ . 取

$$N = \left[ \left( \frac{\lg E}{\lg 2} \right)^2 \right],$$

则当  $n > N$  时,  $|x_n| > E$ , 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty.$$

(c) 当  $n > 10$  时,  $\lg n > 1$  及  $\lg(\lg n) > 0$ .

任给  $E > 0$ , 要  $|x_n| > E$ , 只要

$$\lg(\lg n) > E,$$

即只要  $n > 10^{(10^E)}$ , 取

$$N = [10^{(10^E)}],$$

则当  $n > N$  时,  $|x_n| > E$ , 所以,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty.$$

填下表:

$E$		10	100	1000	10000	...
	$N$	10	100	1000	10000	...
(a)	$N$	10	100	1000	10000	...
(b)	$N$	11	44	99	176	...
(c)	$N$	$10^{(10^10)}$	$10^{(10^{100})}$	$10^{(10^{1000})}$	$10^{(10^{10000})}$	...

44. 求证

$$x_n = n^{(-1)^n} \quad (n=1, 2, \dots)$$

无界, 但当  $n \rightarrow \infty$  时, 它并不成为无穷大.

证 因为  $x_n = n^{(-1)^n} = \begin{cases} 2k, & \text{当 } n=2k, k \text{ 为自然数,} \\ \frac{1}{2k+1}, & \text{当 } n=2k+1, \end{cases}$

所以,

$$x_{2k} \rightarrow \infty, \quad x_{2k+1} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

由于  $x_{2k} \rightarrow \infty$ , 故  $x_n$  无界; 但因  $x_{2k+1} \rightarrow 0$ , 故  $x_n$  并不趋于无穷大.

45. 用不等式表示下列各式:

$$(a) \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty; (b) \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty; (c) \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty.$$

解 (a) 对于任给的正数  $E$ , 存在有自然数  $N=N(E)$ , 使当  $n>N$  时,  $|x_n|>E$ ,

$$\text{此即 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty.$$

(b) 对于任给的正数  $E$ , 存在有自然数  $N=N(E)$ , 使当  $n>N$  时,  $x_n<-E$ ,

$$\text{此即 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty.$$

(c) 对于任给的正数  $E$ , 存在有自然数  $N=N(E)$ , 使当  $n>N$  时,  $x_n>E$ ,

$$\text{此即 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty.$$

设  $n$  跑过自然数列, 求下列各式之值:

46.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10000n}{n^2+1}.$

解  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10000n}{n^2+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10000}{n+\frac{1}{n}} = 0.$

$$47. \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}).$$

解  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$   
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$   
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = 0.$

$$48. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^2} \sin n!}{n+1}.$$

解 因为  $\sin n!$  有界:  $|\sin n!| \leq 1$  及  $\frac{\sqrt[3]{n^2}}{n+1} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ ,  
 所以,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^2} \sin n!}{n+1} = 0.$$

$$49. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-2)^n + 3^n}{(-2)^{n+1} + 3^{n+1}}.$$

解  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-2)^n + 3^n}{(-2)^{n+1} + 3^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(-\frac{2}{3}\right)^n \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3}}{\left(-\frac{2}{3}\right)^{n+1} + 1} = \frac{1}{3}.$

$$50. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+a+a^2+\cdots+a^n}{1+b+b^2+\cdots+b^n} (|a| < 1, |b| < 1).$$

解  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+a+a^2+\cdots+a^n}{1+b+b^2+\cdots+b^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1-a^{n+1}}{1-a}}{\frac{1-b^{n+1}}{1-b}} = \frac{1-b}{1-a}.$

$$51. \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n-1}{n^2} \right).$$

解  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n-1}{n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)n}{2n^2} = \frac{1}{2}.$

$$52. \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{n} - \frac{2}{n} + \frac{3}{n} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1} n}{n} \right].$$

解 当  $n=2k$  时 ( $k$  为自然数),

$$\begin{aligned} & \frac{1}{n} - \frac{2}{n} + \frac{3}{n} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1} n}{n} \\ &= \frac{1}{2k} - \frac{2}{2k} + \frac{3}{2k} - \cdots - \frac{2k}{2k} = \frac{-k}{2k} = -\frac{1}{2}; \end{aligned}$$

当  $n=2k+1$ ,

$$\begin{aligned} & \frac{1}{n} - \frac{2}{n} + \frac{3}{n} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1} n}{n} \\ &= \frac{1}{2k+1} - \frac{2}{2k+1} + \frac{3}{2k+1} - \cdots + \frac{2k+1}{2k+1} \\ &= \frac{k+1}{2k+1} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2}; \end{aligned}$$

由于取不同方式时, 所得的极限值不同, 所以, 极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{n} - \frac{2}{n} + \frac{3}{n} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1} n}{n} \right]$$

不存在.

$$53. \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1^2}{n^3} + \frac{2^2}{n^3} + \cdots + \frac{(n-1)^2}{n^3} \right].$$

$$\begin{aligned} \text{解 } & \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1^2}{n^3} + \frac{2^2}{n^3} + \cdots + \frac{(n-1)^2}{n^3} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{n^3} \cdot \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} \right] = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

$$54. \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1^2}{n^3} + \frac{3^2}{n^3} + \cdots + \frac{(2n-1)^2}{n^3} \right].$$

解 设  $f(n) = \frac{1^2}{n^3} + \frac{2^2}{n^3} + \cdots + \frac{(n-1)^2}{n^3}$ , 由 53 题

$$\begin{aligned} \text{即得 } & \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1^2}{n^3} + \frac{3^2}{n^3} + \cdots + \frac{(2n-1)^2}{n^3} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [8f(2n) - 4f(n)] = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

$$55. \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} \right).$$

解 设  $f(n) = \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n}$ ,

$$g(n) = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}},$$

$$\text{则有 } 2f(n+1) - g(n) = f(n) + 1,$$

$$\text{又由 } 2f(n+1) - f(n) = f(n) + \frac{2n+1}{2^n} = g(n) + 1,$$

$$\text{故 } f(n) = g(n) + 1 - \frac{2n+1}{2^n}.$$

$$\text{而 } \lim_{n \rightarrow \infty} [g(n) + 1] = 3 \text{ 及 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2^n} = 0, \text{ 故得}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} \right) = 3.$$

\* ) 参看 58 题

$$56. \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right].$$

$$\text{解 } \frac{1}{1 \cdot 2} = 1 - \frac{1}{2},$$

$$\frac{1}{2 \cdot 3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}, \dots, \dots,$$

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1},$$

$$\text{相加之, 得 } \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)}$$

$$= 1 - \frac{1}{n+1},$$

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1.$$

57.  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{2} + \sqrt[4]{2} + \sqrt[8]{2} \cdots \sqrt[2^n]{2}).$

解 由于  $\sqrt{2} + \sqrt[4]{2} + \sqrt[8]{2} \cdots \sqrt[2^n]{2}$   
 $= 2 \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^n} \right)$   
 $= 2 \left[ \frac{\frac{1}{2} \cdot \left( \frac{1}{2} \right)^n}{1 - \frac{1}{2}} \right]$

故  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{2} + \sqrt[4]{2} + \sqrt[8]{2} \cdots \sqrt[2^n]{2})$   
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left[ \frac{\frac{1}{2} \cdot \left( \frac{1}{2} \right)^n}{1 - \frac{1}{2}} \right] = 2.$

证明下列等式：

58.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^n} = 0.$

证 因为  $2^n = (1+1)^n = 1+n+\frac{n(n-1)}{2}+\cdots+1$   
 $> \frac{n(n-1)}{2} (n > 2),$

故  $0 < \frac{n}{2^n} < \frac{2}{n-1};$

又因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n-1} = 0$ , 所以,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^n} = 0.$$

59.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!} = 0.$

证 因为  $0 < \frac{2^n}{n!} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{2} \cdots \frac{2}{n} \leqslant \frac{4}{n}$  及  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n} = 0$ , 所以,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!} = 0.$$

60.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} = 0 \quad (a > 1).$

证 令  $a = 1 + \lambda \quad (\lambda > 0),$

$$\text{则 } a^n = (1+\lambda)^n = 1 + n\lambda + \frac{n(n-1)}{2}\lambda^2 + \dots \\ + \lambda^n > \frac{n(n-1)}{2}\lambda^2 \quad (n > 2).$$

当  $n > 2$  时,  $n-1 > \frac{n}{2}$ , 此时,

$$a^n > \frac{n^2}{4}\lambda^2 = \frac{n^2(a-1)^2}{4}.$$

分三种情形:

(1) 当  $k \leq 0$  时, 这时显然有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a^n \cdot n^{-k}} = 0.$$

(2) 当  $k = 1$  时,

$$0 < \frac{n^k}{a^n} = \frac{n}{a^n} < \frac{4n}{n^2(a-1)^2},$$

而  $\frac{4n}{n^2(a-1)^2} \rightarrow 0$ , 所以,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a^n} = 0;$$

(3) 当  $k > 0$  时,

$$\frac{n^k}{a^n} = \left[ \frac{n}{(a^{\frac{1}{k}})^n} \right]^k,$$

而  $a^{\frac{1}{k}} > 1$ , 于是由(1)知,  $\frac{n}{(a^{\frac{1}{k}})^n} \rightarrow 0$ , 所以,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} = 0.$$

$$61. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0.$$

证 令  $k$  代表任何一个大于  $2|a|$  的自然数,

则当  $n > k$  时, 有

$$0 < \left| \frac{a^n}{n!} \right| = \left( \frac{|a|}{1} \cdot \frac{|a|}{2} \cdots \frac{|a|}{k} \right) \left( \frac{|a|}{k+1} \cdot \frac{|a|}{k+2} \cdots \frac{|a|}{n} \right)$$

$$< |a|^k \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k} = \frac{(2|a|)^k}{2^n}.$$

由于  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2|a|)^k}{2^n} = 0$ , 所以,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0.$$

62.  $\lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0$ , 若  $|q| < 1$ .

**证** (1) 当  $0 < q < 1$  时, 可令  $q = \frac{1}{a}$ , 其中  $a > 1$ , 所以,

$$\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, } nq^n = \frac{n}{a^n} \rightarrow 0^+;$$

(2) 当  $-1 < q < 0$  时, 可令  $q = -q'$ , 其中  $0 < q' < 1$ , 所以,

$$\text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, } nq^n = (-1)^n nq'^n \rightarrow 0;$$

$$(3) \text{ 当 } q = 0 \text{ 时, } nq^n = 0.$$

总之, 当  $|q| < 1$  时,  $\lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0$ .

\* ) 利用 60 题的结果。

63.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad (a > 0)$ .

**证** (1) 当  $a = 1$  时, 等式显然成立;

(2) 当  $a > 1$  时, 因为  $(1 + \varepsilon)^n > 1 + n\varepsilon$  ( $n > 1, \varepsilon > 0$ ), 则当  $n$  充分大后, 可使  $1 + n\varepsilon > a$ , 即  $(1 + \varepsilon)^n > a$ . 事实上, 只要取  $N = \left[ \frac{a-1}{\varepsilon} \right]$ , 当  $n > N$  时, 就可保证这点. 所以,

$$1 < \sqrt[n]{a} < 1 + \varepsilon,$$

于是, 当  $n > N$  时,  $|\sqrt[n]{a} - 1| < \varepsilon$ ,

此即  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ ;

(3) 当  $0 < a < 1$  时, 则令  $a = \frac{1}{a'}$ , 其中  $a' > 1$ .

于是,当  $n \rightarrow \infty$  时,  $\sqrt[n]{a} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^{\frac{1}{n}}}} \rightarrow 1$ .

总之,当  $a > 0$  时,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ .

$$64. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a n}{n} = 0 \quad (a > 1).$$

证 先证  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ . 事实上,令  $a_n = \sqrt[n]{n}$ , 则  $a_n > 1$ . 由 60 题前半部分的推导知

$$a_n^n > \frac{n^2}{4}(a_n - 1)^2,$$

$$\text{即 } n > \frac{n^2}{4}(\sqrt[n]{n} - 1)^2,$$

由此可知

$$0 < \sqrt[n]{n} - 1 < \frac{2}{\sqrt[n]{n}},$$

故  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$  成立.

现任给  $\epsilon > 0$ . 因  $a^{\epsilon} > 1 (a > 1)$ , 故存在  $N = N(\epsilon)$ , 使当  $n > N$  时, 恒有  $\sqrt[n]{n} < a^{\epsilon}$ , 由此可知 ( $n > N$ ),

$$0 < \frac{\log_a n}{n} < \epsilon.$$

故  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a n}{n} = 0$ .

$$65. \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

证 在 64 题的证明过程中已证.

$$66. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0.$$

证 由数学归纳法易证  $n! \geq \frac{1}{2}n^{\frac{n}{2}}$ , 从而  $\frac{1}{\sqrt[n]{n!}} \leq 2^{\frac{1}{n}}$ .

$\frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ , 又因  $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{n}} \cdot \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 0$ , 所以,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0.$$

67. 当  $n$  充分大时, 下面的式子哪个大些?

(a)  $100n+200$  或  $0.01n^2$ ?; (b)  $2^n$  或  $n^{1000}$ ?;

(c)  $1000^n$  或  $n!$ ?.

证 (a) 因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{100n+200}{0.01n^2} = 0$ , 所以,

当  $n$  充分大时,  $0.01n^2$  较  $100n+200$  大些.

(b) 因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{1000}}{2^n} = 0^{**}$ , 所以,

当  $n$  充分大时,  $2^n$  较  $n^{1000}$  大些.

(c) 因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1000^n}{n!} = 0^{***}$ , 所以,

当  $n$  充分大时,  $n!$  较  $1000^n$  大些.

\* ) 利用 60 题的结果.

\*\* ) 利用 61 题的结果.

68. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} \right) = 0.$$

证 因为  $0 < \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}^{**}$ ,

又因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2n+1}} = 0$ , 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} \right) = 0.$$

\* ) 利用 10 题的结果.

69. 证明数列

$$x_n = \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n (n=1, 2, \dots)$$

是单调增加的, 且上方有界. 而数列

$$y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} (n=1, 2, \dots)$$

是单调减少的,且下方有界.由此推出这些叙列有公共的极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = e.$$

$$\begin{aligned} \text{证 } x_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 + 1 + C_n^2 \frac{1}{n^2} + C_n^3 \frac{1}{n^3} \\ &\quad + \cdots + C_n^k \frac{1}{n^k} + \cdots + \frac{1}{n^n} \\ &= 2 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \cdots \\ &\quad + \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) + \cdots \\ &\quad + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right). \end{aligned}$$

其中每一项都为正,当  $n$  增加时,不但对应的项数增多,而且每一个括弧内的数值也增大,所以,叙列  $x_n (n=1, 2, \dots)$  单调增加.

又当  $k > 2$  时,  $\left(1 - \frac{k-1}{n}\right) < 1$ ,  $\frac{1}{k!} < \frac{1}{2^{k-1}}$ , 所以,

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &< 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} \\ &= 2 + \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right) < 3, \end{aligned}$$

此即叙列  $x_n (n=1, 2, \dots)$  上方有界.

由此,我们知  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  存在,以  $e$  表之.

其次,由于

$$\left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^n > 1 + \frac{n}{n^2-1} > 1 + \frac{1}{n},$$

$$\text{即} \left( \frac{n}{n+1} \right)^n \left( \frac{n}{n-1} \right)^n > \frac{n+1}{n},$$

$$\text{也即} \left( \frac{n}{n-1} \right)^n > \left( \frac{n+1}{n} \right)^{n+1}, \text{所以,}$$

$$\left( 1 + \frac{1}{n-1} \right)^n > \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1},$$

此即  $y_{n-1} > y_n$ , 因而, 数列  $y_n (n=1, 2, \dots)$  单调减少. 又因

$$y_n = \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n \cdot \left( 1 + \frac{1}{n} \right) > 1 + n \cdot \frac{1}{n} = 2,$$

所以, 数列  $y_n (n=1, 2, \dots)$  下方有界.

由此, 我们知  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1}$  存在, 且

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n \cdot \left( 1 + \frac{1}{n} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{n} \right) = e. \end{aligned}$$

于是,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n = e.$$

## 70. 证明

$$0 < e - \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n < \frac{3}{n} \quad (n=1, 2, \dots).$$

当指数  $n$  是什么样的数值时, 表示式  $\left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n$  与数  $e$  之差小于 0.001?

**证** 利用 69 题的结果知

$$0 < \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n < e < \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1},$$

$$\text{即 } 0 < e - \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n < \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1} - \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n,$$

$$\text{而 } \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1} - \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n = \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n \left[ \left( 1 + \frac{1}{n} \right) - 1 \right]$$

$$= \frac{1}{n} \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n < \frac{3}{n},$$

$$\text{因而 } 0 < e - \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n < \frac{3}{n}.$$

其次, 要  $e - \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n < 0.001$ , 只要  $\frac{3}{n} \leq 0.001$ , 即只要  $n \geq 3000$ , 所以, 当指数  $n$  是代表任一不小于 3000 的自然数, 表示式  $\left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n$  与数  $e$  之差就小于 0.001.

71. 设  $p_n (n=1, 2, \dots)$  为趋于  $+\infty$  的任意数列, 而  $q_n (n=1, 2, \dots)$  为趋于  $-\infty$  的任意数列. 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{p_n} \right)^{p_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{q_n} \right)^{q_n} = e.$$

证 令  $k_n = [p_n]$ , 即  $k_n$  表  $p_n$  的整数部分, 则

$$k_n \leq p_n < k_n + 1.$$

由于  $p_n \rightarrow +\infty$ , 故  $k_n \rightarrow +\infty$ . 从而显然  $\left( 1 + \frac{1}{k_n} \right)^{k_n} \rightarrow e$

(参看 89 题题解). 由于

$$\frac{1}{k_n} \geq \frac{1}{p_n} > \frac{1}{k_n + 1},$$

$$\left( 1 + \frac{1}{k_n} \right)^{k_n+1} > \left( 1 + \frac{1}{p_n} \right)^{p_n} > \left( 1 + \frac{1}{k_n + 1} \right)^{k_n},$$

$$\text{而 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{k_n} \right)^{k_n+1} = e,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{k_n + 1} \right)^{k_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{k_n + 1} \right)^{k_n+1}$$

$$\cdot \left( 1 + \frac{1}{k_n + 1} \right)^{-1} = e,$$

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{p_n} \right)^{p_n} = e.$$

其次, 若  $q_n \rightarrow -\infty$ , 令  $q_n = -p_n$ , 其中  $p_n \rightarrow +\infty$ .

于是,

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{q_n}\right)^{q_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)^{-p_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{p_n}{p_n - 1}\right)^{p_n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{p_n - 1}\right)^{p_n - 1} \cdot \left(1 + \frac{1}{p_n}\right) = e,\end{aligned}$$

故  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{p_n}\right)^{p_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{q_n}\right)^{q_n} = e.$

72. 已知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e,$$

求证  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!}\right) = e.$

由此推出公式

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{\theta_n}{n! n},$$

其中  $0 < \theta_n < 1$ , 并计算数  $e$  准确到  $10^{-5}$ .

证 因为  $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$   
 $\left(1 - \frac{2}{n}\right) + \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) +$   
 $\cdots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right),$

若固定  $k$ , 且  $n > k$ , 则有

$$\begin{aligned}x_n &> 2 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \cdots \\ &\quad + \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right),\end{aligned}$$

今使  $n$  趋于无穷, 在上式两边取极限, 得

$$e \geq 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{k!}.$$

由于此不等式对任何自然数  $k$  皆成立, 因此,

$$2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} \leq e.$$

另一方面,有

$$x_n < 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!}, \text{及 } x_n \rightarrow e,$$

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} \right) = e.$$

其次,设  $\omega_n = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!}$ , 则

$$\begin{aligned} 0 &< \omega_{n+m} - \omega_n = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \cdots + \frac{1}{(n+m)!} \\ &= \frac{1}{(n+1)!} \left\{ 1 + \frac{1}{n+2} + \cdots \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{(n+2)(n+3)\cdots(n+m)} \right\} < \frac{1}{(n+1)!} \\ &\quad \cdot \left\{ 1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+2)^{m-1}} \right\} \\ &< \frac{1}{(n+1)!} \left\{ 1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots \right\} \\ &= \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{n+2}{n+1}, \end{aligned}$$

今让  $n$  固定不变, 并让  $m$  趋于无穷, 取极限, 得

$$0 \leq e - \omega_n \leq \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{n+2}{n+1} = \frac{1}{n!} \cdot \frac{n+2}{(n+1)^2}.$$

由于  $\frac{n+2}{(n+1)^2} < \frac{1}{n}$ , 所以,

$$0 < e - \omega_n < \frac{1}{n!} \cdot \frac{1}{n},$$

即  $0 < e - \omega_n = \frac{\theta_n}{n! n}$ , 其中  $0 < \theta_n < 1$ ,

因而  $e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{\theta_n}{n! n}.$  (1)

下面将用公式(1)计算  $e$ , 使之准确到  $10^{-6}$ . 首先须确定怎

样选取  $n$ , 才能实现这一准确度。取  $n=8$ , 在公式(1)中的余项已是小于

$$\frac{1}{8!} \cdot 8 < 0.0000032,$$

所以弃去它时, 由公式所造成的误差远远地小于所规定的限度, 因此, 取  $n=8$  计算之。其次, 还须考虑计算每一项时的舍入误差, 为保证  $e$  准确到  $10^{-5}$ , 我们在计算每一项时, 计算到第六位小数上四舍五入凑成整数, 则舍入误差总的不超过  $\frac{1}{2 \cdot 10^6} \times 6 = \frac{3}{10^6}$ . 于是总误差不超过

$$6.2 \times 10^{-6} < 10^{-5}.$$

列表:

$$\begin{aligned}
 & 2.000000 \\
 \frac{1}{2!} &= 0.500000 \\
 \frac{1}{3!} &= 0.166667 \quad (-) \\
 \frac{1}{4!} &= 0.041667 \quad (-) \\
 \frac{1}{5!} &= 0.008333 \quad (+) \\
 \frac{1}{6!} &= 0.001389 \quad (-) \\
 \frac{1}{7!} &= 0.000198 \quad (+) \\
 \frac{1}{8!} &= 0.000025 \\
 & \hline
 & 2.718279 \quad (-)
 \end{aligned}$$

考虑到修正数的符号, 则总误差介于  $-\frac{2}{10^6}$  和  $\frac{4}{10^6}$  之间, 因而, 数  $e$  介于

2.718277 及 2.718283

之间,所以,

$$e = 2.71828 \pm 0.00001.$$

### 73. 证明数 $e$ 为无理数.

证 假设  $e$  为有理数  $\frac{m}{n}$ , 则对于这个  $n$  有公式

$$\frac{m}{n} = 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{\theta_n}{n! n} \quad (0 < \theta_n < 1).$$

在等式两端同乘以  $n!$ , 我们即得出左端是整数, 而右端是整数加一真分数  $\frac{\theta_n}{n!}$ , 但这是矛盾的. 所以数  $e$  为无理数.

### 74. 证明不等式

$$\left(\frac{n}{e}\right)^n < n! < e\left(\frac{n}{2}\right)^n.$$

证 由  $\sqrt{i(n-i)} \leq \frac{n}{2}$ , 则  $\frac{1}{2}[\ln i + \ln(n-i)] \leq \ln \frac{n}{2}$ .

从而  $\sum_{i=1}^{n-1} \ln i \leq (n-1) \ln \frac{n}{2}$ ,  $(n-1)! \leq \left(\frac{n}{2}\right)^{n-1}$ .

两边同乘以  $\frac{n}{2}$ , 得  $\frac{1}{2}n! \leq \left(\frac{n}{2}\right)^n$ . 于是

$$n! \leq 2\left(\frac{n}{2}\right)^n < e\left(\frac{n}{2}\right)^n,$$

即  $n! < e\left(\frac{n}{2}\right)^n$ .

再证  $\left(\frac{n}{e}\right)^n < n!$ .

设  $x_n = \left(\frac{n}{e}\right)^n$ , 则有

$$\frac{x_n}{x_{n-1}} = \frac{n^n}{(n-1)^{n-1} e} = \frac{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1} n}{e} < n.$$

所以 (注意到  $x_1 = \frac{1}{e} < 1$ )

$$x_n = x_1 \cdot \frac{x_2}{x_1} \cdots \frac{x_n}{x_{n-1}} < n!.$$

从而证得  $\left(\frac{n}{e}\right)^n < n!$ .

75. 证明不等式:

(a)  $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$ , 式中  $n$  为任意的自然数.

(b)  $1+a < e^a$ , 式中  $a$  为异于零的实数.

证 (a) 因为  $1 < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e$ , 两边取对数, 得

$$0 < n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 1,$$

故  $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$ ;

又因为  $e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ , 两边取对数, 得

$$1 < (n+1) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right),$$

故  $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) > \frac{1}{n+1}$ .

因而  $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$ .

(b)  $(1+x)^n \geq 1+nx$  ( $x>0, n$  为正整数).

设  $a$  为正有理数,  $a = \frac{p}{q}$ ,  $p, q$  是正整数. 则由于  $e > \left(1 + \frac{1}{q}\right)^q$ , 故  $e^a > \left(1 + \frac{1}{q}\right)^{qa} = \left(1 + \frac{1}{q}\right)^p \geq 1 + \frac{p}{q} = 1 + a$ .

至于  $a$  为任意实数 ( $\neq 0$ ) 时的证明见 1289 题(a).

76. 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(a^{\frac{1}{n}} - 1) = \ln a \quad (a > 0),$$

式中  $\ln a$  是取  $e = 2.718\cdots$  作底时数  $a$  的对数.

**证** 先设  $a > 1$ . 令  $b_n = a^{\frac{1}{n}} - 1$ , 则  $b_n > 0$ ,

且  $\frac{\ln a}{n} = \ln(1 + b_n)$ , 故

$$n(a^{\frac{1}{n}} - 1) = \ln a \frac{b_n}{\ln(1 + b_n)}.$$

由于  $b_n \rightarrow 0$ , 故存在正整数  $N$ , 使当  $n > N$  时,  $0 < b_n < 1$ . 于

是, 对每个  $n > N$ , 存在唯一正整数  $k_n$ , 使  $\frac{1}{k_n + 1} \leq b_n < \frac{1}{k_n}$ .

由于  $b_n \rightarrow 0$ , 故  $k_n \rightarrow +\infty$ . 由 75 题(a)知

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n} \quad (n=1, 2, \dots),$$

故

$$\begin{aligned} \frac{1}{k_n + 2} &< \ln\left(1 + \frac{1}{k_n + 1}\right) \leq \ln(1 + b_n) \\ &< \ln\left(1 + \frac{1}{k_n}\right) < \frac{1}{k_n}, \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} 1 - \frac{1}{k_n + 1} &= \frac{k_n}{k_n + 1} < \frac{b_n}{\ln(1 + b_n)} < \frac{k_n + 2}{k_n} \\ &= 1 + \frac{2}{k_n}, \end{aligned}$$

由于  $k_n \rightarrow +\infty$  ( $n \rightarrow \infty$ ), 故  $\frac{b_n}{\ln(1 + b_n)} \rightarrow 1$  ( $n \rightarrow \infty$ ), 由此得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(a^{\frac{1}{n}} - 1) = \ln a.$$

现设  $0 < a < 1$ . 则  $\frac{1}{a} > 1$ . 于是, 由上结果可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(a^{\frac{1}{n}} - 1) = \lim_{n \rightarrow \infty} (-a^{\frac{1}{n}}) \cdot n\left(\left(\frac{1}{a}\right)^{\frac{1}{n}} - 1\right)$$

$$= -\ln \frac{1}{a} = \ln a.$$

当  $a=1$  时,  $\lim_{n \rightarrow \infty} n(a^{\frac{1}{n}} - 1) = \ln a$  显然成立, 故此式对任何  $a > 0$  成立, 证毕.

利用关于单调而且有界的叙列的极限存在的定理, 证明以下各叙列的收敛性:

$$77. x_n = p_0 + \frac{p_1}{10} + \cdots + \frac{p_n}{10^n} \quad (n=1, 2, \dots)$$

式中  $p_i (i=0, 1, 2, \dots)$  是非负的整数, 从  $p_1$  起不大于 9.

证  $x_{n+1} = x_n + \frac{p_{n+1}}{10^{n+1}}$ , 由于  $p_{n+1} > 0$ , 所以,

$$x_{n+1} > x_n,$$

因而,  $x_n (n=1, 2, \dots)$  是单调增加的. 其次由于  $p_0 + \frac{1}{10} < x_1 \leq 9 \left( \frac{1}{10} + \cdots + \frac{1}{10^n} \right) + p_0 < 1 + p_0$ , 所以, 叙列  $x_n (n=1, 2, \dots)$  是有界的.

因而, 根据单调而且有界的叙列的极限存在的定理, 可知叙列  $\{x_n\}$  是收敛的.

$$78. x_n = \frac{10}{1} \cdot \frac{11}{3} \cdots \frac{n+9}{2n-1}.$$

解 当  $n \leq 10$  时, 虽然  $\{x_n\}$  单调增加; 但当  $n > 10$  时, 由  $\frac{n+9}{2n-1} < 1$  知叙列  $\{x_n\}$  单调减少. 注意有下界  $x_n > 0 (n=1, 2, \dots)$ . 因而, 叙列  $\{x_n\}$  收敛.

$$79. x_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{2^n}\right).$$

证 因  $x_{n+1} = x_n \cdot \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) < x_n$ , 所以, 叙列  $\{x_n\}$  是单调

减少的.

又因  $0 < x_n < 1$ , 所以, 叙列  $\{x_n\}$  是有界的. 因而  $\{x_n\}$  收敛.

80.  $x_n = \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{4}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2^n}\right).$

证 因  $x_{n+1} = x_n \cdot \left(1 + \frac{1}{2^{n+1}}\right) > x_n$ , 所以, 叙列  $\{x_n\}$  是单调增加的.

又因  $1+a < e^a$ , 所以,

$$0 < x_n < e^{\frac{1}{2}} \cdot e^{\frac{1}{4}} \cdots e^{\frac{1}{2^n}} = e^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n}} < e,$$

即叙列是有界的. 因而  $\{x_n\}$  收敛.

81.  $x_1 = \sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}}, \cdots,$

$$x_n = \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}}}_{n \text{ 重根号}}, \cdots.$$

证 叙列  $\{x_n\}$  显然是单调增加的.

其次, 利用数学归纳法可以证明:  $x_n < \sqrt{2} + 1$ . 事实上, 对于  $n=1$  是成立的. 假设  $x_k < \sqrt{2} + 1$ , 则

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= \sqrt{2 + x_k} < \sqrt{2 + \sqrt{2} + 1} \\ &< \sqrt{(\sqrt{2} + 1)^2} = \sqrt{2} + 1, \end{aligned}$$

因而, 不等式对一切自然数均成立.

由此知叙列  $\{x_n\}$  是有界的. 因而  $\{x_n\}$  收敛.

利用哥西判别法, 证明以下各叙列的收敛性:

82.  $x_n = a_0 + a_1 q + \cdots + a_n q^n,$

其中  $|a_k| < M (k=0, 1, 2, \cdots)$  且  $|q| < 1$ .

证  $|x_m - x_n| = |a_{m+1} q^{m+1} + \cdots + a_n q^n|$

$$\begin{aligned}
&\leq |a_{n+1}| + |q|^{n+1} + \cdots + |a_m| + |q|^m \\
&\leq M + |q|^{n+1}(1 + |q| + \cdots + |q|^{m-n-1}) \\
&\leq M + |q|^{n+1} \cdot \frac{1}{1 - |q|} \quad (m > n).
\end{aligned}$$

任给  $\epsilon > 0$ , 由于  $|q|^{n+1} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ , 故存在正整数  $N$ , 使当  $n > N$  时, 有

$$|q|^{n+1} < \frac{(1 - |q|)\epsilon}{M}.$$

于是, 当  $m > n > N$  时, 恒有

$$|x_m - x_n| < \epsilon.$$

由此可知, 数列  $\{x_n\}$  收敛.

$$83. x_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n}{2^n}.$$

$$\begin{aligned}
\text{证} \quad |x_m - x_n| &= \left| \frac{\sin(n+1)}{2^{n+1}} + \cdots + \frac{\sin m}{2^m} \right| \\
&\leq \frac{1}{2^{n+1}} \left( 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{m-n-1}} \right) \\
&< \frac{1}{2^{n+1}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2^n} \quad (m > n).
\end{aligned}$$

$$\text{任给 } \epsilon > 0, \text{ 取 } N = \left[ \frac{\ln \frac{1}{\epsilon}}{\ln 2} \right],$$

则当  $m > n > N$  时, 必有  $\frac{1}{2^n} < \epsilon$ , 从而  $|x_m - x_n| < \epsilon$ , 所以, 数列  $\{x_n\}$  收敛.

$$84. x_n = \frac{\cos 1!}{1 \cdot 2} - \frac{\cos 2!}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{\cos n!}{n(n+1)}.$$

$$\text{证} \quad |x_m - x_n| = \left| \frac{\cos(n+1)!}{(n+1)(n+2)} + \cdots + \frac{\cos m!}{m(m+1)} \right|$$

$$\begin{aligned}
&< \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{m^2} \\
&< \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) + \left( \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) + \cdots \\
&+ \left( \frac{1}{m-1} - \frac{1}{m} \right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n} \quad (m > n).
\end{aligned}$$

任给  $\epsilon > 0$ , 取  $N = \left[ \frac{1}{\epsilon} \right]$ , 则当  $m > n > N$  时, 必有  $|x_m - x_n| < \epsilon$ , 所以, 数列  $\{x_n\}$  收敛.

85.  $x_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$ .

证  $|x_m - x_n| = \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{m^2}, \quad (m > n)$ .

以下与 84 题证法步骤相同, 故知数列  $\{x_n\}$  收敛.

86. 若存在数  $c$ , 使得

$$|x_2 - x_1| + |x_3 - x_2| + \cdots + |x_n - x_{n-1}| < c$$

$$(n = 2, 3, \dots),$$

则称数列  $x_n (n = 1, 2, \dots)$  有有界变差.

证明 凡有有界变差的数列是收敛的.

举出一个收敛数列而无有界变差的例子.

证 设  $y_n = |x_2 - x_1| + |x_3 - x_2| + \cdots + |x_n - x_{n-1}|$   
 $(n = 2, 3, \dots)$ ,

则数列  $\{y_n\}$  单调增加且有界, 所以它是收敛的.

根据哥西收敛准则, 对于任给的  $\epsilon > 0$ , 存在数  $N$ , 使

当  $m > n > N$  时,  $|y_m - y_n| < \epsilon$ ,

即  $|x_m - x_{m-1}| + |x_{m-1} - x_{m-2}| + \cdots + |x_{n+1} - x_n| < \epsilon$ .

而对于数列  $\{x_n\}$  有

$$|x_m - x_n| = |x_m - x_{m-1} + x_{m-1} - x_{m-2} + \cdots + x_{n+1} - x_n|$$

$$+|x_{n+1}-x_n|\leq|x_m-x_{m-1}|+|x_{m-1}-x_{m-2}|+\cdots \\ +|x_{n+1}-x_n|<\varepsilon,$$

所以,叙列 $\{x_n\}$ 是收敛的.

叙列:  $1, -1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, (-1)\frac{1}{n}, \dots$ ,

它是以零为极限的收敛叙列. 但它不是有界变差的. 事实上,

$$|x_2-x_1|+|x_3-x_2|+|x_4-x_3|+\cdots \\ +|x_{2n}-x_{2n-1}|>|x_2-x_1|+|x_4-x_3|+\cdots \\ +|x_{2n}-x_{2n-1}| \\ =2\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{n}\right),$$

而叙列  $\omega_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$  是发散的<sup>\*</sup>, 又是递增的, 故  $\omega_n \rightarrow +\infty$ . 于是,

$$|x_2-x_1|+|x_3-x_2|+\cdots+|x_{2n}-x_{2n-1}|$$

不是有界的, 因而, 收敛叙列 $\{x_n\}: 1, -1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \dots$  无有界变差.

\* ) 详见 88 题的证明.

87. 试叙述“某叙列不满足哥西准则”的意义.

解 即存在某一个  $\varepsilon_0 > 0$ , 不论对于怎样的数  $N$ , 总有  $n_0 > N, m_0 > N$ , 使得

$$|x_{n_0}-x_{m_0}| \geq \varepsilon_0.$$

88. 利用哥西判别法, 证明叙列

$$x_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}$$

的发散性.

证 取  $m=2n$ , 则

$$\begin{aligned}|x_m - x_n| &= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \\&> \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \cdots + \frac{1}{2n} = \frac{1}{2},\end{aligned}$$

所以, 数列  $\{x_n\}$  发散.

89. 证明若数列  $x_n$  ( $n=1, 2, \dots$ ) 收敛, 则它的任何子数列  $x_{p_n}$  也收敛, 且有同一极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{p_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

证 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ , 则对于任给的  $\epsilon > 0$ , 存在有正整数  $N$ , 使

$$\text{当 } n > N \text{ 时, } |x_n - a| < \epsilon.$$

今因自然数数列  $\{p_n\}$  以  $+\infty$  为其极限, 所以, 对于  $N$ , 存在有正整数  $k_0$ , 使

$$\text{当 } k > k_0 \text{ 时, } p_k > N,$$

此时  $|x_{p_k} - a| < \epsilon (k > k_0)$ , 所以, 子数列  $\{x_{p_k}\}$  收敛, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{p_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

90. 证明: 若单调数列的某一子数列收敛, 则此单调数列本身是收敛的.

证 不失一般性, 假设数列  $\{x_n\}$  单调增加, 其一子数列  $\{x_{p_k}\}$  收敛于  $a$ . 则对于任给的  $\epsilon > 0$ , 存在正整数  $N$ , 使

$$\text{当 } k > N \text{ 时, } |x_{p_k} - a| < \epsilon,$$

令  $N' = p_{N+1}$ . 设  $n > N'$ , 由于  $p_1 < p_2 < p_3 < \cdots \rightarrow +\infty$ , 故必有  $p_k (k > N)$  使  $p_k \leq n < p_{k+1}$ . 由上知

$$|x_{p_k} - a| < \epsilon, |x_{p_{k+1}} - a| < \epsilon.$$

而  $x_{p_k} \leq x_n \leq x_{p_{k+1}}$  (因  $x_n$  递增), 故必  
 $|x_n - a| < \epsilon.$

由此可知  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ , 即  $\{x_n\}$  是收敛的.

91. 证明: 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |a|.$$

证 因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ , 则对于任给的  $\epsilon > 0$ , 存在有数  $N$ , 使当  $n > N$  时,  $|x_n - a| < \epsilon$ . 又因  $||x_n| - |a|| \leq |x_n - a|$ , 故当  $n > N$  时,  $||x_n| - |a|| < \epsilon$ . 于是,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |a|.$$

92. 设  $x_n \rightarrow a$ , 则极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$$

是什么?

解 按题意, 应设  $x_n \neq 0 (n = 1, 2, \dots)$ .

若  $a \neq 0$ , 则显然

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1}}{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n} = \frac{a}{a} = 1.$$

若  $a = 0$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$  可能不存在, 例如, 若  $\{x_n\}$  为:

$$1, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{2^3}, \frac{1}{2^3}, \dots$$

则  $x_n \rightarrow 0$ , 但显然  $\frac{x_{2m}}{x_{2m-1}} \rightarrow 1$ ,  $\frac{x_{2m+1}}{x_{2m}} \rightarrow \frac{1}{2}$ , 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$  不存在.

下面我们证明, 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$  存在, 设为  $b$ , 则必有  $-1 \leq b \leq 1$ .

$b \leqslant 1$ .

用反证法. 若  $|b| > 1$ . 取  $r$ , 使  $|b| > r > 1$ . 利用 91 题结果, 知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} = |b|.$$

于是, 存在正整数  $N$ , 使当  $n \geqslant N$  时, 恒有  $\frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} > r$ . 从而, 当  $n > N$  时,

$$|x_n| = |x_N| \cdot \left| \frac{x_{N+1}}{x_N} \right| \cdot \left| \frac{x_{N+2}}{x_{N+1}} \right| \cdots \left| \frac{x_n}{x_{n-1}} \right| > |x_N| \cdot r^{n-N},$$

由此可知  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ , 此与  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$  矛盾, 故必有  $-1 \leqslant b \leqslant 1$ .

总结起来, 若  $a \neq 0$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1$ ; 若  $a = 0$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$  可能存在也可能不存在, 当存在时, 它必属于  $(-1, 1)$ .

### 93. 证明收敛的数列是有界的.

证 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ . 要证  $\{x_n\}$  有界. 对于正数  $\epsilon = 1$ , 存在正整数  $N$ , 使当  $n > N$  时, 必有  $|x_n - a| < 1$ , 从而  $|x_n| < |a| + 1 (n > N)$ . 于是, 令

$$M = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_N|, |a| + 1\}.$$

则  $|x_n| \leqslant M (n = 1, 2, \dots)$ . 由此可知  $\{x_n\}$  有界.

### 94. 证明收敛的数列或达到其上确界, 或达到其下确界, 或两者都达到. 举出这三类数列的例子.

证 (1) 对于各项恒为常数的数列, 显然上、下确界均达到.

(2) 对于不恒为常数的收敛数列,

设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ , 则或存在某  $x_i > A$ , 或存在某  $x_j < A$ , 或这两种  $x_i, x_j$  都存在. 作  $A$  的充分小的邻域使它不包含  $x_i$  或  $x_j$ , 或  $x_i, x_j$  都不包含在此邻域内. 由于  $x_n \rightarrow A$ , 故在这三种情况的任一种下, 这个邻域外部都只有  $\{x_n\}$  中的有限个元素. 因此分别为必达到上确界、必达到下确界或上、下确界均必达到. 在第一种情形下确界可能达到, 也可能达不到; 在第二种情形, 上确界可能达到也可能达不到.

95. 证明趋近于  $+\infty$  的数列  $x_n (n = 1, 2, \dots)$  必定达到其下确界.

证 由题设可知存在正整数  $N$ , 使当  $n > N$  时恒有  $x_N > x_1$ , 于是, 显然,  $x_1, x_2, \dots, x_N$  中的最小者即为  $\{x_n\}$  的下确界.

求数列  $x_n (n = 1, 2, \dots)$  的最大项, 设:

$$96. x_n = \frac{n^2}{2^n}.$$

解 当  $n = 3$  时,  $n^2 > 2^n$ ; 当  $n \neq 3$  时,  $n^2 \leq 2^n$ ;

所以, 最大项为  $x_3 = \frac{9}{8}$ .

$$97. x_n = \frac{\sqrt{n}}{100 + n}.$$

解  $x_n = \frac{1}{\left(\sqrt[n]{n} - \frac{10}{\sqrt[n]{n}}\right)^2 + 20} \leq \frac{1}{20}$ , 其中  $x_{100} = \frac{1}{20}$ ,

所以, 最大项为  $x_{100} = \frac{1}{20}$ .

$$98. x_n = \frac{1000^n}{n!}.$$

解  $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1000}{n+1}$ .

当  $n+1 < 1000$  时,  $x_{n+1} > x_n$ ;

当  $n+1 > 1000$  时,  $x_{n+1} < x_n$ .

所以, 最大项为  $x_{999} = x_{1000} = \frac{1000^{1000}}{1000!}$ .

求叙列  $x_n (n=1, 2, \dots)$  的最小项, 若:

99.  $x_n = n^2 - 9n - 100.$

解 若  $n^2 - 9n \geq 0$ , 则  $n \geq 9$ ;

若  $n^2 - 9n < 0$ , 则  $0 < n < 9$ .

所以, 最小项从  $x_1$  到  $x_9$  中去寻找, 比较之, 得  $x_n$  的最小项为

$$x_4 = x_5 = -20 - 100 = -120.$$

100.  $x_n = n + \frac{100}{n}.$

解  $x_n = \left( \sqrt{n} - \frac{10}{\sqrt{n}} \right)^2 + 20 \geq 20$ , 其中  $x_{10} = 20$ ,

所以, 最小项为  $x_{10} = 20$ .

求叙列  $x_n (n=1, 2, \dots)$  的  $\inf\{x_n\}$ ,  $\sup\{x_n\}$ ,  $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$  及  $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$ , 设:

101.  $x_n = 1 - \frac{1}{n}.$

解  $\inf\{x_n\} = 0$ ;  $\sup\{x_n\} = 1$ ;

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = 1; \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = 1.$$

102.  $x_n = \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1+(-1)^n}{2}.$

解  $\inf\{x_n\} = -1$ ;  $\sup\{x_n\} = \frac{3}{2}$ ;

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = 0; \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = 1,$$

103.  $x_n = 1 + \frac{n}{n+1} \cos \frac{n\pi}{2}$ .

**解**  $x_1 = 1, x_2 = 1 - \frac{2}{3}, x_3 = 1, x_4 = 1 + \frac{4}{5}, \dots$

$$\inf\{x_n\} = 0; \quad \sup\{x_n\} = 2;$$

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 0; \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 2.$$

104.  $x_n = 1 + 2(-1)^{n+1} + 3(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$ .

**解**  $x_{4k} = 1 - 2 + 3, x_{4k+1} = 1 + 2 + 3,$

$$x_{4k+2} = 1 - 2 - 3, x_{4k+3} = 1 + 2 - 3 (k = 0, 1, 2,$$

$\dots$ ).

$$\inf\{x_n\} = -4; \quad \sup\{x_n\} = 6;$$

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = -4; \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 6.$$

105.  $x_n = \frac{n-1}{n+1} \cos \frac{2n\pi}{3}$ .

**解**  $x_1 = 0, x_2 = \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}\right), x_3 = \frac{1}{2},$

$$x_4 = \frac{3}{5}\left(-\frac{1}{2}\right), x_5 = \frac{2}{3}\left(-\frac{1}{2}\right), x_6 = \frac{5}{7},$$

$$x_7 = \frac{3}{4}\left(-\frac{1}{2}\right), x_8 = \frac{7}{9}\left(-\frac{1}{2}\right), x_9 = \frac{4}{5}, \dots$$

$$\inf\{x_n\} = -\frac{1}{2}; \quad \sup\{x_n\} = 1;$$

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = -\frac{1}{2}; \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 1.$$

106.  $x_n = (-1)^n n$ .

**解**  $\inf\{x_n\} = -\infty; \quad \sup\{x_n\} = +\infty;$

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty; \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty.$$

107.  $x_n = -n(2 + (-1)^n)$ .

解  $\inf\{x_n\} = -\infty$ ;  $\sup\{x_n\} = -1$ ;

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty; \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty.$$

108.  $x_n = n(-1)^n$ .

解  $\inf\{x_n\} = 0$ ;  $\sup\{x_n\} = +\infty$ ;

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 0; \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty.$$

109.  $x_n = 1 + n \sin \frac{n\pi}{2}$ .

解  $x_1 = 1 + 1, x_2 = 1 + 0, x_3 = 1 - 3, x_4 = 1 + 0,$

$$x_5 = 1 + 5, \dots$$

$\inf\{x_n\} = -\infty$ ;  $\sup\{x_n\} = +\infty$ ;

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty; \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty.$$

110.  $x_n = \frac{1}{n - 10.2}$ .

解 当  $n$  由 1 到 10 时,  $x_n$  由负数往下降;

当  $n$  由 11 到  $+\infty$  时,  $x_n$  由正数往下降, 所以,

$\inf\{x_n\} = x_{10} = -5$ ;  $\sup\{x_n\} = x_{11} = 1.25$ ;

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 0; \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

求  $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$  及  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ . 设:

111.  $x_n = \frac{n^2}{1+n^2} \cos \frac{2n\pi}{3}$ .

解  $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = -\frac{1}{2}$ ;  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ .

112.  $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot (-1)^n + \sin \frac{n\pi}{4}$

解  $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = -\left(e + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ ;  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = e + 1$ .

$$113. x_n = \frac{n}{n+1} \sin^2 \frac{n\pi}{4}.$$

解  $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ ;  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ .

$$114. x_n = \sqrt[2k]{1 + 2^n + (-1)^n}.$$

解  $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ ;  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$  (因  $(2^{2k} + 1)^{\frac{1}{2k}} = 2 \left(1 + \frac{1}{2^{2k}}\right)^{\frac{1}{2k}} \rightarrow 2$ ).

$$115. x_n = \cos^n \frac{2n\pi}{3}.$$

解  $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ ;  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ .

求下列各叙列的聚点:

$$116. \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{8}, \frac{7}{8}, \dots, \frac{1}{2^n}, \frac{2^n - 1}{2^n}, \dots$$

解 聚点为 0 及 1.

$$117. 1, \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{3}, \frac{1}{2} + \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, 1 + \frac{1}{4}, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{4}, \frac{1}{3} + \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots, \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}, \dots, \\ \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n}, \frac{1}{n+1}, \dots$$

解 聚点为

$$0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$$

它们分别为子叙列:

$\left\{\frac{1}{n}\right\}$ ,  $\left\{1 + \frac{1}{n}\right\}$ ,  $\left\{\frac{1}{2} + \frac{1}{n}\right\}$ ,  $\left\{\frac{1}{3} + \frac{1}{n}\right\}$ , ... 的极限.

$$118. \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \dots$$

解 所述数列正好包含  $(0, 1)$  中全部有理数, 故对于闭

区间  $[0, 1]$  上的每一点  $x$ , 在其任意的  $\varepsilon$  邻域内均有此数列中无穷个数, 因此  $x$  必可作为某子数列的极限, 所以,  $x$  是所述数列的聚点, 由此可知  $[0, 1]$  中的任何点都是所述数列的聚点, 显然,  $[0, 1]$  外的点都不是所述数列的聚点.

119.  $x_n = 3 \left( 1 - \frac{1}{n} \right) + 2(-1)^n$ .

解 因为  $2 \cdot (-1)^n$  为 2 或  $-2$ . 所以, 聚点为 5 及 1.

120.  $x_n = \frac{1}{2} [(a+b) + (-1)^n(a-b)]$ .

解 聚点为  $a$  及  $b$ .

121. 试举出以已知数

$$a_1, a_2, \dots, a_p,$$

作为聚点的数列的例子.

解 数列

$$a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = \frac{1}{2}, \dots, a_p = \frac{1}{2}, a_1 = \frac{1}{3},$$

$$a_2 = \frac{1}{3}, \dots, a_p = \frac{1}{3}, \dots, a_1 = \frac{1}{n}, a_2 = \frac{1}{n}, \dots,$$

$$a_p = \frac{1}{n}, \dots$$

显然以  $a_1, a_2, \dots, a_p$  为聚点.

122. 试举出数列的例子, 对此数列而言, 已知数列

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$$

所有各项皆为其聚点, 已知数列还必有怎样的聚点?

解 例如, 数列

$$a_1 + \frac{1}{2}, a_2 + \frac{1}{2}, a_1 + \frac{1}{3}, a_2 + \frac{1}{3}, a_3 + \frac{1}{3},$$

$$a_1 + \frac{1}{4}, a_2 + \frac{1}{4}, a_3 + \frac{1}{4}, a_4 + \frac{1}{4}, \dots,$$

$$a_1 + \frac{1}{n}, a_2 + \frac{1}{n}, a_3 + \frac{1}{n}, \dots, a_n + \frac{1}{n}, \dots$$

就以  $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$  为其聚点.

另外, 很明显, 若  $\{x_n\}$  为一数列, 使已知数列  $\{a_n\}$  的各项  $a_1, a_2, a_3, \dots$  皆为  $\{x_n\}$  的聚点, 则已知数列  $\{a_n\}$  本身的聚点也必为数列  $\{x_n\}$  的聚点.

### 123. 举出叙列的例子:

- (a) 没有有限的聚点;
- (b) 有唯一有限的聚点, 但非收敛者;
- (c) 有无限多的聚点;
- (d) 以每一实数作为聚点.

**解** (a) 叙列  $x_n = n (n = 1, 2, \dots)$  没有有限的聚点.

(b) 叙列:  $1, -1, \frac{1}{2}, -2, \frac{1}{3}, -3, \dots, \frac{1}{n}, -n, \dots$

有唯一有限的聚点 0, 但此叙列却不收敛.

(c) 118 题的叙列即有无限多的聚点.

(d) 我们按下述“对角线法则”来构造一个叙列, 使每一元素后面跟一个对应的负数, 排列顺次如图 1·1.




图 1·1

$$x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = \frac{1}{2}, x_4 = -\frac{1}{2}, x_5 = 2,$$

$$x_6 = -2, x_7 = 3, x_8 = -3, x_9 = \frac{2}{3},$$

$$x_{10} = -\frac{2}{3}, x_{11} = \frac{1}{3}, x_{12} = -\frac{1}{3}, \dots.$$

此叙列以每一实数作为其聚点, 即聚点的集合为 $(-\infty, +\infty)$ .

124. 证明叙列 $x_n$  和 $y_n = x_n \cdot \sqrt[n]{n}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 有相同的聚点.

证 因为 $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ , 所以, 叙列 $\{x_n\}$  的子叙列 $\{x_{n_k}\}$  与 $\{y_n\}$  的对应子叙列 $\{x_{n_k} \cdot \sqrt[n_k]{n_k}\}$  同时收敛, 且具有相同的极限, 此即叙列 $\{x_n\}$  和 $\{y_n\}$  有相同的聚点.

125. 证明从有界的叙列 $x_n$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 中, 永远可选出收敛的子叙列 $x_{p_n}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ).

证 因为叙列 $\{x_n\}$  有界, 故可设一切项满足不等式

$$a \leq x_n \leq b,$$

其中 $a, b$  为有限的实数, 将区间 $[a, b]$  二等分之, 得区间 $\left[a, \frac{a+b}{2}\right], \left[\frac{a+b}{2}, b\right]$ , 其中必至少有一个包含所给叙列的无限多项, 将它记成 $[a_1, b_1]$  (若两者均含无穷多项, 则任取其一作为 $[a_1, b_1]$ ). 再将区间 $[a_1, b_1]$  等分之, 又可得区间 $[a_2, b_2] \subset [a_1, b_1]$ , 它包含所给叙列的无限多项. 依次类推, 于是得一串区间:

$$[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots \supset [a_n, b_n] \supset \dots,$$

其中每一 $[a_n, b_n]$  都包含所给叙列 $\{x_n\}$  中的无限多项,

且有

$$b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty),$$

因此,根据区间套定理诸  $[a_n, b_n]$  具有唯一的公共点  $c$ , 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = c.$$

现按下法选出  $\{x_n\}$  的一个子序列  $\{x_{p_k}\}$ : 在包含于  $[a_1, b_1]$  内的诸  $x_n$  中任取一个作为  $x_{p_1}$ . 然后, 在包含于  $[a_2, b_2]$  内且在  $x_{p_1}$  后面的诸  $x_n$  中任取一个作为  $x_{p_2}$ , 然后, 又在包含于  $[a_3, b_3]$  内且在  $x_{p_2}$  后面的诸  $x_n$  中任取一个作为  $x_{p_3}$ . 余类推(这是可能的, 因为每个  $[a_k, b_k]$  中都包含有  $x_n$  无穷多项). 于是我们得出  $\{x_n\}$  的一个子数列  $\{x_{p_k}\}$ , 满足

$$a_k \leq x_{p_k} \leq b_k \quad (k = 1, 2, \dots).$$

由此, 知  $|x_{p_k} - c| \leq b_k - a_k (k = 1, 2, \dots)$ ,

故  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{p_k} = c$ . 从而  $\{x_{p_k}\}$  是  $\{x_n\}$  的一个收敛子数列.

证毕.

126. 证明: 若数列  $x_n (n = 1, 2, \dots)$  无界, 则存在子数列  $x_{p_n} (n = 1, 2, \dots)$ , 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{p_n} = \infty.$$

证 因  $x_n (n = 1, 2, \dots)$  无界, 故存在某项  $x_{p_1}$  满足  $|x_{p_1}| > 1$ . 由于数列  $x_n (n = p_1 + 1, p_1 + 2, \dots)$  也无界, 故又存在某项  $x_{p_2} (p_2 > p_1)$ , 使  $|x_{p_2}| > 2$ ; 又由于数列  $x_n (n = p_2 + 1, p_2 + 2, \dots)$  无界, 故又存在某项  $x_{p_3} (p_3 > p_2)$ , 使  $|x_{p_3}| > 3$ . 余类推. 于是, 我们得  $\{x_n\}$  的一个子数列  $\{x_{p_k}\}$ , 满足

$$|x_{p_k}| > k \quad (p = 1, 2, \dots).$$

由此可知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{p_k} = \infty.$$

证毕.

127. 设叙列  $x_n$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 收敛, 而叙列  $y_n$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 发散, 则能否断定关于叙列  
(a)  $x_n + y_n$ ; (b)  $x_n y_n$   
的收敛性?

举出适当的例子.

解 (a)  $\{x_n + y_n\}$  一定发散. 如果  $\{x_n + y_n\}$  收敛, 则由  
 $(x_n + y_n) - x_n = y_n$ , 知  $\{y_n\}$  收敛, 与题设矛盾.

(b) 叙列  $\{x_n y_n\}$  可能收敛, 也可能发散. 例如:

(1) 叙列  $x_n = \frac{1}{n}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 收敛,

叙列  $y_n = n$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 发散,

而叙列  $x_n y_n = 1$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 是收敛的.

(2) 叙列  $x_n = \frac{1}{n}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 收敛,

叙列  $y_n = n^2$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 发散,

而叙列  $x_n y_n = n$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 却是发散的.

128. 设叙列  $x_n$  和  $y_n$  发散 ( $n = 1, 2, \dots$ ). 可否断定叙列  
(a)  $x_n + y_n$ ; (b)  $x_n y_n$ .  
也发散呢?

举出适当的例子.

解 不能. 例如, 叙列

$$x_n = \frac{1 + (-1)^n}{2} \text{ 及 } y_n = \frac{1 - (-1)^n}{2} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

都发散,但数列

$$x_n + y_n = 1 \quad (n = 1, 2, \dots)$$

及

$$x_n y_n = 0 \quad (n = 1, 2, \dots)$$

却都是收敛的,

129. 设:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$$

及  $y_n (n = 1, 2, \dots)$  为任意数列,能否断定

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0?$$

举出适当的例子.

解 不能. 例如, 数列

$$x_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

及

$$y_n = n (n = 1, 2, \dots)$$

的乘积

$$x_n y_n = 1 (n = 1, 2, \dots),$$

当  $n \rightarrow \infty$  时趋于 1, 不趋于 0.

130. 设:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0.$$

是否由此可得出或  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ , 或  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$ ?

解 不能. 例如, 数列

$$x_n = \frac{1 + (-1)^n}{2} \text{ 及 } y_n = \frac{1 - (-1)^n}{2} (n = 1, 2, \dots),$$

则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$$

但  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  及  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$  均不存在.

当然, 还可举例  $x_n = \frac{1}{n^2}, y_n = n, (n = 1, 2, \dots)$ , 则  $x_n, y_n \rightarrow 0, x_n \rightarrow 0$ , 而  $\{y_n\}$  极限不存在(当  $n \rightarrow \infty$ ). 注意, 假若已知  $x_n, y_n \rightarrow 0$ , 而又已知  $\{x_n\}, \{y_n\}$  中至少有一个叙列有极限的话, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$  或  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$  至少有一个是成立的.

### 131. 证明

$$(a) \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n,$$

及

$$(b) \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \leq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

举出在上面关系式中仅不等号成立的例子.

**证** (a) 先证右端不等式. 根据定义, 存在  $\{x_n\}$  的子序列  $\{x_{n_k}\}$  使  $x_{n_k} \rightarrow \alpha = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ . 对于序列  $\{y_{n_k}\}$ , 必有子序列  $y_{n_{k_l}} \rightarrow \beta = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} y_{n_k}$ . 显然  $\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n$ . 由于  $x_{n_{k_l}} + y_{n_{k_l}} \rightarrow \alpha + \beta$ , 故  $\alpha + \beta$  是  $\{x_n + y_n\}$  的一个聚点.

由此可知

$$\alpha + \beta \geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n).$$

故得

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \leq \alpha + \beta \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

再证左端的不等式, 根据定义, 存在  $\{x_n + y_n\}$  的子序列  $\{x_{n_k} + y_{n_k}\}$  使  $x_{n_k} + y_{n_k} \rightarrow \alpha' = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n)$ .

对于序列  $\{x_{n_k}\}$ , 存在子序列  $\{x_{n_{k_l}}\}$  使  $x_{n_{k_l}} \rightarrow \beta' = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}$ , 显然  $\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} \geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ . 由于

$$y_{n_k} = (x_{n_k} + y_{n_k}) - x_{n_k} \rightarrow \alpha' - \beta'.$$

故  $\alpha' - \beta'$  是  $\{y_n\}$  的一个聚点, 从而

$$\alpha' - \beta' \geq \liminf_{n \rightarrow \infty} y_n,$$

由此可知

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = \alpha' \geq \beta' + \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

(6) 先证右端不等式. 根据定义, 存在  $\{x_n + y_n\}$  的一个子序列  $\{x_{n_k} + y_{n_k}\}$ , 使  $x_{n_k} + y_{n_k} \rightarrow r = \limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n)$ .

对于序列  $\{x_{n_k}\}$ , 存在子序列  $x_{n_{k_i}} \rightarrow \tau = \limsup_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}$ . 显然

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n. \text{ 由于}$$

$$y_{n_k} = (x_{n_k} + y_{n_k}) - x_{n_k} \rightarrow r - \tau,$$

故  $r - \tau$  是  $\{y_n\}$  的一个聚点, 从而

$$r - \tau \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

由此可知

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = r \leq \tau + \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} + \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

再证左端的不等式. 根据定义, 存在  $\{y_n\}$  的一个子序列  $\{y_{n_k}\}$ , 使  $y_{n_k} \rightarrow r' = \liminf_{n \rightarrow \infty} y_n$ . 对于序列  $\{x_{n_k}\}$ , 存在子序列  $\{x_{n_{k_i}}\}$  使  $x_{n_{k_i}} \rightarrow \tau' = \liminf_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}$ . 显然  $\liminf_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} \geq \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$ . 由于

$$x_{n_{k_i}} + y_{n_{k_i}} \rightarrow r' + \tau',$$

故  $r' + \tau'$  是  $\{x_n + y_n\}$  的一个聚点, 从而

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \geq r' + \tau'.$$

由此可知

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) \geq r' + r' \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

证毕.

以下举不等号成立的例子. 例如, 令

$$\{x_n\} \text{ 为: } 1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots$$

$$\{y_n\} \text{ 为: } 0, 2, 0, 2, 0, 2, \dots$$

则有不等式

$$\begin{aligned} \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n + \liminf_{n \rightarrow \infty} y_n &= 0 < \limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = 1 \\ &< \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n = 2. \end{aligned}$$

而对于数列

$$\{x_n\} \text{ 为: } 0, 2, 0, 2, 0, 2, \dots$$

$$\{y_n\} \text{ 为: } 1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots,$$

则有

$$\begin{aligned} \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n + \liminf_{n \rightarrow \infty} y_n &= 1 < \limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = 2 \\ &< \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n = 3. \end{aligned}$$

132. 设  $x_n \geq 0$  和  $y_n \geq 0$  ( $n = 1, 2, \dots$ ).

证明:

$$(a) \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \liminf_{n \rightarrow \infty} y_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \liminf_{n \rightarrow \infty} y_n,$$

及

$$(b) \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

举出在这些关系式中仅不等号成立的例子.

证 (a) 先证右端的不等式. 根据定义, 存在  $\{x_n\}$  的一个子序列  $\{x_{n_k}\}$ , 使  $x_{n_k} \rightarrow a = \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \geq 0$ ; 对于序列  $\{y_{n_k}\}$ , 存在子序列  $\{y_{n_{k_l}}\}$ , 使  $y_{n_{k_l}} \rightarrow \beta = \limsup_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} \geq 0$ . 显然  $\limsup_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} \leq$

$\varlimsup_{n \rightarrow \infty} y_n$ . 由于  $x_{n_k} y_{n_k} \rightarrow \alpha\beta$ , 故  $\alpha\beta$  是序列  $\{x_n y_n\}$  的一个聚点, 因此

$$\varlimsup_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) \leqslant \alpha\beta$$

由此, 再注意到  $\alpha \geqslant 0, \beta \geqslant 0$ , 即得知

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) \leqslant \alpha\beta \leqslant \alpha(\varlimsup_{n \rightarrow \infty} y_n) = (\varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n) \cdot (\varlimsup_{n \rightarrow \infty} y_n).$$

再证左端的不等式. 若  $\varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ , 则此不等式显然成立, 故设  $\varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \beta^* > 0$ . 于是, 存在正整数  $N_0$ , 使当  $n > N_0$  时,  $x_n > 0$ . 根据定义, 存在  $\{x_n y_n\}$  的子序列  $\{x_{n_k} y_{n_k}\}$  使

$$x_{n_k} y_{n_k} \rightarrow \alpha' = \varlimsup_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) \geqslant 0.$$

对于序列  $\{x_{n_k}\}$ , 存在子序列  $\{x_{n_{k_i}}\}$ , 使

$$x_{n_{k_i}} \rightarrow \beta' = \varlimsup_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}.$$

注意到  $\beta' = \varlimsup_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} \geqslant \varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n = \beta^* > 0$  以及  $x_n > 0 (n > N_0)$ ,

知

$$y_{n_{k_i}} = (x_{n_{k_i}} y_{n_{k_i}}) \cdot \frac{1}{x_{n_{k_i}}} \rightarrow \frac{\alpha'}{\beta'}.$$

故  $\frac{\alpha'}{\beta'}$  是  $\{y_n\}$  之一聚点, 从而

$$\frac{\alpha'}{\beta'} \geqslant \varlimsup_{n \rightarrow \infty} y_n,$$

由此可知

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = \alpha' \geqslant \beta' (\varlimsup_{n \rightarrow \infty} y_n) \geqslant (\varliminf_{n \rightarrow \infty} x_n) \cdot (\varlimsup_{n \rightarrow \infty} y_n).$$

(6) 先证右端不等式, 可设  $\{y_n\}$  有界(若  $\{y_n\}$  无界, 则  $\limsup_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$ , 从而此不等式显然成立)。根据定义, 存在  $\{x_n y_n\}$  的子序列  $\{x_{n_k} y_{n_k}\}$  使

$$x_{n_k} y_{n_k} \rightarrow \bar{\alpha} = \limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) \geq 0.$$

对于  $\{x_{n_k}\}$ , 存在子序列  $\{x_{n_{k_i}}\}$  使

$$x_{n_{k_i}} \rightarrow \bar{\beta} = \limsup_{i \rightarrow \infty} x_{n_{k_i}} \geq 0.$$

若  $\bar{\beta} = 0$ , 则由于  $\{y_n\}$  有界, 知  $x_{n_{k_i}} y_{n_{k_i}} \rightarrow 0$ , 从而  $\bar{\alpha} = 0$ , 此时所要证的不等式显然成立, 故下设  $\bar{\beta} > 0$ . 于是, 当  $i$  充分大时 ( $i > i_0$ ),  $x_{n_{k_i}} > 0$ , 故得

$$y_{n_{k_i}} = (x_{n_{k_i}} y_{n_{k_i}}) \cdot \frac{1}{x_{n_{k_i}}} \rightarrow \frac{\bar{\alpha}}{\bar{\beta}}.$$

因此,  $\frac{\bar{\alpha}}{\bar{\beta}}$  是  $\{y_n\}$  之一聚点, 从而  $\frac{\bar{\alpha}}{\bar{\beta}} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n$ ; 由此可知

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = \bar{\alpha} \leq \bar{\beta} (\limsup_{n \rightarrow \infty} y_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot (\limsup_{n \rightarrow \infty} y_n).$$

再证左端的不等式. 根据定义, 存在  $\{y_n\}$  的一子序列  $\{y_{n_k}\}$ , 使  $y_{n_k} \rightarrow r = \liminf_{n \rightarrow \infty} y_n \geq 0$ , 对于  $\{x_{n_k}\}$ , 存在子序列  $\{x_{n_{k_i}}\}$  使

$$x_{n_{k_i}} \rightarrow \tau = \liminf_{i \rightarrow \infty} x_{n_{k_i}} \geq 0.$$

显然,  $\liminf_{i \rightarrow \infty} x_{n_{k_i}} \geq \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \geq 0$ . 由于

$$x_{n_{k_i}} y_{n_{k_i}} \rightarrow \tau r,$$

故  $\tau r$  是  $\{x_n y_n\}$  之一聚点, 从而

$$\tau r \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n),$$

由此可知

$$(\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n) \cdot (\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n) \leqslant \tau r \leqslant \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n).$$

证毕.

下面举不等号成立的例子,例如,令

$$\{x_n\} \text{ 为: } \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{2}, 2, \dots$$

$$\{y_n\} \text{ 为: } 2, \frac{1}{4}, 2, \frac{1}{4}, 2, \frac{1}{4}, \dots$$

则有不等式

$$\begin{aligned} (\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n) \cdot (\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n) &= \frac{1}{8} < \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) \\ &= \frac{1}{2} < (\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n) \cdot (\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n) = 1. \end{aligned}$$

再令

$$\{x_n\} \text{ 为: } 2, \frac{1}{4}, 2, \frac{1}{4}, 2, \frac{1}{4}, \dots$$

$$\{y_n\} \text{ 为: } \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{2}, 2, \dots$$

则有不等式

$$\begin{aligned} (\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n) \cdot (\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n) &= \frac{1}{2} < \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) \\ &= 1 < (\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n) \cdot (\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n) = 4. \end{aligned}$$

133. 证明:若  $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在,则对任何的数列  $y_n (n = 1, 2, \dots)$ , 有

$$(a) \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n$$

及

$$(b) \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n (x_n \geq 0).$$

证 (a) 由于  $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在,故

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n,$$

从而,利用 131 题的结果可知

$$\begin{aligned}
 \limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) &\leq \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n \\
 &= \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n),
 \end{aligned}$$

故得

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

(6) 分三种情形:(i) 设  $y_n \geq 0 (n = 1, 2, \dots)$ . 则利用 132 题的结果可知

$$\begin{aligned}
 \limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) &\leq (\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n) \cdot (\limsup_{n \rightarrow \infty} y_n) \\
 &= (\lim_{n \rightarrow \infty} x_n) \cdot (\limsup_{n \rightarrow \infty} y_n) \\
 &= (\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n) \cdot (\limsup_{n \rightarrow \infty} y_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n),
 \end{aligned}$$

故得

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = (\lim_{n \rightarrow \infty} x_n) \cdot (\limsup_{n \rightarrow \infty} y_n).$$

(ii) 设  $y_n \leq 0 (n = 1, 2, \dots)$ . 则  $-y_n \geq 0 (n = 1, 2, \dots)$ , 于是, 仍利用 132 题的结果可知

$$\begin{aligned}
 \limsup_{n \rightarrow \infty} (-x_n y_n) &\leq \limsup_{n \rightarrow \infty} (-y_n) \cdot \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} (-y_n) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} (-y_n) \cdot \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} (-x_n y_n),
 \end{aligned}$$

故得

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (-x_n y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \limsup_{n \rightarrow \infty} (-y_n),$$

但是根据上、下极限的定义, 显然有等式

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (-x_n y_n) = -\limsup_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n),$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (-y_n) = -\limsup_{n \rightarrow \infty} y_n,$$

由此可知

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

(iii) 设  $\{y_n\}$  中有无穷多项是非负的, 设这些项构成的子序列为  $\{y_{n_k}\}$  ( $y_{n_k} \geq 0, k = 1, 2, \dots$ ) (如果  $\{y_n\}$  中只有有限项是非负的, 则从某一项开始有  $y_n < 0$ , 这时应用(ii) 的结果即知所要证的等式成立). 于是, 注意到  $x_n \geq 0$ , 显然有(利用(i) 已证的结果)

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) &= \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} (x_{n_k} y_{n_k}) \\&= \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} \cdot \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} \\&= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n.\end{aligned}$$

证毕.

134. 证明: 若对于某非负<sup>\*)</sup> 数列  $x_n$  ( $x_n \geq 0, n = 1, 2, \dots$ ), 任何数列  $y_n$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 都使下二等式中至少有一成立:

(a)  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n$

或

(b)  $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n,$

则数列  $x_n$  是收敛的.

证 取  $\{x_n\}$  的子数列  $\{x_{n_k}\}$ , 使

$$x_{n_k} \rightarrow \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

取

$$y_n = \begin{cases} -x_n, & \text{当 } n \neq n_k \text{ 时}, \\ A, & \text{当 } n = n_k \text{ 时}, \end{cases} \quad (k = 1, 2, \dots),$$

其中  $A$  为任取的正常数, 对此  $\{y_n\}$  若(a) 成立, 则由(注意到  $x_n \geq 0$ )

$$\varlimsup_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = (\varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n) + A, \quad \varlimsup_{n \rightarrow \infty} y_n = A,$$

知

$$(\varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n) + A = (\varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n) + A,$$

由此可知

$$\varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n,$$

故  $\{x_n\}$  收敛.

若  $(\sigma)$  成立, 则由(同样, 注意到  $x_n \geq 0$ )

$$\varlimsup_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = A \cdot \varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n$$

知

$$A \cdot \varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n = A \cdot \varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n,$$

由此可知

$$\varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n,$$

故  $\{x_n\}$  也是收敛的. 证毕.

\* ) 编者注: 原著中将  $x_n \geq 0$  的假定加在条件(6)后, 似不妥, 因为叙列  $x_n$  应该是预先给定的.

135. 证明: 若  $x_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$  及

$$\varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \varlimsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = 1,$$

则叙列  $x_n$  是收敛的.

证 由假定知

$$0 < \varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n < +\infty, 0 < \varlimsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} < +\infty, (*)$$

由于(利用 132 题的结果)

$$1 = \varlimsup_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot \frac{1}{x_n}) \leqslant (\varlimsup_{n \rightarrow \infty} x_n) \cdot (\varlimsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n})$$

$$\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n + \frac{1}{x_n}) = 1,$$

故

$$(\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n) \cdot (\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n}) = 1,$$

从而

$$(\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n) \cdot (\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n}) = (\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n) \cdot (\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n}).$$

由此,再注意到(\*)式,即知

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad (0 < a < +\infty).$$

故  $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在有限,因此  $\{x_n\}$  收敛,证毕.

136. 证明:若数列  $x_n (n = 1, 2, \dots)$  有界,且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0,$$

则此数列的聚点密布于下极限和上极限

$$l = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ 和 } L = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$$

之间,即是说间隔  $(l, L]$  中的任意一个数都是已知数列的聚点.

证 根据定义,  $l$  与  $L$  都是  $\{x_n\}$  的聚点,故我们只要证明  $l$  与  $L$  之间的任何数  $a (l < a < L)$  都是  $\{x_n\}$  的聚点. 先证:对于任意给定的  $\epsilon > 0$  及任意给定的正整数  $N$ ,必有正整数  $n' > N$  存在,使  $|x_{n'} - a| < \epsilon$ .

由假定,必有正整数  $N'$ ,存在,使当  $n > N'$  时,恒有  $|x_{n+1} - x_n| < \epsilon$ . 令  $N_0 = \max\{N, N'\}$ , 则于序列  $x_n (n = N_0 + 1, N_0 + 2, \dots)$  中必至少有两项  $x_{n'}$  和  $x_{n''}$  存在,使  $x_{n'} < a, x_{n''} > a$  (因为否则的话,例如,无小于  $a$  的项,则必  $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \geq a$ ,此与  $l < a$  矛盾),不妨设  $n' < n''$ ,令

满足  $n' \leq n \leq n''$  且使  $x_n < a$  的正整数  $n$  中之最大者为  $n^*$ . 显然  $n^* \leq n'' - 1$ , 且  $x_{n^*} < a, x_{n^*+1} > a$ . 故  $n^* > N$ ,  $n^* > N'$  并且

$$|x_{n^*} - a| < x_{n^*+1} - x_{n^*} < \epsilon.$$

现取  $\epsilon_1 = 1, N_1 = 1$ , 则存在  $x_{n_1}$  ( $n_1 > 1$ ) 使  $|x_{n_1} - a| < 1$ ; 再取  $\epsilon_2 = \frac{1}{2}, N_2 = n_1$ , 则存在  $x_{n_2}$  ( $n_2 > n_1$ ) 使  $|x_{n_2} - a| < \frac{1}{2}$ ; 又取  $\epsilon_3 = \frac{1}{3}, N_3 = n_2$ , 存在  $x_{n_3}$  ( $n_3 > n_2$ ) 使  $|x_{n_3} - a| < \frac{1}{3}$ ; 这样一直继续下去, 则得  $\{x_n\}$  的一个子数列  $\{x_{n_k}\}$ , 满足

$$|x_{n_k} - a| < \frac{1}{k} \quad (k = 1, 2, \dots),$$

故  $x_{n_k} \rightarrow a$ , 即  $a$  是  $\{x_n\}$  的一个聚点, 证毕.

137. 设数列  $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$  满足条件

$$0 \leq x_{n+m} \leq x_m + x_n \quad (m, n = 1, 2, \dots)$$

证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n}$  存在.

证 证法一:

由于

$$x_n \leq x_{n-1} + x_1 \leq x_{n-2} + x_1 + x_1 \leq \dots \leq nx_1,$$

故  $0 \leq \frac{x_n}{n} \leq x_1$ , 从而数列  $\left\{\frac{x_n}{n}\right\}$  有界, 令  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = a$ , 则  $0$

$\leq a \leq x_1$ , 任给  $\epsilon > 0$ , 存在正整数  $N > 1$  使  $\frac{x_N}{N} < a + \epsilon$ .

任何正整数  $n > N$  都可表为  $n = qN + r$  的形式, 其中  $q$  为正整数,  $r$  为小于  $N$  的非负整数 ( $0 \leq r < N$ ).

我们有

$$\begin{aligned}
x_n = x_{qN+r} &\leqslant x_{(q-1)N} + x_N + x_r \leqslant x_{(q-2)N} + x_N + \\
&+ x_N + x_r \leqslant \cdots \leqslant qx_N + x_r \leqslant qx_N + rx_1 \\
&\leqslant qx_N + Nx_1,
\end{aligned}$$

从而

$$\frac{x_n}{n} \leqslant \frac{qx_N}{n} + \frac{Nx_1}{n} \leqslant \frac{x_N}{N} + \frac{Nx_1}{n} < a + \epsilon + \frac{Nx_1}{n}.$$

由此可知

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} \leqslant a + \epsilon,$$

再根据  $\epsilon > 0$  的任意性, 即得

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} \leqslant a,$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n},$$

因此,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n}$  存在有限.

证法二:

用反证法. 假定  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n}$  不存在, 则序列  $\left\{\frac{x_n}{n}\right\}$  至少有两个聚点  $a$  与  $b$ , 不妨设  $a < b$ , 由于(证法一中已证)

$$0 \leqslant \frac{x_n}{n} \leqslant x_1 \quad (n = 1, 2, \dots),$$

故  $0 \leqslant a < b \leqslant x_1$ . 根据聚点定义, 存在  $\{x_n\}$  的两个子序列  $\{x_{n_i}\}$  与  $\{x_{m_j}\}$ , 使

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \frac{x_{n_i}}{n_i} = a, \quad \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{x_{m_j}}{m_j} = b.$$

任给  $\epsilon < 0$ , 必存在正整数  $i_0 > 1$ , 使

$$\frac{x_{n_{i_0}}}{n_{i_0}} < a + \epsilon.$$

显然, 当  $j$  充分大时 ( $j > j_0$ ), 必  $m_j > n_{i_0}$ , 此时仿证法一, 有不等式 ([ $x$ ] 表  $x$  的整数部分)

$$x_{m_j} \leq \left[ \frac{m_j}{n_{i_0}} \right] x_{n_{i_0}} + n_{i_0} x_1 \leq \frac{m_j}{n_{i_0}} x_{n_{i_0}} + n_{i_0} x_1,$$

故 ( $j > j_0$  时)

$$\frac{x_{m_j}}{m_j} \leq \frac{x_{n_{i_0}}}{n_{i_0}} + \frac{n_{i_0} x_1}{m_j} < a + \epsilon + \frac{n_{i_0} x_1}{m_j},$$

由此可知

$$b = \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{x_{m_j}}{m_j} \leq a + \epsilon.$$

由  $\epsilon > 0$  的任意性, 即得  $b \leq a$ , 此与  $a < b$  矛盾, 证毕.

138. 证明: 若数列  $x_n$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 收敛, 则算术平均值的数列

$$\xi_n = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \dots + x_n) \quad (n = 1, 2, \dots)$$

也收敛, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

反之, 则结论不真, 举例说明之.

证 令  $s_n = x_1 + x_2 + \dots + x_n$ , 则

$$\begin{aligned} \frac{s_n}{n} &= \frac{s_N}{n} + \frac{s_n - s_N}{n} = \frac{s_N}{n} + \frac{x_{N+1} + x_{N+2} + \dots + x_n}{n - N} \\ &\cdot \left(1 - \frac{N}{n}\right). \end{aligned}$$

因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在, 设收敛于  $a$ , 则对于任给的  $\epsilon > 0$  存在序

号  $N$ , 使当  $n > N$  时,  $|x_n - a| < \epsilon$ , 即  $x_{N+1}, x_{N+2}, \dots$  均  $\in (a - \epsilon, a + \epsilon)$ . 由此推得  $\frac{x_{N+1} + x_{N+2} + \dots + x_n}{n - N}$  也含在  $(a - \epsilon, a + \epsilon)$  之内, 即

$$\frac{x_{N+1} + x_{N+2} + \dots + x_n}{n - N} = a + \alpha,$$

式中  $|\alpha| < \epsilon$ .

这样,  $\frac{s_n}{n} = \frac{s_N}{n} + (a + \alpha)(1 - \frac{N}{n})$ . 由此得

$$\left| \frac{s_n}{n} - a \right| \leq \frac{|s_N|}{n} + |\alpha| + (|a| + |\alpha|) \frac{N}{n}.$$

今取  $N' > N$ , 使当  $n > N'$  时, 恒有

$$\frac{|s_N|}{n} < \epsilon, \quad \frac{N}{n} < \frac{\epsilon}{|a| + \epsilon}.$$

于是, 当  $n > N'$  时, 恒有  $\left| \frac{s_n}{n} - a \right| < 3\epsilon$ .

由此可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{s_n}{n} = a,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

但反之不然, 例如数列  $x_n = (-1)^{n+1}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 是发散的, 但是数列

$$\zeta_n = \begin{cases} 0, & \text{若 } n \text{ 为偶数,} \\ -\frac{1}{n}, & \text{若 } n \text{ 为奇数,} \end{cases}$$

却是收敛的.

### 139. 证明: 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty,$$

则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = +\infty$ .

证 因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ , 故对于任给的  $M > 0$ , 存在有序号  $N$ , 使当  $n > N$  时,  $x_n > 3M$ . 此时, 仿 138 题之证, 有

$$\frac{s_n}{n} = \frac{s_N}{n} + \frac{s_n - s_N}{n - N} \left(1 - \frac{N}{n}\right) > \frac{s_N}{n} + 3M \left(1 - \frac{N}{n}\right).$$

又因  $\frac{s_N}{n} \rightarrow 0, 1 - \frac{N}{n} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$ , 故可取正整数  $N' > N$ , 使当  $n > N'$  时, 恒有

$$\frac{|s_n|}{n} < \frac{M}{2}, \quad 1 - \frac{N}{n} > \frac{1}{2}.$$

于是, 当  $n > N'$  时恒有  $\frac{s_n}{n} > M$ , 由此可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{s_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = +\infty.$$

140. 证明: 若数列  $x_n (n = 1, 2, \dots)$  收敛, 且  $x_n > 0$ ,

则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

证 设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ . 因  $x_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$ , 故  $a \geq 0$ . 先设  $a > 0$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln x_n = \ln a$ , 于是, 利用 138 题的结果可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (\ln x_1 + \ln x_2 + \dots + \ln x_n) = \ln a.$$

由此可知

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n} (\ln x_1 + \ln x_2 + \dots + \ln x_n)} \\ &= e^{\ln a} = a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n. \end{aligned}$$

若  $a = 0$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} (-\ln x_n) = +\infty$ . 利用 139 题的结果可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (-\ln x_1 - \ln x_2 - \dots - \ln x_n) = +\infty,$$

由此可知

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{1}{n}(-\ln x_1 - \ln x_2 - \cdots - \ln x_n)} \\ &= 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n.\end{aligned}$$

证毕.

141. 证明: 若  $x_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$  且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$  存在, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}.$$

证 令  $y_n = \frac{x_{n+1}}{x_n} (n = 1, 2, \dots)$ , 则  $y_n > 0$ . 由假定  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$  存在, 设为  $a$ . 利用 140 题的结果可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (y_1 y_2 \cdots y_{n-1})^{\frac{1}{n-1}} = a.$$

于是

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_1 \sqrt[n]{\frac{x_2}{x_1} \frac{x_3}{x_2} \cdots \frac{x_n}{x_{n-1}}}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_1} \left( (y_1 y_2 \cdots y_{n-1})^{\frac{1}{n-1}} \right)^{\frac{n-1}{n}} \\ &= 1 \cdot a = a = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}.\end{aligned}$$

142. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e.$$

证 设数列  $x_n = \frac{n^n}{n!} (n = 1, 2, \dots)$  则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n = e,$$

所以, 利用 141 题的结果, 即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = e.$$

143. 证明: 若

$$(a) y_{n+1} > y_n (n = 1, 2, \dots),$$

$$(b) \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty,$$

$$(c) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}$$
 存在,

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}.$$

证 假定  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = a$ . 由此, 并注意到  $y_n \rightarrow +\infty$ ,

知对于任给的  $\epsilon > 0$ , 存在有序号  $N$ , 使当  $n > N$  时, 恒有

$$\left| \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} - a \right| < \frac{\epsilon}{2} (\text{且 } y_n > 0).$$

于是分数(当  $n > N$  时)

$$\frac{x_{N+2} - x_{N+1}}{y_{N+2} - y_{N+1}}, \frac{x_{N+3} - x_{N+2}}{y_{N+3} - y_{N+2}}, \dots,$$

$$\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}, \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}$$

都包含在  $(a - \frac{\epsilon}{2}, a + \frac{\epsilon}{2})$  之内, 因为  $y_{n+1} > y_n$ , 所以, 这

些分数的分母都是正数, 于是得

$$(a - \frac{\epsilon}{2})(y_{N+2} - y_{N+1}) < x_{N+2} - x_{N+1}$$

$$< (a + \frac{\epsilon}{2})(y_{N+2} - y_{N+1}),$$

$$(a - \frac{\epsilon}{2})(y_{N+3} - y_{N+2}) < x_{N+3} - x_{N+2}$$

$$< (a + \frac{\epsilon}{2})(y_{N+3} - y_{N+2}),$$

.....

$$\begin{aligned}(a - \frac{\epsilon}{2})(y_{n+1} - y_n) &< x_{n+1} - x_n \\ &< (a + \frac{\epsilon}{2})(y_{n+1} - y_n),\end{aligned}$$

相加之, 得

$$\begin{aligned}(a - \frac{\epsilon}{2})(y_{n+1} - y_{n+1}) &< x_{n+1} - x_{N+1} \\ &< (a + \frac{\epsilon}{2})(y_{n+1} - y_{N+1}),\end{aligned}$$

即  $a - \frac{\epsilon}{2} < \frac{x_{n+1} - x_{N+1}}{y_{n+1} - y_{N+1}} < a + \frac{\epsilon}{2}$ ,

所以, 当  $n > N$  时, 恒有

$$\left| \frac{x_{n+1} - x_{N+1}}{y_{n+1} - y_{N+1}} - a \right| < \frac{\epsilon}{2}.$$

另外, 我们有(当  $n > N$  时)

$$\begin{aligned}\frac{x_n}{y_n} - a &= \frac{x_{N+1} - ay_{N+1}}{y_n} + \left(1 - \frac{y_{N+1}}{y_n}\right) \\ &\quad \cdot \left(\frac{x_n - x_{N+1}}{y_n - y_{N+1}} - a\right),\end{aligned}$$

故

$$\left| \frac{x_n}{y_n} - a \right| \leq \left| \frac{x_{N+1} - ay_{N+1}}{y_n} \right| + \frac{\epsilon}{2}.$$

现取正整数  $N' > N$ , 使当  $n > N'$  时, 恒有

$$\left| \frac{x_{N+1} - ay_{N+1}}{y_n} \right| < \frac{\epsilon}{2}$$

于是, 当  $n > N'$  时, 恒有

$$\left| \frac{x_n}{y_n} - a \right| < \epsilon.$$

由此可知,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = a = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}$ .

注. 本题中, 若将条件(b) 换为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = +\infty \text{ (或 } -\infty)$$

则结论仍成立:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}.$$

详见 Г. М. 菲赫金哥尔茨著《微积分学教程》第一章  
§ 2.

144. 求(a)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{a^n}$  ( $a > 1$ );

(b)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg n}{n}$ .

解 (a) 设  $x_n = n^2, y_n = a^n$  ( $a > 1$ )

则  $y_{n+1} > y_n, y_n \rightarrow +\infty$ , 且有

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = \frac{(n+1)^2 - n^2}{a^{n+1} - a^n} = \frac{2n+1}{a^n(a-1)}.$$

再设  $x'_n = 2n+1, y'_n = a^n$ ,

则  $y'_{n+1} > y'_n, y'_n \rightarrow +\infty$ , 且有

$$\frac{x'_{n+1} - x'_n}{y'_{n+1} - y'_n} = \frac{2}{a^n(a-1)} \rightarrow 0,$$

因而利用 143 题的结果得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{a^n} = 0,$$

即  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = 0$

继续利用 143 题的结果, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 0,$$

即  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{a^n} = 0$ .

(6) 设  $x_n = \lg n$ ,  $y_n = n$ ,

则  $y_{n+1} > y_n$ ,  $y_n \rightarrow +\infty$ , 且有

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = \lg \left( 1 + \frac{1}{n} \right) \rightarrow 0,$$

故  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg n}{n} = 0.$

注 143 题的结果属于 O. Stolz, 当  $y_n = n$  时, 早已被 A. L. Cauchy 所证明, 此结果常用于确定  $\frac{\infty}{\infty}$  型的待定式

$\frac{x_n}{y_n}$  的极限, 144 题即是一例. 应用此结果, 也可证明 138 题及 139 题的结果(此结果属于哥西 Cauchy). 事实上,

令

$$x'_n = x_1 + x_2 + \cdots + x_n, y'_n = n,$$

则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x'_n}{y'_n}$   
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x'_{n+1} - x'_n}{y'_{n+1} - y'_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$

145. 证明: 若  $p$  为自然数, 则

$$(a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}} = \frac{1}{p+1},$$

$$(b) \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^p} - \frac{n}{p+1} \right| = \frac{1}{2},$$

$$(c) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 3^p + \cdots + (2n-1)^p}{n^{p+1}} = \frac{2^p}{p+1}.$$

证 (a) 令  $x_n = 1^p + 2^p + \cdots + n^p$ ,  $y_n = n^{p+1}$ ,

则  $y_{n+1} > y_n$ ,  $y_n \rightarrow +\infty$ , 且有

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = \frac{(n+1)^p}{(n+1)^{p+1} - n^{p+1}} = \frac{(n+1)^p}{(p+1)n^p} + \cdots$$

$$= \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^p}{p+1 + o\left(\frac{1}{n}\right)} \rightarrow \frac{1}{p+1},$$

式中  $\lim_{n \rightarrow \infty} o\left(\frac{1}{n}\right) = 0$  为无穷小, 以下不再说明,

故  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \dots + n^p}{n^{p+1}} = \frac{1}{p+1}.$

(6) 令  $x_n = (p+1)(1^p + 2^p + \dots + n^p) - n^{p+1}$ ,

$$y_n = (p+1)n^p,$$

则  $y_{n+1} > y_n$ ,  $y_n \rightarrow +\infty$ , 且有

$$\begin{aligned} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} &= \frac{(p+1)(n+1)^p [n^{p+1} - (n+1)^{p+1}]}{(p+1)[(n+1)^p - n^p]} \\ &= \frac{\frac{p(p+1)}{2} n^{p-1} + \dots}{p(p+1)n^{p-1} + \dots}. \end{aligned}$$

当  $n \rightarrow \infty$  时,  $\frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} \rightarrow \frac{1}{2}$ , 所以,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1^p + 2^p + \dots + n^p}{n^p} - \frac{n}{p+1} \right) = \frac{1}{2}.$$

(B) 令  $x_n = 1^p + 3^p + \dots + (2n-1)^p$ ,  $y_n = n^{p+1}$ ,

则  $y_{n+1} > y_n$ ,  $y_n \rightarrow +\infty$ , 且有

$$\begin{aligned} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} &= \frac{(2n+1)^p}{(n+1)^{p+1} - n^{p+1}} = \frac{(2n+1)^p}{(p+1)n^p + \dots} \\ &= \frac{\left(2 + \frac{1}{n}\right)^p}{p+1 + o\left(\frac{1}{n}\right)} \rightarrow \frac{2^p}{p+1}, \end{aligned}$$

所以,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 3^p + \dots + (2n-1)^p}{n^{p+1}}$$

$$= \frac{2^p}{p+1},$$

146. 证明: 叙列

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \quad (n=1, 2, \dots)$$

收敛.

因此有公式

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} = C + \ln n + \epsilon_n,$$

式中  $C = 0.577216\dots$  称为尤拉常数, 且当  $n \rightarrow \infty$  时,  $\epsilon_n \rightarrow 0$ .

证 因为  $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$ .

故  $\ln(n+1) - \ln n < \frac{1}{n}$ ,

令  $n=1, 2, 3, \dots, n$  得出

$$\ln 2 - \ln 1 < 1,$$

$$\ln 3 - \ln 2 < \frac{1}{2},$$

$$\ln 4 - \ln 3 < \frac{1}{3},$$

.....

$$\ln(n+1) - \ln n < \frac{1}{n},$$

相加之得

$$\ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

于是,

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) \\ &> \frac{1}{n+1} > 0, \end{aligned}$$

即 $\{x_n\}$ 是一个有下界的数列，其次，

$$\begin{aligned}x_n - x_{n+1} &= -\frac{1}{n+1} + \ln(n+1) - \ln n \\&= \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n+1},\end{aligned}$$

因为 $-\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ <sup>(\*)</sup>，所以 $x_n - x_{n+1} > 0$ ，这就是说， $\{x_n\}$ 又是一个单调下降的数列，因而 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在，用 $C$ 表示之，即

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n\right),$$

它的近似值为 0.577216. 或表成

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} = C + \ln n + \varepsilon_n,$$

其中  $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$ .

\* ) 及 \* \* ) 利用 75 题(a) 的结果.

147. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right).$$

解 因为

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} = C + \ln n + \varepsilon_n, \quad (1)$$

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2n} = C + \ln 2n + \varepsilon_{2n}, \quad (2)$$

其中 $C$ 为尤拉常数， $\varepsilon_n \rightarrow 0, \varepsilon_{2n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ .

(2)式减(1)式得

$$\begin{aligned}\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} &= \ln 2n - \ln n + (\varepsilon_{2n} - \varepsilon_n) \\&= \ln 2 + (\varepsilon_{2n} - \varepsilon_n) \rightarrow \ln 2 (n \rightarrow \infty),\end{aligned}$$

所以，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \right) = \ln 2.$$

148. 数列  $x_n (n=1, 2, \dots)$  是由下列各式

$$x_1=a, x_2=b, x_n=\frac{x_{n-1}+x_{n-2}}{2} (n=3, 4, \dots)$$

所确定. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

解 由于

$$\begin{aligned} x_{n+1}-x_n &= \frac{x_n+x_{n-1}}{2}-x_n = \frac{x_{n-1}-x_n}{2} \\ &= \dots = \frac{x_2-x_1}{(-2)^{n-1}} = \frac{b-a}{(-2)^{n-1}} \end{aligned}$$

及

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= \sum_{m=1}^n (x_{m+1}-x_m) + x_1 \\ &= (b-a) \sum_{m=1}^n \frac{1}{(-2)^{m-1}} + a, \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{b-a}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)} + a = \frac{a+2b}{3}.$$

149. 设  $a>0$  和  $x_n (n=1, 2, \dots)$  为由以下各式

$$x_0>0, x_{n+1}=\frac{1}{2} \left( x_n + \frac{a}{x_n} \right) (n=0, 1, 2, \dots)$$

所确定的数列. 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{a}.$$

证 由  $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( \sqrt{x_n} + \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{x_n}} \right)^2 + \sqrt{a} \geq \sqrt{a}$   
 $(n=0,1,2,\dots)$ ,

则  $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2} \left( \frac{a}{x_n} - x_n \right) \leq 0.$

知  $\{x_n\}$  为单调下降的有界数列, 必有极限存在。设其极限为  $l$ , 则  $l \geq \sqrt{a} > 0$ , 对于等式

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{a}{x_n} \right)$$

两端取极限, 即得

$$l = \frac{1}{2} \left( l + \frac{a}{l} \right),$$

解之得

$$l = \sqrt{a} \text{ (负值不合适),}$$

故证得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{a}.$$

### 150. 证明由下列各式

$$x_1 = a, y_1 = b, x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}, y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2},$$

确定的数列  $x_n$  和  $y_n$  ( $n=1,2,\dots$ ) 有公共的极限

$$\mu(a,b) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$$

(数  $a$  和  $b$  的算术—几何平均数).

证 分两种情形:

1)  $a$  与  $b$  中至少有一个为零, 例如, 设  $a=0$ . 则显然有  $x_n$

$= 0 (n=1,2,\dots)$ ,  $y_{n+1} = \frac{y_n}{2}$ , 从而, 递推得

$$y_n = \frac{b}{2^{n-1}} (n=1,2,\dots).$$

由此可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

2) 设  $a \neq 0, b \neq 0$ . 这时, 必须  $a > 0, b > 0$ . 否则, 若  $ab < 0$ , 则  $x_2 = ab$  没有意义; 若  $a < 0, b < 0$ , 则  $x_2 = \sqrt{ab} > 0, y_2 = \frac{a+b}{2} < 0$ , 从而  $x_3 = \sqrt{x_2 y_2}$  没有意义. 因此, 必须  $a > 0, b > 0$ . 不妨假定  $a \leq b$ . 由于两正数的等比中项不超过它们的等差中项, 并且都界于原来两数之间, 故有

$$a \leq x_2 \leq y_2 \leq b,$$

由此又有

$$a \leq x_2 \leq x_3 \leq y_3 \leq y_2 \leq b.$$

应用数学归纳法可知一般有

$$a \leq x_n \leq x_{n+1} \leq y_{n+1} \leq y_n \leq b \quad (n=2, 3, \dots).$$

故  $\{x_n\}$  为单调增大的有界数列,  $\{y_n\}$  为单调减小的有界数列, 因此它们的极限都存在, 令

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \beta.$$

在等式

$$y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}$$

两端取极限, 得

$$\beta = \frac{\alpha + \beta}{2},$$

故  $\alpha = \beta$ , 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

证毕.

### § 3. 函数的概念

1°函数的概念 若对于集合  $X = \{x\}$  中的每一个  $x$ , 有一个确定的实数  $y \in Y = \{y\}$  与之对应, 则变量  $y$  称为变量  $x$  在已知变域  $X$  的单值函数  $f$ , 并记为  $y = f(x)$ .

集合  $X$  名为函数  $f(x)$  的定义域或存在域;  $Y$  称为这个函数的值域, 在最简单的情形下, 集合  $X$  或为开区间  $(a, b)$ :  $a < x < b$ , 或为半开区间  $(a, b]$ :  $a < x \leq b$  或  $[a, b)$ :  $a \leq x < b$ , 或为闭区间(线段)  $[a, b]$ :  $a \leq x \leq b$ , 其中  $a$  和  $b$  为某实数或符号  $-\infty$  和  $+\infty$ .

若对于  $X$  中的每一个值  $x$  有若干个值  $y = f(x)$  与之对应, 则  $y$  称为  $x$  的多值函数.

2°反函数 若把  $x$  了解为满足方程式

$$f(x) = y$$

(式中  $y$  为属于函数  $f(x)$  的值域  $Y$  中之一固定数值) 的任何数值, 则这个对应关系确定出在集合  $Y$  上的某函数

$$x = f^{-1}(y),$$

这个函数称为函数  $f(x)$  的反函数, 这个函数一般地说来是多值的。若函数  $y = f(x)$  是严格单调的, 即当  $x_2 > x_1$  时,  $f(x_2) > f(x_1)$  [或相应地  $f(x_2) < f(x_1)$ ], 则反函数  $x = f^{-1}(y)$  为单值而且严格的单调函数.

求下列函数的存在域:

151.  $y = \frac{x^2}{1+x}.$

解 当  $1+x \neq 0$ , 即  $x \neq -1$  时, 函数  $y$  才有意义, 所以,  
它的存在域为  $(-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$ .

152.  $y = \sqrt{3x-x^3}.$

解 存在域为满足不等式

$$3x - x^3 \geq 0$$

的实数  $x$  的集合, 解之, 得存在域为  $(-\infty, -\sqrt{3}], [0, \sqrt{3}]$ .

$$153^+ y = (x-2)\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}.$$

解 当  $\frac{1+x}{1-x} \geq 0$  时,  $y$  值确定.

解之, 得存在域为满足

$$-1 \leq x < 1$$

的数  $x$  的集合.

$$154. (a) y = \log(x^2 - 4), (b) y = \log(x+2) + \log(x-2).$$

解 (a) 当  $x^2 - 4 > 0$  时,  $y$  值确定. 解之, 得存在域为  $(-\infty, -2), (2, +\infty)$ .

(b) 函数  $y$  由两个函数组成, 其中第一个函数的存在域为  $(-2, +\infty)$ , 而第二个函数的存在域为  $(2, +\infty)$ , 于是, 函数  $y$  的存在域为它们的公共部分, 即  $(2, +\infty)$ .

$$155. y = \sqrt{\sin(\sqrt{x})}.$$

解 当  $\sin \sqrt{x} \geq 0$  时,  $y$  值才为确定的实数. 解之, 得

$$2k\pi \leq \sqrt{x} \leq (2k+1)\pi \quad (k=0, 1, 2, \dots).$$

存在域为满足不等式

$$4k^2\pi^2 \leq x \leq (2k+1)^2\pi^2 \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

的数  $x$  的集合.

$$156. y = \sqrt{\cos x^2}.$$

解 当  $\cos x^2 \geq 0$  时,  $y$  值才为确定的实数, 即只要  $x$  满足

$$0 \leq x^2 \leq \frac{\pi}{2} \text{ 及 } (4k-1)\frac{\pi}{2} \leq x^2 \leq (4k+1)\frac{\pi}{2} \\ (k=1, 2, \dots).$$

解之,得存在域为满足不等式

$$|x| \leq \sqrt{\frac{\pi}{2}} \text{ 及 } \sqrt{(4k-1)\frac{\pi}{2}} \leq |x| \leq \sqrt{(4k+1)\frac{\pi}{2}} \\ (k=1, 2, \dots)$$

的数  $x$  的集合.

157.  $y = \log \left( \sin \frac{\pi}{x} \right).$

解 当  $\sin \frac{\pi}{x} > 0$  时,  $y$  值确定, 即只要

$$2k\pi < \frac{\pi}{x} < (2k+1)\pi \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

及

$$-(2k+2)\pi < \frac{\pi}{x} < -(2k+1)\pi.$$

所以, 存在域为满足不等式

$$\frac{1}{2k+1} < x < \frac{1}{2k}, \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

及

$$-\frac{1}{2k+1} < x < -\frac{1}{2k+2}$$

的数  $x$  的集合.

158.  $y = \frac{\sqrt{x}}{\sin \pi x}.$

解 当  $x \geq 0$  及  $\sin \pi x \neq 0$  时,  $y$  值确定, 解之, 得存在域为满足关系式

$$x > 0, x \neq n(n=1, 2, \dots)$$

的数  $x$  的集合.

159.  $y = \arcsin \frac{2x}{1+x}.$

解 当  $\left| \frac{2x}{1+x} \right| \leq 1$  时,  $y$  值确定。解之, 得

$$-1 \leq \frac{2x}{1+x} \leq 1,$$

$$-1 \leq 2 - \frac{2}{1+x} \leq 1,$$

$$-3 \leq -\frac{2}{1+x} \leq -1,$$

$$\frac{2}{3} \leq 1+x \leq 2.$$

最后得存在域为满足不等式

$$-\frac{1}{3} \leq x \leq 1$$

的数  $x$  的集合。

160.  $y = \arccos(2\sin x)$ .

解 当  $|2\sin x| \leq 1$  时,  $y$  值确定。解之, 得  
存在域为满足不等式

$$|x - kx| \leq \frac{\pi}{6} \quad (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

的数  $x$  的集合。

161.  $y = \lg[\cos(\lg x)]$ .

解 当  $\cos(\lg x) > 0$  时,  $y$  值确定。解之, 得

$$\left(2k - \frac{1}{2}\right)\pi < \lg x < \left(2k + \frac{1}{2}\right)\pi.$$

从而存在域为满足不等式

$$10^{\left(2k - \frac{1}{2}\right)\pi} < x < 10^{\left(2k + \frac{1}{2}\right)\pi}$$

$$(k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

的数  $x$  的集合。

162.  $y = (x - |x|) \sqrt{-\sin^2 \pi x}$ .

解 由于  $\sin^2 \pi x \geq 0$ , 故仅当  $\sin \pi x = 0$  时  $\sqrt{-\sin^2 \pi x}$  才有

意义,从而函数  $y$  才有意义.解之,得存在域为

$$x=k \quad (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

163.  $y = \operatorname{ctg} \pi x + \arccos(2^x)$ .

解 当  $\sin \pi x \neq 0$  时,第一项有意义,即  $x \neq k (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ .

当  $0 \leq 2^x \leq 1$  时,第二项有意义,即  $x \leq 0$ .由此得存在域为满足关系式

$$x < 0, x \neq -n \quad (n=1, 2, \dots)$$

的数  $x$  的集合。

164.  $y = \arcsin(1-x) + \lg(\lg x)$ .

解 当  $-1 \leq 1-x \leq 1$ , 即  $0 \leq x \leq 2$  时,第一个函数有意义;

当  $\lg x > 0$ , 即  $x > 1$  时,第二个函数有意义.

由此得存在域为满足不等式

$$1 < x \leq 2$$

的数  $x$  的集合。

165<sup>+</sup>  $y = (2x)!$ .

解 当  $2x = n (n=0, 1, \dots)$  时,  $y$  值确定,所以,存在域为集合:

$$0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, \dots, \frac{n}{2}, \dots$$

求下列函数的存在域和函数值域:

166.  $y = \sqrt{2+x-x^2}$ .

解 当  $2+x-x^2 \geq 0$  时,  $y$  值确定.解之,得存在域为满足不等式

$$-1 \leq x \leq 2$$

的数  $x$  的集合. 又因

$$y = \sqrt{\frac{9}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2} \leq \frac{3}{2},$$

所以, 函数值域为满足不等式

$$0 \leq y \leq \frac{3}{2}$$

的数  $y$  的集合。

167.  $y = \lg(1 - 2\cos x)$ .

解 当  $1 - 2\cos x > 0$  时,  $y$  值确定, 解之, 得存在域为满足不等式

$$2k\pi + \frac{\pi}{3} < x < 2k\pi + \frac{5\pi}{3} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2 \dots)$$

的数  $x$  的集合  $A$ . 因为

$$\max_{x \in A}(1 - 2\cos x) = 1 - (-2) = 3,$$

$$\inf_{x \in A}(1 - 2\cos x) = 0,$$

所以, 函数值域为满足不等式

$$-\infty < y \leq \lg 3$$

的数  $y$  的集合.

168.  $y = \arccos \frac{2x}{1+x^2}$ .

解 当  $\left| \frac{2x}{1+x^2} \right| \leq 1$  时,  $y$  值确定, 而对于  $-\infty < x < +\infty$  来说, 始终有  $\left| \frac{2x}{1+x^2} \right| \leq 1$ , 所以, 存在域为全体实数所组成的集合, 而函数值域为闭区间  $[0, \pi]$ .

169.  $y = \arcsin \left( \lg \frac{x}{10} \right)$ .

解 当  $-1 \leq \lg \frac{x}{10} \leq 1$  时, 即当  $\frac{1}{10} \leq \frac{x}{10} \leq 10$ , 或  $1 \leq x \leq 100$  时,  $y$  值确定, 且在  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  上变化, 所以, 存在域为闭区间  $[1, 100]$ , 函数值域为  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ .

170.  $y = (-1)^x$ .

解 存在域为数  $x: x = \frac{p}{2q+1}$  ( $p, q$  为整数) 的集合, 而函数值域为:  $y = (-1)^x$ , 即由  $-1, 1$  两数组成的集合.

171. 在底为  $AC=b$  和高为  $BD=h$  的三角形  $ABC$  中(图 1·2)内接一个高为  $NM=x$  的矩形  $KLMN$ . 把矩形  $KLMN$  的周长  $P$  及其面积  $S$  表为  $x$  之函数.

作函数  $P=P(x)$  及  $S=S(x)$  的图形.

解 因为  $\frac{LM}{b} = \frac{h-x}{h}$ ,

所以,

$$LM = b \left(1 - \frac{x}{h}\right).$$

周长  $P=2LM+2x$ , 即




图 1.2

$$P=P(x)=2\left(1-\frac{b}{h}\right)x+2b,$$

式中  $0 < x < h$ .

当  $b < h$  时, 如图 1·3 中直线段  $AB$  所示(不包含  $A, B$  两点).

当  $b > h$  时, 如图 1·3 中直线段  $AC$  所示(不包含  $A, C$  两点). 其中  $OA=2b$ ,  $B$  和  $C$  的坐标为  $h$  和  $2h$ .

矩形面积

$$S = LM \cdot x = bx \\ \cdot \left(1 - \frac{x}{h}\right) (0 < x < h).$$

如图 1·4 所示, 它是一段不包含  $O$  点及  $B$  点的抛物线弧  $\widehat{OAB}$ .




图 1.3




图 1.4

172. 在三角形  $ABC$  中, 边  $AB=6$  厘米, 边  $AC=8$  厘米, 角  $BAC=x$ , 把边  $BC=a$  和面积  $ABC=S$  表为变量  $x$  的函数, 作函数  $a=a(x)$  及  $S=S(x)$  的图形.

解 利用余弦定理得三角形的边

$$a = \sqrt{6^2 + 8^2 - 2 \cdot 6 \cdot 8 \cos x} = \sqrt{100 - 96 \cos x} \\ (0 < x < \pi),$$

如图 1·5 所示(系一不包含  $A$  点及  $B$  点的曲线弧  $\widehat{AB}$ ). 而三角形的面积

$$S = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 \sin x = 24 \sin x (0 < x < \pi).$$

如图 1·6 所示(两轴单位取得不同, 系一不包含  $O$  点及  $A$  点的弧  $\widehat{OBA}$ ).




图 1.5




图 1.6

173. 在等腰梯形  $ABCD$  中(图 1·7), 底为  $AD=a$ ,  $BC=b$  ( $a>b$ ), 高为  $HB=h$ , 引直线  $MN \parallel BH$ ,  $MN$  与顶点  $A$  相距  $AM=x$ , 把图形  $ABNMA$  的面积  $S$  表为变量  $x$  的函数. 作函数  $S=S(x)$  的图形.

解  $AH=\frac{1}{2}(a-b)$ , 分三种情况讨论:

(1) 当  $0 \leq x \leq \frac{a-b}{2}$  时, 即  $MN$  线在  $\triangle ABH$  内, 此时

$$\frac{MN}{h} = \frac{x}{\frac{a-b}{2}}, MN = \frac{2hx}{a-b}.$$

于是,

$$S = \frac{1}{2} MN \cdot x = \frac{hx^2}{a-b},$$

如图 1·8 中弧  $OA$  (系抛物线段).

(2) 当  $\frac{a-b}{2} < x < \frac{a-b}{2} + b = \frac{a+b}{2}$  时, 面积

$$S = \frac{a-b}{2} \cdot \frac{h}{2} + h \left( x - \frac{a-b}{2} \right) = h \left( x - \frac{a-b}{4} \right),$$

如图 1·8 中不含  $A$  点及  $B$  点的直线段  $AB$ .

(3) 当  $\frac{a+b}{2} \leq x \leq a$  时, 面积

$$S = \frac{h(a+b)}{2} - \frac{h}{a-b} \cdot (a-x^2) = h \left[ \frac{a+b}{2} - \frac{(a-x)^2}{a-b} \right],$$

如图 1·8 中抛物线段  $\widehat{BC}$ .




图 1.7




图 1.8

图 1·8 中各点的位置如下:

$$A\left(\frac{a-b}{2}, \frac{h(a-b)}{4}\right), B\left(\frac{a+b}{2}, \frac{h(a+3b)}{4}\right),$$

$$C\left(a, \frac{h(a+b)}{2}\right),$$

又  $\operatorname{tg}\alpha = h$ .

174. 在  $Ox$  轴上的闭区间  $0 \leq x \leq 1$  内有等于 2 克的质量均匀地分布着, 而在此轴上的两点  $x=2$  和  $x=3$  有集中的质量各 1 克。

设  $m(x)$  是介于区间  $(-\infty, x)$  的质量的值, 求函数  $m=m(x)$  ( $-\infty < x < +\infty$ ) 的解析表示式. 并作这个函

数的图形。

解 当  $-\infty < x \leq 0$  时,  $m(x) = 0$ ;

当  $0 < x \leq 1$  时, 因为

$$1 : x = 2 : m(x),$$

于是,

$$m(x) = 2x;$$

当  $1 < x \leq 2$  时,  $m(x) = 2$ ;

当  $2 < x \leq 3$  时,  $m(x) = 3$ ;

当  $3 < x < +\infty$  时,  $m(x) = 4$ .

如图 1·9 所示.

175. 函数  $y = \operatorname{sgn} x$ , 用下列方法来定义:

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & \text{若 } x > 0; \\ 0, & \text{若 } x = 0; \\ -1, & \text{若 } x < 0. \end{cases}$$

作这个函数的图形. 证明

$$|x| = x \operatorname{sgn} x.$$

解 函数  $\operatorname{sgn} x$  的图形如图 1·10 所示.

因为

当  $x < 0$  时,

$$|x| = -x = x \operatorname{sgn} x;$$

当  $x = 0$  时,

$$|x| = 0 = x \operatorname{sgn} x;$$

当  $x > 0$  时,

$$|x| = x = x \operatorname{sgn} x.$$

所以,

$$|x| = x \operatorname{sgn} x.$$




图 1.9




图 1.10

176. 函数  $y=[x]$  (数  $x$  的整数部分) 用下法定义: 若  $x=n+r$ , 式中  $n$  为整数且  $0 \leq r < 1$ , 则

$$[x]=n.$$

作这个函数的图形.

解 当  $x \in [n, n+1]$  时 ( $n$  为整数)  $y=n$ , 如图 1·11 所示。




图 1.11

177. 设:

$$y = \pi(x) \quad (x \geq 0),$$

表示不超过数  $x$  的素数的数目, 对于自变数  $0 \leq x \leq 20$  的值, 作这个函数的图形.

**解** 按题设可知:

当  $0 \leq x < 2$  时,  $\pi(x) = 0$ ;

当  $2 \leq x < 3$  时,  $\pi(x) = 1$ ;

当  $3 \leq x < 5$  时,  $\pi(x) = 2$ ;

当  $5 \leq x < 7$  时,  $\pi(x) = 3$ ;

当  $7 \leq x < 11$  时,  $\pi(x) = 4$ ;

当  $11 \leq x < 13$  时,  $\pi(x) = 5$ ;

当  $13 \leq x < 17$  时,  $\pi(x) = 6$ ;

当  $17 \leq x < 19$  时,  $\pi(x) = 7$ ;

当  $19 \leq x \leq 20$  时,  $\pi(x) = 8$  (如图 1·12 所示).

函数  $y = f(x)$  在怎样的集合  $E_y$  上映出集合  $E_x$ , 若:




图 1.12

$$178. y = x^2, E_x = \{1 \leq x \leq 2\}.$$

**解**  $E_y \{1 \leq y \leq 4\}$ .

$$179. y = \lg x, E_x = \{10 < x < 1000\}.$$

**解**  $E_y = \{1 < y < 3\}$ .

$$180. y = \frac{1}{\pi} \operatorname{arc ctg} x, E_x = \{-\infty < x < +\infty\}.$$

解  $E_y = \{0 < y < 1\}$ .

$$181. y = \operatorname{ctg} \frac{\pi x}{4}, E_x = \{0 < |x| \leq 1\}.$$

解  $E_y \{1 < |y| < +\infty\}$ .

$$182. y = |x|, E_x = \{1 \leq |x| \leq 2\}.$$

解  $E_y = \{1 \leq y \leq 2\}$ .

变量  $x$  跑过区间  $0 < x < 1$ , 则变量  $y$  跑过怎样的集合?

$$183. y = a + (b - a)x.$$

解 变量  $x$  从 0 变至 1 时,  $y$  从  $a$  变至  $b$ . 于是, 变量  $y$  的变化区间为  $a < y < b$  (当  $a < b$ ) 或  $b < y < a$  (当  $b < a$ ).

$$184. y = \frac{1}{1-x}.$$

解 当  $x$  从 0 变至 1 时,  $y$  从 1 变至正无穷大. 于是,  $y$  的变化区间为  $1 < y < +\infty$ .

$$185. y = \frac{x}{2x-1}.$$

$$\text{解 } y = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2x-1}.$$

当  $x$  从 0 变至  $\frac{1}{2}$ ,  $y$  从 0 变至负无穷大; 当  $x$  从  $\frac{1}{2}$  变至 1 时,  $y$  从正无穷大变至 1. 于是,  $y$  的变化区间为  $-\infty < y < 0, 1 < y < +\infty$ .

$$186. y = \sqrt{x-x^2}.$$

$$\text{解 } y = \sqrt{\frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2}.$$

当  $x = \frac{1}{2}$  时,  $y = \frac{1}{2}$  (最大值); 由于  $x$  趋于 0 时,  $y$  趋于 0, 而  $y > 0$ , 从而  $y=0$  是变量  $y$  的下确界. 于是,  $y$  的

变化区间为  $0 < y \leq \frac{1}{2}$ .

187.  $y = \operatorname{ctg} \pi x$ .

解 当  $x$  从 0 变至 1 时, 变量  $y$  从  $+\infty$  变至  $-\infty$ . 于是, 变量  $y$  的变化区间为  $-\infty < y < +\infty$ .

188.  $y = x + [2x]$ .

解 当  $x$  从 0 变至  $\frac{1}{2}$  时,  $y$  从 0 变至  $\frac{1}{2}$ ; 当  $x$  从  $\frac{1}{2}$  变至 1 时,  $y$  从  $\frac{3}{2}$  变至 2. 于是,  $y$  的变化区间为  $0 < y < \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \leq y < 2$ .

189. 设:

$$f(x) = x^4 - 6x^3 + 11x^2 - 6x,$$

求  $f(0), f(1), f(2), f(3), f(4)$ .

解 因为  $f(x) = x(x-1)(x-2)(x-3)$ , 所以,

$$\begin{aligned}f(0) &= f(1) = f(2) = f(3) = 0, \\f(4) &= 24.\end{aligned}$$

190. 设:

$$f(x) = \lg x^2,$$

求  $f(-1), f(-0.001), f(100)$ .

解  $f(-1) = \lg 1 = 0$ ;  
 $f(-0.001) = \lg 0.000001 = -6$ ;  
 $f(100) = \lg 10000 = 4$ .

191. 设:

$$f(x) = 1 + [x],$$

求  $f(0.9), f(0.99), f(0.999), f(1)$ .

解  $f(0.9)=f(0.99)=f(0.999)=1$ ,  
 $f(1)=2$

192. 设:

$$f(x) = \begin{cases} 1+x, & \text{当 } -\infty < x \leq 0; \\ 2^x, & \text{当 } 0 < x < +\infty. \end{cases}$$

求  $f(-2), f(-1), f(0), f(1), f(2)$ .

解  $f(-2)=1-2=-1, f(-1)=1-1=0,$   
 $f(0)=1+0=1, f(1)=2^1=2,$   
 $f(2)=2^2=4$

193. 设:

$$f(x) = \frac{1-x}{1+x}$$

求  $f(0), f(-x), f(x+1), f(x)+1, f\left(\frac{1}{x}\right), \frac{1}{f(x)}$ .

解  $f(0)=1,$

$$f(-x)=\frac{1+x}{1-x},$$

$$f(x+1)=\frac{1-(x+1)}{1+(x+1)}=-\frac{x}{x+2},$$

$$f(x)+1=\frac{1-x}{1+x}-1=\frac{2}{1+x},$$

$$f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{1-\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}}=\frac{x-1}{x+1},$$

$$\frac{1}{f(x)}=\frac{1}{1-x}=\frac{1+x}{1-x}.$$

194. 设:

$$(a) f(x)=x-x^3; (b) f(x)=\sin \frac{\pi}{x};$$

$$(b) f(x) = (x + |x|)(1 - x).$$

求使以下各式满足的  $x$  值：

$$(1) f(x) = 0; (2) f(x) > 0; (3) f(x) < 0.$$

解 (a) (1)  $x - x^3 = 0$ , 所以,  $x = 0, 1$  及  $-1$ .

$$(2) x - x^3 > 0, \text{ 即 } x(1 - x)(1 + x) > 0,$$

所以,  $-\infty < x < -1$  和  $0 < x < 1$ .

(3)  $x(1 - x)(1 + x) < 0$ , 所以,  $-1 < x < 0$  和  $1 < x < +\infty$ .

(b) (1)  $\sin \frac{\pi}{x} = 0$ , 则  $\frac{\pi}{x} = k\pi (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ , 所以,  $x = \frac{1}{k} (k = \pm 1, \pm 2, \dots)$ .

(2)  $\sin \frac{\pi}{x} > 0$ , 则  $2k\pi < \frac{\pi}{x} < (2k+1)\pi$  和  $-(2k+2)\pi < \frac{\pi}{x} < -(2k+1)\pi$ , 所以

$$\frac{1}{2k+1} < x < \frac{1}{2k} \text{ 和 } -\frac{1}{2k+1} < x < -\frac{1}{2k+2}$$
$$(k = 0, 1, 2, \dots)$$

(3)  $\sin \frac{\pi}{x} < 0$ , 则  $(2k+1)\pi < \frac{\pi}{x} < (2k+2)\pi$  和  $-(2k+1)\pi < \frac{\pi}{x} < -2k\pi (k = 0, 1, 2, \dots)$ ,

所以,  $\frac{1}{2k+2} < x < \frac{1}{2k+1}$  和  $-\frac{1}{2k} < x < -\frac{1}{2k+1} (k = 0, 1, 2, \dots)$ ,

(b) (1)  $(x + |x|)(1 - x) = 0$ , 则  $x \leq 0$  和  $x = 1$ .

(2) 因为  $x + |x| \geq 0$ , 所以  $1 - x > 0$ , 即  $x < 1$ .  
而由  $f(x) > 0$ , 得  $x + |x| > 0$ , 即  $x > 0$ .

总之,当  $0 < x < 1$  时,  $(x+|x|)(1-x) > 0$ .

$$(3) (x+|x|)(1-x) < 0.$$

首先,  $x > 0$ , 否则  $x+|x|=0$ .

其次, 应有  $1-x < 0$ , 所以  $x > 1$ , 此即所求之解。

195. 设:

$$(a) f(x) = ax + b; (b) f(x) = x^2; (c) f(x) = a^x.$$

$$\text{求 } \varphi(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

$$\text{解 } (a) \varphi(x) = \frac{a(x+h) + b - (ax + b)}{h} = a;$$

$$(b) \varphi(x) = \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = 2x + h;$$

$$(c) \varphi(x) = \frac{a^{x+h} - a^x}{h} = a^x \cdot \frac{a^h - 1}{h}.$$

196. 设:

$$f(x) = ax^2 + bx + c,$$

$$\text{证明 } f(x+3) - 3f(x+2) + 3f(x+1) - f(x) = 0.$$

$$\text{证 } f(x+3) - 3f(x+2) + 3f(x+1) - f(x)$$

$$= a(x+3)^2 + b(x+3) + c - 3[a(x+2)^2]$$

$$+ b(x+2) + c] + 3[a(x+1)^2 + b(x+1) + c]$$

$$- [ax^2 + bx + c] = ax^2 + 6ax + 9a + bx + 3b + c$$

$$- 3ax^2 - 12ax - 12a - 3bx - 6b - 3c + 3ax^2$$

$$+ 6ax + 3a + 3bx + 3b + 3c - ax^2 - bx - c$$

$$= 0,$$

于是,

$$f(x+3) - 3f(x+2) + 3f(x+1) - f(x) = 0$$

197. 若  $f(0) = -2$ ,  $f(3) = 5$ , 求线性整函数:

$$f(x) = ax + b.$$

$f(1)$  及  $f(2)$  等于什么(线性补插法)?

解 因为  $f(0) = b = -2$  及  $f(3) = 3a + b = 5$ ,  
所以,

$$a = \frac{7}{3}, b = -2.$$

于是, 所求的线性整函数为

$$f(x) = \frac{7}{3}x - 2,$$

且  $f(1) = \frac{1}{3}, f(2) = \frac{8}{3}.$

198. 若  $f(-2) = 0, f(0) = 1, f(1) = 5$ . 求二次有理整函数:

$$f(x) = ax^2 + bx + c,$$

$f(-1)$  及  $f(0.5)$  等于什么(二次补插法)?

解 因为  $f(-2) = 4a - 2b + c = 0,$

$$f(0) = c = 1, f(1) = a + b + c = 5,$$

所以,  $a = \frac{7}{6}, b = \frac{17}{6}, c = 1.$

于是, 所求的二次有理整函数为

$$f(x) = \frac{7}{6}x^2 + \frac{17}{6}x + 1,$$

且  $f(-1) = -\frac{2}{3}, f(0.5) = \frac{65}{24} = 2\frac{17}{24}.$

199. 设  $f(-1) = 0, f(0) = 2, f(1) = -3, f(2) = 5$ . 求三次有理整函数:

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d.$$

解 因为  $f(-1) = -a + b - c + d = 0,$

$$f(0) = d = 2.$$

$$f(1) = a + b + c + d = -3.$$

$$f(2) = 8a + 4b + 2c + d = 5,$$

所以,  $a = \frac{10}{3}$ ,  $b = -\frac{7}{2}$ ,  $c = -\frac{29}{6}$ ,  $d = 2$ .

于是, 所求的三次有理整函数为

$$f(x) = \frac{10}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 - \frac{29}{6}x + 2.$$

200. 设  $f(0) = 15$ ,  $f(2) = 30$ ,  $f(4) = 90$ , 求形状为

$$f(x) = a + bc^x$$

的函数.

解 因为  $f(0) = a + b = 15$ .

$$f(2) = a + bc^2 = 30,$$

$$f(4) = a + bc^4 = 90,$$

所以,  $a = 10$ ,  $b = 5$ ,  $c = 2$  ( $-2$  不适合).

于是, 所求的函数为

$$f(x) = 10 + 5 \cdot 2^x.$$

201. 证明: 对于线性函数

$$f(x) = ax + b,$$

若自变量的诸值  $x = x_n$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 组成一等差级数, 则对应的函数值  $y_n = f(x_n)$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 也组成一等差级数.

证 设叙列  $x_n$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 为

$$x_1, x_1 + d, x_1 + 2d, x_1 + 3d, \dots,$$

$$x_1 + (n-1)d, \dots$$

其中  $d$  为公差.

于是,

$$\begin{aligned}y_n - y_{n-1} &= (ax_n + b) - (ax_{n-1} + b) \\&= \{a[x_1 + (n-1)d] + b\} - \\&\quad \{a[x_1 + (n-2)d] + b\} = ad,\end{aligned}$$

由于  $ad$  为一常数, 所以, 数列  $y_n = f(x_n)$  也组成等差级数.

### 202. 证明: 对于指数函数

$$f(x) = a^x \quad (a > 0),$$

若自变数  $x = x_n \quad (n = 1, 2, \dots)$  的值组成一等差级数, 则对应的函数值  $y_n = f(x_n) \quad (n = 1, 2, \dots)$  组成一等比级数.

证 因为  $x_n - x_{n-1} = d$ , 所以

$$y_n : y_{n-1} = a^{x_n} : a^{x_{n-1}} = a^{x_n - x_{n-1}} = a^d,$$

即函数值  $y_n = f(x_n)$  组成一等比级数.

### 203. 设当 $0 < u < 1$ 函数 $f(u)$ 有定义, 求下列函数的定义域:

$$(a) f(\sin x)^+; \quad (b) f(\ln x); \quad (c) ^+ f\left(\frac{[x]}{x}\right).$$

解 (a) 因为  $0 < \sin x < 1$ , 所以,

$$2k\pi < x < \pi + 2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \text{ 且}$$

$$x \neq \frac{4k+1}{2}\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots);$$

(b) 因为  $0 < \ln x < 1$ , 所以,  $1 < x < e$ ;

$$(c) \text{ 因为 } 0 < \frac{[x]}{x} < 1,$$

所以,  $x > 1$  且  $x \neq k \quad (k = 2, 3, 4, \dots)$ .

### 204. 设:

$$f(x) = \frac{1}{2}(a^x + a^{-x}) \quad (a > 0).$$

证明:  $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x) \cdot f(y)$ .

证  $f(x+y) + f(x-y)$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2}(a^{x+y} + a^{-x-y}) + \frac{1}{2}(a^{x-y} + a^{-x+y}) \\ &= \frac{1}{2}(a^x \cdot a^y + a^{-x} \cdot a^{-y}) + \frac{1}{2}(a^x \cdot a^{-y} + a^{-x} \cdot a^y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2}a^x(a^y+a^{-y}) + \frac{1}{2}a^{-x}(a^{-y}+a^y) \\
&= \frac{1}{2}(a^x+a^{-x})(a^y+a^{-y}) \\
&= 2f(x)f(y),
\end{aligned}$$

于是,

$$f(x+y)+f(x-y)=2f(x)f(y).$$

205. 设:

$$f(x)+f(y)=f(z).$$

求出  $z$ , 若:

$$(a) f(x)=ax; \quad (b) f(x)=\frac{1}{x};$$

$$(c) f(x)=\arctgx (|x|<1); (d) f(x)=\lg \frac{1+x}{1-x}.$$

解 (a)  $f(x)+f(y)=ax+ay=a(x+y)$ ,

$$f(z)=az,$$

由  $f(x)+f(y)=f(z)$  得  $z=x+y$ .

$$(b) \text{由 } \frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{z} \text{ 得 } z=\frac{xy}{x+y}.$$

(c) 由  $\arctgx+\arctgy=\arctgz$  得

$$\arctg \frac{x+y}{1-xy}=\arctgz$$

所以,  $z=\frac{x+y}{1-xy}$ ;

$$(d) \text{由 } \lg \frac{1+x}{1-x}+\lg \frac{1+y}{1-y}=\lg \frac{1+z}{1-z} \text{ 得}$$

$$\frac{(1+x)(1+y)}{(1-x)(1-y)}=\frac{1+z}{1-z},$$

所以,  $z=\frac{x+y}{1+xy}$ .

求  $\varphi[\varphi(x)]$ ,  $\psi[\psi(x)]$ ,  $\varphi[\psi(x)]$  及  $\psi[\varphi(x)]$ , 设:

206.  $\varphi(x) = x^2$  及  $\psi(x) = 2^x$ .

解  $\varphi[\varphi(x)] = (x^2)^2 = x^4$ ;  $\varphi[\psi(x)] = (2^x)^2 = 2^{2x}$ ;  
 $\psi[\psi(x)] = 2^{(2^x)}$ ;  $\psi[\varphi(x)] = 2^{(x^2)}$ .

207.  $\varphi(x) = \operatorname{sgn} x$  及  $\psi(x) = \frac{1}{x}$ .

解  $\varphi[\varphi(x)] = \operatorname{sgn}(\operatorname{sgn} x) = \operatorname{sgn} x$ ;  
 $\varphi[\psi(x)] = \frac{1}{\frac{1}{x}} = x (x \neq 0)$ ;  
 $\psi[\psi(x)] = \operatorname{sgn}\left(\frac{1}{x}\right) = \operatorname{sgn} x \quad (x \neq 0)$ ;  
 $\psi[\varphi(x)] = \frac{1}{\operatorname{sgn} x} = \operatorname{sgn} x \quad (x \neq 0)$ .

208.  $\varphi(x) = \begin{cases} 0, & \text{当 } x \leq 0, \\ x, & \text{当 } x > 0. \end{cases}$  及  $\psi(x) = \begin{cases} 0, & \text{当 } x \leq 0, \\ -x^2, & \text{当 } x > 0. \end{cases}$

解  $\varphi[\varphi(x)] = \varphi(x)$ ;  $\psi[\psi(x)] = 0$  (因为  $-x^2 \leq 0$ );  
 $\varphi[\psi(x)] = 0$ ;  $\psi[\varphi(x)] = \psi(x)$ .

209. 设:

$$f(x) = \frac{1}{1-x},$$

求  $f[f(x)]$ ,  $f\{f[f(x)]\}$ .

解  $f[f(x)] = \frac{1}{1 - \frac{1}{1-x}} = 1 - \frac{1}{x}$ ;

$$f\{f[f(x)]\} = \frac{1}{1 - \left(1 - \frac{1}{x}\right)} = x.$$

210. 设:

$$f_n(x) = \underbrace{f\{f[\cdots f(x)]\}}_n.$$

若  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ , 求  $f_n(x)$ .

解 当  $n=2$  时,  $f_2(x) = \frac{x}{\sqrt{1+2x^2}}$ .

设对于  $n=k$  时, 有

$$f_k(x) = \frac{x}{\sqrt{1+kx^2}},$$

则对于  $n=k+1$  时, 有

$$f_{k+1}(x) = \frac{\frac{x}{\sqrt{1+kx^2}}}{\sqrt{1+\frac{x^2}{1+kx^2}}} = \frac{x}{\sqrt{1+(k+1)x^2}}.$$

从而由数学归纳法知, 对于任何自然数  $n$ , 有

$$f_n(x) = \frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}.$$

211. 设:

$$f(x+1) = x^2 - 3x + 2,$$

求  $f(x)$ .

解 因为  $f(x+1) = (x+1)^2 - 5(x+1) + 6$ , 于是,

$$f(x) = x^2 - 5x + 6.$$

212. 设:

$$f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2},$$

求  $f(x)$ .

解 因为  $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2$ , 于是,

$$f(x) = x^2 - 2.$$

213. 设:

$$f\left(\frac{1}{x}\right) = x + \sqrt{1+x^2} \quad (x > 0),$$

求  $f(x)$ .

$$\text{解} \quad \text{因为 } f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1 + \sqrt{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2}}{\frac{1}{x}}, \text{于是,}$$

$$f(x) = \frac{1 + \sqrt{1 + x^2}}{x}.$$

证明下列各函数在所示间隔内是单调增函数:

$$214. f(x) = x^2 \quad (0 \leq x < +\infty).$$

证 当  $x_2 > x_1 \geq 0$  时,

$$\begin{aligned} f(x_2) - f(x_1) &= x_2^2 - x_1^2 \\ &= (x_2 - x_1)(x_2 + x_1) > 0, \end{aligned}$$

于是  $f(x) = x^2$  在  $0 \leq x < +\infty$  内是单调增函数.

$$215. f(x) = \sin x \left( -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \right).$$

证 当  $-\frac{\pi}{2} < x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2}$  时,

$$\text{因为 } -\frac{\pi}{2} < \frac{x_1 + x_2}{2} < \frac{\pi}{2} \text{ 及 } 0 < \frac{x_2 - x_1}{2} < \frac{\pi}{2},$$

$$\text{所以, } \cos \frac{x_1 + x_2}{2} > 0 \text{ 及 } \sin \frac{x_2 - x_1}{2} > 0.$$

$$\text{又因 } f(x_2) - f(x_1) = \sin x_2 - \sin x_1$$

$$= 2 \cos \frac{x_1 + x_2}{2} \sin \frac{x_2 - x_1}{2} > 0,$$

所以,  $f(x) = \sin x$  在  $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$  内是单调增函数.

$$216. f(x) = \operatorname{tg} x \left( -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \right).$$

$$\begin{aligned} \text{证 } f(x_2) - f(x_1) &= \operatorname{tg}x_2 - \operatorname{tg}x_1 = \frac{\sin x_2}{\cos x_2} - \frac{\sin x_1}{\cos x_1} \\ &= \frac{\sin x_2 \cos x_1 - \cos x_2 \sin x_1}{\cos x_1 \cos x_2} = \frac{\sin(x_2 - x_1)}{\cos x_1 \cdot \cos x_2}, \end{aligned}$$

当  $-\frac{\pi}{2} < x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2}$  时,  $\cos x_1 > 0, \cos x_2 > 0$  及  $\sin(x_2 - x_1) > 0$ , 从而可知

$$f(x_2) - f(x_1) > 0,$$

所以,  $f(x) = \operatorname{tg}x$  在  $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  内是单调增函数.

217.  $f(x) = 2x + \sin x (-\infty < x < +\infty)$ .

$$\text{证 } f(x_2) - f(x_1) = 2(x_2 - x_1) + \sin x_2 - \sin x_1,$$

$$\text{因为 } |\sin x_2 - \sin x_1|$$

$$\begin{aligned} &= 2 \left| \cos \frac{x_1 + x_2}{2} \right| \left| \sin \frac{x_2 - x_1}{2} \right| \\ &\leq 2 \cdot \left| \sin \frac{x_2 - x_1}{2} \right| \leq 2 \cdot \left| \frac{x_2 - x_1}{2} \right| = |x_2 - x_1|, \end{aligned}$$

所以当  $x_2 < x_1$  时, 有

$$-(x_2 - x_1) \leq \sin x_2 - \sin x_1 \leq x_2 - x_1,$$

从而

$$2(x_2 - x_1) + \sin x_2 - \sin x_1 \geq 2(x_2 - x_1)$$

$$-(x_2 - x_1) = x_2 - x_1 > 0,$$

即  $f(x_2) - f(x_1) > 0$ , 于是,  $f(x) = 2x + \sin x$  在  $-\infty < x < +\infty$  内是单调增函数.

证明下列各函数在所示间隔内是单调减函数:

218.  $f(x) = x^2 \quad (-\infty < x \leq 0)$ .

$$\text{证 } f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1)(x_2 + x_1) < 0$$

$$(x_1 < x_2 < 0),$$

于是,  $f(x) = x^2$  在  $-\infty < x \leq 0$  内是单调减函数.

219.  $f(x) = \cos x$  ( $0 \leq x \leq \pi$ ).

证  $f(x_2) - f(x_1) = \cos x_2 - \cos x_1$

$$= -2\sin \frac{x_2 + x_1}{2} \sin \frac{x_2 - x_1}{2},$$

当  $0 < x_1 < x_2 < \pi$  时,

$$0 < \frac{x_1 + x_2}{2} < \pi \text{ 及 } 0 < \frac{x_2 - x_1}{2} < \frac{\pi}{2},$$

于是,  $\sin \frac{x_1 + x_2}{2} > 0, \sin \frac{x_2 - x_1}{2} > 0$ , 从而

$$f(x_2) - f(x_1) < 0.$$

即  $f(x) = \cos x$  在  $0 \leq x \leq \pi$  内是单调减函数.

220.  $f(x) = \operatorname{ctg} x$  ( $0 < x < \pi$ ).

证  $f(x_2) - f(x_1) = \frac{\cos x_2}{\sin x_2} - \frac{\cos x_1}{\sin x_1}$   
 $= \frac{\cos x_2 \sin x_1 - \cos x_1 \sin x_2}{\sin x_1 \sin x_2} = \frac{\sin(x_1 - x_2)}{\sin x_1 \cdot \sin x_2} < 0$   
(当  $0 < x_1 < x_2 < \pi$  时),

于是,  $f(x) = \operatorname{ctg} x$  在  $0 < x < \pi$  内是单调减函数.

221. 研究下列函数的单调性:

(a)  $f(x) = ax + b$ ; (b)  $f(x) = ax^2 + bx + c$ ;

(c)  $f(x) = x^3$ ; (d)  $f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$ ;

(e)  $f(x) = a^x$  ( $a > 0$ ).

解 (a) 对于  $x_1 < x_2$ , 有  $f(x_2) - f(x_1) = a(x_2 - x_1)$ .

当  $a > 0$  时, 它大于零; 当  $a < 0$  时, 它小于零. 所以, 当  $a > 0$  时,  $f(x)$  是增函数; 当  $a < 0$  时,  $f(x)$  是减函数.

(b)  $f(x) = a \left( x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}$ .

(1) 当  $a > 0$  时, 图形呈凹形, 顶点在  $\left( -\frac{b}{2a}, \frac{b^2 - 4ac}{4a} \right)$ ,  
于是, 在  $-\infty < x < -\frac{b}{2a}$  内, 函数单调下降, 在  $-\frac{b}{2a} < x < +\infty$ , 函数单调上升.

(2) 当  $a < 0$  时, 图形呈凸状. 于是, 在  $-\infty < x < -\frac{b}{2a}$   
内增加, 而在  $-\frac{b}{2a} < x < +\infty$  内减小.

$$(a) f(x_2) - f(x_1) = x_2^3 - x_1^3$$

$+ (x_2 - x_1)(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2) > 0$  ( $x_2 > x_1$ ), 于是  
 $f(x) = x^3$  在  $-\infty < x < +\infty$  内单调增加.

(r)  $f(x) = \frac{ax + b}{cx + d} = \frac{a}{c} + \frac{b - a\frac{d}{c}}{cx + d}$ , 其中  $c \neq 0$ , 若  
 $c = 0$ , 则同(a)一样讨论. 下面不妨就  $c > 0$  讨论其增减性.

(1) 当  $b > a\frac{d}{c}$  时, 若  $x$  值单调增加, 则  $f(x)$  值减小.  
所以,  $f(x)$  在  $(-\infty, -\frac{d}{c})$  及  $(-\frac{d}{c}, +\infty)$  内减小.

(2) 当  $b < a\frac{d}{c}$  时, 若  $x$  值单调增加, 则  $f(x)$  值也增加. 所以,  $f(x)$  在  $(-\infty, -\frac{d}{c})$  及  $(-\frac{d}{c}, +\infty)$  内增加.

(d)  $f(x_2) - f(x_1) = a_2^x - a_1^x$ . 若  $x_2 > x_1$ , 则  
当  $0 < a < 1$  时,  $f(x_2) - f(x_1) < 0$ , 此时  $f(x)$  在  
 $-\infty < x < +\infty$  内减小.

当  $a > 1$  时,  $f(x_2) - f(x_1) > 0$ , 此时,  $f(x)$  在  $-\infty$

$x < +\infty$  内增加.

222. 不等式能否逐项取对数?

解 不一定可以, 当底大于 1 时才可以, 因为对于对数函数当底大于 1 时为单调增函数. 若底介于 0 与 1 之间, 则为单调减函数, 所以, 此时就不能逐项取对数.

223. 设  $\varphi(x), \psi(x)$  及  $f(x)$  为单调增函数. 证明: 若

$$\varphi(x) \leq f(x) \leq \psi(x), \quad (1)$$

$$\text{则 } \varphi[\varphi(x)] \leq f[f(x)] \leq \psi[\psi(x)]. \quad (2)$$

证 设  $x_0$  为三个函数公共域内的任一点, 则

$$\varphi(x_0) \leq f(x_0) \leq \psi(x_0).$$

由(1) 以及函数  $f(x)$  的单调增性知

$$f[\varphi(x_0)] \leq f[f(x_0)],$$

$$\varphi[\varphi(x_0)] \leq f[\varphi(x_0)];$$

从而

$$\varphi[\varphi(x_0)] \leq f[f(x_0)].$$

同理, 可证

$$f[f(x_0)] \leq \psi[\psi(x_0)],$$

由  $x_0$  的任意性, 于是(2) 式得证.

求反函数  $x = \varphi(y)$  和它的存在域, 若:

224.  $y = 2x + 3$  ( $-\infty < x < +\infty$ ).

解  $x = \frac{y - 3}{2}, -\infty < y < +\infty.$

225.  $y = x^2$ . (a) ( $-\infty < x \leq 0$ ); (b) ( $0 \leq x < +\infty$ ).

解 (a)  $x = -\sqrt{y}, 0 \leq y < +\infty;$

(b)  $x = \sqrt{y}, 0 \leq y < +\infty.$

226.  $y = \frac{1-x}{1+x}$  ( $x \neq -1$ ).

**解** 由于  $y + xy = 1 - x$ , 解出  $x$  得反函数

$$x = \frac{1-y}{1+y}, \quad y \neq -1.$$

227.  $y = \sqrt{1-x^2}$ . (a)  $(-1 \leq x \leq 0)$ ; (b)  $(0 \leq x \leq 1)$ .

**解** (a)  $x = -\sqrt{1-y^2}, 0 \leq y \leq 1$ ;

$$(b) x = \sqrt{1-y^2}, 0 \leq y \leq 1.$$

228.  $y = \operatorname{sh}x$ , 式中  $\operatorname{sh}x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) (-\infty < x < +\infty)$ .

**解** 由于  $2y = e^x - e^{-x}$ , 即

$$(e^x)^2 - 2ye^x - 1 = 0,$$

解出  $e^x$  两端再取对数, 即得

$$x = \operatorname{arsh}y = \ln(y + \sqrt{1+y^2}), -\infty < y < +\infty.$$

229.  $y = \operatorname{th}x$ , 式中  $\operatorname{th}x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} (-\infty < x < +\infty)$ .

**解** 由于  $y = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{(e^x)^2 - 1}{(e^x)^2 + 1}$ , 即

$$e^{2x} = \frac{1+y}{1-y},$$

两端取对数, 并注意到  $\frac{1+y}{1-y} > 0$  即  $-1 < y < 1$ , 于是

$$x = \operatorname{arth}y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+y}{1-y}, -1 < y < 1.$$

230.  $y = \begin{cases} x, & \text{若 } -\infty < x \leq 1; \\ x^2, & \text{若 } 1 \leq x \leq 4; \\ 2^x, & \text{若 } 4 < x < +\infty. \end{cases}$

**解**

$$x = \begin{cases} y, & \text{若 } -\infty < y \leq 1; \\ \sqrt{y}, & \text{若 } 1 \leq y \leq 16; \\ \log_2 y, & \text{若 } 16 < y < +\infty. \end{cases}$$

231. 函数  $f(x)$  定义于对称区间  $(-l, l)$  中, 且若

$$f(-x) = f(x),$$

则称  $f(x)$  为偶函数, 若

$$f(-x) = -f(x),$$

则称  $f(x)$  为奇函数.

确定下列各已知函数中哪些是偶函数, 哪些是奇函数:

(a)  $f(x) = 3x - x^3$ ;

(b)  $f(x) = \sqrt[3]{(1-x)^2} + \sqrt[3]{(1+x)^2}$ ;

(c)  $f(x) = a^x + a^{-x}$  ( $a > 0$ ); (d)  $f(x) = \ln \frac{1-x}{1+x}$ ;

(e)  $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ .

解 (a)  $f(-x) = -3x + x^3 = -f(x)$ , 故为奇函数.

(b)  $f(-x) = \sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{(1-x)^2} = f(x)$ ,

故为偶函数.

(c)  $f(-x) = a^{-x} + a^x = f(x)$ , 故为偶函数.

(d)  $f(-x) = \ln \frac{1+x}{1-x} = -\ln \frac{1-x}{1+x} = -f(x)$ ,

故为奇函数.

$$\begin{aligned}(e) f(-x) &= \ln(-x + \sqrt{1+x^2}) \\&= \ln \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \\&= -\ln(x + \sqrt{1+x^2}) = -f(x),\end{aligned}$$

故为奇函数.

232. 证明定义于对称区间  $(-l, l)$  内的任何函数  $f(x)$  可以表示为偶函数与奇函数之和的形式.

证 因为

$$f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2},$$

而  $\frac{f(x) + f(-x)}{2}$  为偶函数,  $\frac{f(x) - f(-x)}{2}$  为奇函数, 于是本题得证.

233. 若存在有数  $T > 0$  (函数的周期 —— 在广义的意义上) 使对于一切被考虑的自变量  $x$  满足等式

$$f(x + nT) = f(x) \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots),$$

则函数  $f(x)$  称为周期函数.

说明下列各已知函数中哪些是周期函数, 并求它们的最小周期. 设:

$$(a) f(x) = A\cos\lambda x + B\sin\lambda x;$$

$$(b) f(x) = \sin x + \frac{1}{2}\sin 2x + \frac{1}{3}\sin 3x;$$

$$(c) f(x) = 2\tan \frac{x}{2} - 3\tan \frac{x}{3}; (d) f(x) = \sin^2 x;$$

$$(e) f(x) = \sqrt{\tan x};$$

$$(f) f(x) = \tan \sqrt{x}; (g) f(x) = \sin x + \sin(x \sqrt{2}).$$

解 对于(a), 由于

$$\begin{aligned} f\left(x + \frac{2\pi}{\lambda}\right) &= A\cos\lambda\left(x + \frac{2\pi}{\lambda}\right) + B\sin\lambda\left(x + \frac{2\pi}{\lambda}\right) \\ &= A\cos\lambda x + B\sin\lambda x = f(x), \end{aligned}$$

故为周期函数, 最小周期为  $T = \frac{2\pi}{\lambda} (\lambda > 0)$ . 同理可证:

(b)、(c)、(d) 和 (e) 也是周期函数, 最小周期分别为  $2\pi$ 、 $6\pi$ 、 $\pi$  和  $\pi$ . 对于(f), 若周期为  $a$ , 即  $\sin(x + a)^2 = \sin x^2$ .

令  $x = 0$  即得  $a = \pm \sqrt{m\pi}$  ( $m$  为某正整数), 代入, 又令  $x$

$= \sqrt{2m\pi}$ , 易得  $\sin(2\sqrt{2}m\pi) = 0$ . 但  $2\sqrt{2}m$  显然不是整数, 得到矛盾. 于是,  $\sin x^2$  不是周期函数. 同理, (k) 和 (e) 也不是周期函数.

### 234. 证明: 对于迪里黑里函数

$$\chi(x) = \begin{cases} 1, & \text{若 } x \text{ 为有理数,} \\ 0, & \text{若 } x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

任何有理数皆为其周期.

证 设  $t$  为任一有理数, 则当  $x$  为有理数时,  $x + t$  也为有理数. 若  $x$  为无理数, 则  $x + t$  也为无理数, 所以

$$\chi(x + t) = \begin{cases} 1, & \text{若 } x \text{ 为有理数,} \\ 0, & \text{若 } x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

即  $\chi(x + t) = \chi(x)$ ,  $t$  为周期.

### 235. 证明定义于公共的集合上且周期是可公度的二个周期函数之和及其乘积也是周期函数.

证 设  $f_1(x)$  及  $f_2(x)$  为定义在集合  $A$  上的周期函数,  $T_1$  及  $T_2$  分别为它们的周期. 又设  $T$  为  $T_1$  及  $T_2$  的公约数, 即

$$T_1 = Tk_1, T_2 = Tk_2,$$

其中  $k_1, k_2$  为正整数. 于是

$$f_1(x + k_2T_1) = f_1(x), f_2(x + k_1T_2) = f_2(x).$$

设

$$F_1(x) = f_1(x) + f_2(x), F_2(x) = f_1(x)f_2(x),$$

可以证明,  $k_1k_2T$  分别是  $F_1(x)$  和  $F_2(x)$  的周期. 事实上, 我们有

$$\begin{aligned} F_1(x + k_1k_2T) &= f_1(x + k_1k_2T) \\ &+ f_2(x + k_1k_2T) \end{aligned}$$

$$= f_1(x) + f_2(x) = F_1(x).$$

$$\begin{aligned}F_2(x+k_1k_2T) &= f_1(x+k_1k_2T)f_2(x+k_1k_2T) \\&= f_1(x)f_2(x) = F_2(x).\end{aligned}$$

从而本题得证.

236. 证明: 若对于函数  $f(x)$  ( $-\infty < x < +\infty$ ) 有等式

$$f(x+T) = kf(x)$$

(式中  $k$  和  $T$  为正的常数) 成立, 则

$$f(x) = a^x \varphi(x)$$

(式中  $a$  为大于零的常数, 而  $\varphi(x)$  为以  $T$  为周期的函数).

证 由假定  $k > 0, T > 0$ , 令  $a = k^{\frac{1}{T}} > 0$ , 则  $a^T = k$ . 于是有

$$f(x+T) = a^T f(x).$$

今定义函数  $\varphi(x)$  如下:

$$\varphi(x) = a^{-x} f(x).$$

易知  $\varphi(x)$  是周期为  $T$  的函数. 事实上,

$$\begin{aligned}\varphi(x+T) &= a^{-(x+T)} f(x+T) = a^{-x} a^{-T} a^T f(x) \\&= a^{-x} f(x) = \varphi(x).\end{aligned}$$

于是

$$f(x) = a^x \varphi(x),$$

其中  $\varphi(x)$  是周期为  $T$  的函数. 证毕.

## § 4. 函数的图形表示法

1° 要作函数  $y = f(x)$  的图形可用下法来进行:(1) 确定函数的存在域  $X = \{x\}$ ; (2) 从  $X$  中选出充分密集的自变数值  $x_1, x_2,$

$\dots, x_n$  并作出函数

$$y_i = f(x_i) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

的对应数值表; (3) 在坐标平面  $Oxy$  上绘出一系列的点  $M_i(x_i, y_i)$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) 并用线把它们连接起来, 此连线的性质就是可认为是许多中间点的位置.

2° 为了得到函数的正确图形, 应当研究这个函数的一般性质.

首先必须: (1) 解方程式  $f(x) = 0$ , 求出函数图形与  $Ox$  轴的交点(函数值为零的点); (2) 确定使函数为正或为负时自变数的变域; (3) 尽可能地说明函数单调(增或减)的区间; (4) 研究当自变数无限趋近于函数存在域的境界点时函数的情况.

这一节里要假定读者已经知道最简单的初等函数的性质, 如幂函数、指数函数、三角函数等.

利用这些性质, 不用作大量的计算工作, 立即可以画出许多函数的略图, 其他的图形有时就是这些最简单图形的组合(和或乘积等等).




图 1.13




图 1.14

### 237. 作出线性齐次函数

$$y = ax$$

当  $a = 0, \frac{1}{2}, 1, 2, -1$  时的图形.

解 如图 1.13 所示.

### 238. 作出线性函数

$$y = x + b$$

当  $b = 0, 1, 2, -1$  时的图形.

解 如图 1.14 所示.

### 239. 作出线性函数的图形:

$$(a) y = 2x + 3;$$

$$(b) y = 2 - 0.1x; (b) y = -\frac{x}{2} - 1.$$

解 如图 1.15 所示.

### 240. 铁的线性膨胀系数 $\alpha = 1.2 \times 10^{-6}$ . 在适当的尺度下作出函数

$$l = f(T)$$

$$(-40^\circ \leq T$$

$$\leq 100^\circ)$$

的图形, 其中  $T$  表温度  
(以度计),  $l$  表当温度为

$T$  时铁棒的长. 设当  $T = 0^\circ$  时,  $l = 100$  厘米.

解 铁棒的长与温度的关系为

$$l = l_0(1 + \alpha T).$$

当  $T = 0$  时,  $l = 100$ , 代入上式得  $l_0 = 100$ .

于是,  $l = 100(1 + 1.2 \times 10^{-6}T)$ ,




图 1.15




图 1.16

如图 1.16 所示(两轴单位不同).

241. 二质点在数轴上运动, 第一质点在时间  $t = 0$  的时刻在原点左方 20 米处, 其速度为  $v_1 = 10$  米 / 秒; 第二质点当  $t = 0$  时在原点  $O$  之右方 30 米处, 其速度为  $v_2 = -20$  米 / 秒; 作出此二点运动方程的图形并求它们相遇的时刻和位置.

解 二质点运动的位移  $s$  与时间  $t$  的关系分别为

$$s = 10t - 20,$$

$$s = -20t + 30,$$

如图 1.17 所示. 解上述方程, 得

$$t = 1 \frac{2}{3} \text{ (秒)}, s = -3 \frac{1}{3} \text{ (米)},$$

即在运动开始后  $1 \frac{2}{3}$  秒, 在  $Ot$  轴之下方  $3 \frac{1}{3}$  米处相遇.

如图中  $P$  点所示.

242. 作出二次有理整函数的图形(抛物线):




图 1.17




图 1.18

$$(a) y = ax^2, \text{ 当 } a = 1, \frac{1}{2}, 2, -1;$$

$$(b) y = (x - x_0)^2, \text{ 当 } x_0 = 0, 1, 2, -1;$$

$$(b) = x^2 + c, \text{ 当 } c = 0, 1, 2, -1.$$

**解** (a) 如图 1.18 所示.

(c) 如图 1.19 所示.

(b) 如图 1.20 所示.




图 1.19




图 1.20

### 243. 把二次三项式

$$y = ax^2 + bx + c$$

化为下面的形状

$$y = y_0 + a(x - x_0)^2,$$

作出它的图形,研究例子:

$$(a) y = 8x - 2x^2; \quad (b) y = x^2 + 3x + 2;$$

$$(c) y = -x^2 + 2x - 1; \quad (d) y = \frac{1}{2}x^2 + x + 1.$$

解 利用配方法得

$$y = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a} = y_0 + a(x - x_0)^2,$$

其中

$$x_0 = -\frac{b}{2a}, \quad y_0 = \frac{4ac - b^2}{4a},$$

如图 1.21 所示.




图 1.21




图 1.22

$$(a) y = 8x - 2x^2 = 8 - 2(x - 2)^2,$$

$$x_0 = 2, \quad y_0 = 8, \quad a = -2,$$

如图 1.22 所示,顶点  $A(2, 8)$ .

$$(b) y = x^2 + 3x + 2$$

$$= \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4},$$

$$x_0 = -\frac{3}{2}, \quad y_0 = -\frac{1}{4}, \quad a = 1,$$

如图 1.23 所示. 顶点  $B\left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{4}\right)$ .

$$(a) y = -x^2 + 2x - 1 = -(x - 1)^2,$$

$$x_0 = 1, \quad y_0 = 0, \quad a = -1,$$

如图 1.24 所示. 顶点  $C(1, 0)$ .




图 1.23




图 1.24

$$(r) y = \frac{1}{2}x^2 + x + 1 = \frac{1}{2}(x + 1)^2 + \frac{1}{2},$$

$$x_0 = -1, \quad y_0 = \frac{1}{2}, \quad a = \frac{1}{2},$$

如图 1.25 所示. 顶点  $D(-1, \frac{1}{2})$ .




图 1.25

244. 质点以初速度  $v_0 = 600$  米 / 每秒沿与水平面成角  $\alpha = 45^\circ$  的方向射出. 作出运动轨道的图形, 并求最大的升高及飞行的射程(假定  $g \approx 10$  米 / 秒<sup>2</sup>, 空气的阻力不计).

解 运动轨道方程为

$$y = xt \tan \alpha - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha},$$

以  $v_0 = 600, g = 10, \alpha = 45^\circ$  代入得

$$y = x - \frac{x^2}{36000},$$

即

$$y = -\frac{1}{36000}(x - 18000)^2 + 9000.$$

当  $x = 18000$  时,  $y$  值最大, 最大升高为 9000 米;

当  $x = 36000$  时,  $y = 0$ , 即飞行射程为 36000 米. 如图 1.26 所示.




图 1.26

作出高于二次的有理整函数的图形:

245.  $y = x^3 + 1$ .

解 如图 1.27 所示.

246.  $y = (1 - x^2)(2 + x)$ .

解 当  $x = \pm 1, -2$  时,  $y = 0$ ;

当  $x < -2, -1 < x < 1$  时,  $y > 0$ ;

当  $-2 < x < -1$  及  $x > 1$  时,  $y < 0$ .

当  $x < -2$  及  $x > 1$  时, 曲线下降; 当  $-1 < x < 1$  时, 曲线由上升到下降; 当  $-2 < x < -1$  时, 曲线由下降到上升. 如图 1.28 所示.




图 1.27




图 1.28

$$247. y = x^2 - x^4,$$

解  $y = x^2(1-x)(1+x) = \frac{1}{4} - \left(x^2 - \frac{1}{2}\right)^2$ .

图形关于  $Oy$  轴对称, 与两坐标轴的交点为

$(-1,0), (1,0), (0,0)$ ,

且在  $(0,0)$  点与  $Ox$  轴相切.

当  $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$  时,  $y = \frac{1}{4}$ , 此时  $A\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{4}\right)$  及  $B\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{4}\right)$  均为图形上的最高点.

当  $0 < x < \frac{1}{\sqrt{2}}$  时, 曲线上升;

当  $\frac{1}{\sqrt{2}} < x < +\infty$  时, 曲线下降. 如图 1.29 所示.




图 1.29

$$248. y = x(a-x)^2(a+x)^3$$

( $a > 0$ ).

**解** 当  $x = 0, a, -a$  时,  $y = 0$ .  $(-a, 0)$  及  $(a, 0)$  为切点.

当  $x > 0$  及  $x < -a$  时,  $y > 0$ ;

当  $-a < x < 0$  时,  $y < 0$ . 如图 1.30 所示.




图 1.30

作出线性分式函数的图形(双曲线):

$$249. y = \frac{1}{x}.$$

**解** 如图 1.31 所示.

$$250. y = \frac{1-x}{1+x}.$$

解  $y = -1 + \frac{2}{1+x},$

图形的对称中心为  $(-1, -1)$ , 如图 1.32 所示.




图 1.31




图 1.32

### 251. 把线性分式函数

$$y = \frac{ax+b}{cx+d}$$

$(ad - bc \neq 0, c \neq 0).$

化为下面的形式

$$y = y_0 + \frac{m}{x - x_0}.$$

再作它的图形.

研究例子

$$y = \frac{3x+2}{2x-3}.$$

解  $y = \frac{ax+b}{cx+d} = \frac{a}{c} + \frac{\frac{bc-ad}{c^2}}{x - \left(-\frac{d}{c}\right)} = y_0 + \frac{m}{x - x_0},$

其中

$$x_0 = -\frac{d}{c}, \quad y_0 = \frac{a}{c}, \quad m = \frac{bc - ad}{c^2},$$

如图 1.33 所示.

对于  $y = \frac{3x + 2}{2x - 3}$ , 有

$$x_0 = y_0 = \frac{3}{2}, \text{ 如图 1.34 所示.}$$




图 1.33




图 1.34

252. 气体当压力  $p_0 = 1$  大气压时占有体积  $v_0 = 12$  立方米. 设气体的温度保持不变作出气体体积  $v$  随压力变化而变化的图形(波义耳—马瑞阿特定律).

解 当温度  $T = k$ (常数)时, 气体体积  $v$  与压力  $p$  成反比, 即

$$pv = C$$

其中  $C$  为常数.

当  $p_0 = 1$  时,  $v_0 = 12$ , 故  $C = 12$ , 从而  $pv = 12$ , 如图 1.35 所示.

作下列有理分式函数的图形:




图 1.35




图 1.36

$$253. y = x + \frac{1}{x} \text{ (双曲线).}$$

解 将  $y = x$  及  $y = \frac{1}{x}$  的图形叠加即得, 如图 1.36 中黑粗线所示.




图 1.37




图 1.38

254.  $y = x^2 + \frac{1}{x}$  (牛顿三次曲线).

解 将  $y = x^2$  及  $y = \frac{1}{x}$  的图形叠加即得, 如图 1.37 中黑粗线所示.

255.  $y = x + \frac{1}{x^2}$ .

解 如图 1.38 中黑粗线所示.

256.  $y = \frac{1}{1+x^2}$  (箕舌线).

解 图形对称于  $Oy$  轴, 位于  $Ox$  轴上方, 最高点为  $(0, 1)$ . 当  $x$  的绝对值无限增大时,  $y$  值无限变小. 如图 1.39 所示.




图 1.39

257.  $y = \frac{2x}{1+x^2}$  (牛顿蛇形线).

解 以  $-x$  换  $x$ ,  $y$  值的绝对值不变但改变符号, 故图形对称于原点.

又因  $\left| \frac{2x}{1+x^2} \right| \leq 1$ , 故  $-1 \leq y \leq 1$ .

当  $0 < x < 1$  时,  $y > 0$ , 曲线上升; 当  $1 < x < +\infty$  时,  $y < 0$ , 曲线下降.

图形以  $Ox$  轴为渐近线, 如图 1.40 所示.




图 1.40

$$258. y = \frac{1}{1-x^2}.$$

解 图形关于  $Oy$  轴对称, 且经过点  $(0, 1)$ .

当  $0 < x < 1$  及  $x > 1$  时, 曲线上升, 但当  $x = \pm 1$  时,  $y$  无意义.  $x = \pm 1$  为曲线的渐近线. 如图 1.41 所示.




图 1.41

$$259. y = \frac{x}{1-x^2}.$$

解 图形关于原点对称, 且经过原点.  $x = \pm 1$  为渐近

线. 在  $(0, 1)$  及  $(1, +\infty)$  内曲线上升. 如图 1.42 所示.




图 1.42




图 1.43

$$260. y = \frac{1}{1+x} - \frac{2}{x} + \frac{1}{1-x}.$$

**解** 将  $y = \frac{1}{1+x}$ ,  $y = -\frac{2}{x}$  及  $y = \frac{1}{1-x}$  的图形叠加即得, 漐近线:  $x = -1$ ,  $x = 0$ ,  $x = 1$  及  $y = 0$ , 如图 1.43 所示.

$$261. y = \frac{1}{1+x} - \frac{2}{x^2} + \frac{1}{1-x}.$$

**解** 图形关于  $Oy$  轴对称, 漐近线:  $x = -1$ ,  $x = 1$ ,  $x = 0$  及  $y = 0$ . 如图 1.44 所示.

$$262. y = \frac{(x+1)(x-2)}{(x-1)(x+2)}.$$

**解**  $y = \frac{x^2 - x - 2}{x^2 + x - 2} = 1 - \frac{2x}{x^2 + x - 2}.$

将  $y = 1$  及  $y = -\frac{2x}{(x+2)(x-1)}$  的图形叠加即得. 如图 1.45 所示.




图 1.44




图 1.45

### 263. 把函数

$$y = \frac{ax^2 + bx + c}{a_1x + b_1} (a_1 \neq 0)$$

化为下面的形状

$$y = kx + m + \frac{n}{x - x_0},$$

然后作出它的略图. 研究例子

$$y = \frac{x^2 - 4x + 3}{x + 1}$$

$$\text{解 } y = \frac{a}{a_1}x + \frac{a_1b - ab_1}{a_1^2} + \frac{\frac{c}{a_1} - \frac{b_1}{a_1^3}(a_1b - ab_1)}{x - \left(-\frac{b_1}{a_1}\right)}$$

$$= kx + m + \frac{n}{x - x_0}$$

$$\text{其中 } k = \frac{a}{a_1}, m = \frac{a_1b - ab_1}{a_1^2},$$

$$x_0 = -\frac{b_1}{a_1},$$

$$n = \frac{c}{a_1} - \frac{b_1}{a_1^3}(a_1b - ab_1).$$

如图 1.46 中黑粗线所示.

对于  $y = \frac{x^2 - 4x + 3}{x + 1}$

$$= x - 5 + \frac{8}{x + 1},$$

如图 1.47 中黑粗线所示.





图 1.46



1.47

264. 一质点与引力中心相距  $x$ . 设当  $x = 1$  米时引力  $F = 10$  千克, 作出质点的引力  $F$  的绝对值的图形(牛顿定律).




图 1.48

**解** 由万有引力定律知

$$F = \frac{k}{x^2},$$

其中  $k$  为常数.

当  $x = 1$  时,  $F = 10$ , 从而  $k = 10$ , 于是,

$$F = \frac{10}{x^2},$$

如图 1.48 所示.

265. 根据梵德耳瓦斯定律(Закон Ван-дер-Вальса), 当温度不变时, 真实气体的体积  $v$  和它的压力  $p$  以关系式

$$\left( p + \frac{a}{v^2} \right) (v - b) = c$$

相连系.

设  $a = 2, b = 0.1$  及  $c = 10$ , 作出函数  $p = p(v)$  的图形.




图 1.49




图 1.50

**解** 由于

$$p = \frac{10}{v - 0.1} - \frac{2}{v^2},$$

将  $p = \frac{10}{v - 0.1}$  及  $p = \frac{2}{v^2}$  的图形叠加即得, 如图 1.49 所示.

作下列无理函数的图形:

266.  $y = \pm \sqrt{-x - 2}$  (抛物线).

解  $y^2 = -(x + 2)$ , 如图 1.50 所示.

267.  $y = \pm x \sqrt{x}$  (半立方抛物线).

解  $y^2 = x^3$ , 如图 1.51 所示.




图 1.51




图 1.52

268.  $y = \pm \frac{1}{2} \sqrt{100 - x^2}$  (椭圆).

解  $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$ , 如图 1.52 所示.

269.  $y = \pm \sqrt{x^2 - 1}$  (双曲线).

解  $x^2 - y^2 = 1$ , 如图 1.53 所示.

270.  $y = \pm \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$ .

解  $y^2 = \frac{1-x}{1+x}, x = -1 + \frac{2}{1+y^2}$ ,

将  $x = -1$  及  $x = \frac{2}{1+y^2}$  的图形叠加即得, 如图 1.54 所示 ( $-1 < x \leq +1$ ).




图 1.53




图 1.54

$$271. y = \pm x \sqrt{100 - x^2}.$$

**解** 当  $x = 0, \pm 10$  时,  $y = 0$ .

将  $y = x$  和  $y = \sqrt{100 - x^2}$  的图形上点的纵坐标相乘, 即可描出图形. 如图 1.55 所示.




图 1.55




图 1.56

272.  $y = \pm x \sqrt{\frac{x}{10-x}}$  (蔓叶线).

解  $y^2(10-x) = x^3$ , 如图 1.56 所示.

273.  $y = \pm \sqrt{(x^2-1)(9-x^2)}$ .

解  $y = \pm \sqrt{16 - (x^2 - 5)^2}$ . 如图 1.57 所示.

#### 274. 作幂函数

$$y = x^n$$

当:(a) $n = 1, 3, 5$ ; (b) $n = 2, 4, 6$  时的图形.

解 如图 1.58 所示.

#### 275. 作幂函数

$$y = x^n$$

当:(a) $n = -1, -3$ ; (b) $n = -2, -4$  时的图形.

解 如图 1.59 所示.




图 1.57




图 1.58

1.  $y = \frac{1}{x}$ , 2.  $y = \frac{1}{x^2}$ , 3.  $y = \frac{1}{x^3}$ , 4.  $y = \frac{1}{x^4}$ .




图 1.59

### 276. 作根式

$$y = \sqrt[m]{x}$$

当: (a)  $m = 2, 4$ ;




图 1.60

(b)  $m = 3, 5$  时的图形.

解 如图 1.60 所示.

### 277. 设:

- (a)  $m = 2, k = 1$ ;      (b)  $m = 2, k = 3$ ;  
 (c)  $m = 3, k = 1$ ;      (d)  $m = 3, k = 2$ ;  
 (e)  $m = 3, k = 4$ ;      (f)  $m = 4, k = 2$ ;  
 (g)  $m = 4, k = 3$ .

作根式的图形

$$y = \sqrt[m]{x^k}$$

解 将所给数据代入  $y = \sqrt[m]{x^k}$ , 可知:

- (a) 即  $y = \sqrt{x}$  的图形, 见图 1.60.  
 (b)  $y = x \sqrt{x}$ , 如图 1.61 所示: 1;  
 (c) 即  $y = \sqrt[3]{x}$  的图形, 见图 1.60;  
 (d)  $y = \sqrt[3]{x^2}$ , 如图 1.61 所示: 2;  
 (e)  $y = x \sqrt[3]{x}$ , 如图 1.61 所示: 3;  
 (f) 即  $y = \sqrt{|x|}$  的图形;  
 (g)  $y = \sqrt[4]{x^3}$ , 如图 1.61 所示: 4.




图 1.61




图 1.62

### 278. 作指数函数

$$y = a^x$$

当  $a = \frac{1}{2}, 1, 2, e, 10$  时的图形.

解 如图 1.62 所示.

### 279. 作复合指数函数

$$y = e^{y_1}$$

的图形, 设:

$$(a) y_1 = x^2; (b) y_1 = -x^2; (c) y_1 = \frac{1}{x};$$

$$(d) y_1 = \frac{1}{x^2}; (e) y_1 = -\frac{1}{x^2}; (f) y_1 = \frac{2x}{1-x^2}.$$

解 (a) 如图 1.63 所示; (b) 如图 1.64 所示;




图 1.63




图 1.64




图 1.65




图 1.66

(c) 如图 1.65 所示; (d) 如图 1.66 所示;

(d) 如图 1.67 所示; (e) 如图 1.68 所示.




图 1.67




图 1.68

280. 作对数函数  $y = \log_a x$  当  $a = \frac{1}{2}, 2, e, 10$  时的图形.

解 如图 1.69 所示.

281. 作下列函数的图形:

$$(a) y = \ln(-x); (b) y = -\ln x.$$

解 如图 1.70 所示.




图 1.69




图 1.70

282. 设:

$$(a) y_1 = 1 + x^2; (b) y_1 = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3;$$

$$(c) y_1 = \frac{1-x}{1+x}; (d) y_1 = \frac{1}{x^2}; (e) y_1 = 1 + e^x.$$

作出对数复合函数  $y = \ln y_1$  的图形.

解 (a) 如图 1.71 所示;

(b) 存在域:  $x > 3$  或  $x < 1$ .

$y = \ln|x - 1| + 2\ln|x - 2| + 3\ln|x - 3|$ , 将此三个函数的图形叠加即得, 如图 1.72 所示;

(c)  $y = \ln(1 - x) - \ln(1 + x)$ , 将  $y = \ln(1 - x)$  及  $y = -\ln(1 + x)$  的图形叠加即得, 如图 1.73 所示 ( $-e < x < 1$ );




图 1.71




图 1.72




图 1.73




图 1.74

(d)  $y = \ln \frac{1}{x^2}$ , 如图 1.74 所示, 图形关于  $Oy$  轴对称;

(d) 如图 1.75 所示.




图 1.75

283. 作函数

$$y = \log_x 2$$

的图形

解 如图 1.76 所示.




图 1.76




图 1.77

### 284. 作函数

$$y = A \sin x$$

当  $A = 1, 10, -2$  时的图形.

解 如图 1.77 所示.

### 285. 作函数

$$y = \sin(x - x_0)$$

当  $x_0 = 0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}, \pi$  时的图形.

解 只要将  $y = \sin x$  的图形向右平移距离  $\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}, \pi$  即得, 如图 1.78 所示.

1.  $y = \sin x$ ; 2.  $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ ;

3.  $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ ; 4.  $y = \sin\left(x - \frac{3\pi}{4}\right)$ ;

5.  $y = \sin(x - \pi)$ .




图 1.78

### 286. 作函数

$$y = \sin nx$$

的图形. 设  $n = 1, 2, 3, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ .

解 如图 1.79 所示.

1.  $y = \sin x$ ;
2.  $y = \sin 2x$ ;
3.  $y = \sin 3x$ ;
4.  $y = \sin \frac{1}{2}x$ ;
5.  $y = \sin \frac{1}{3}x$ .




图 1.79

### 287. 把函数

$$y = a \cos x + b \sin x$$

化为下面的形状

$$y = A \sin(x - x_0),$$

再作它的图形.

#### 研究例子

$$y = 6 \cos x + 8 \sin x.$$

解  $y = \sqrt{a^2 + b^2} \left( \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos x + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin x \right),$

由于

$$\left| \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right| \leq 1, \left| \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right| \leq 1 \text{ 及}$$

$$\left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)^2 + \left(\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)^2 = 1,$$

故可令

$$\sin x_0 = \frac{-a}{\sqrt{a^2+b^2}}, \quad \cos x_0 = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}. \quad (1)$$

于是

$$y = A \sin(x - x_0) \quad (2)$$

其中

$$A = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (a^2 + b^2 \neq 0), x_0 \text{ 适合(1)式.}$$

(2) 式图形是这样作的:先把正弦曲线  $y = \sin x$  沿  $Ox$  轴平移距离  $|x_0|$  (或  $x_0 > 0$  时, 则向右移; 若  $x_0 < 0$  时向左移), 然后再从纵轴“伸长” $A$  倍(当  $A < 1$  时为压缩  $\frac{1}{A}$  倍).

对于例子

$$y = 6 \cos x + 8 \sin x,$$

$$A = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10,$$

$$\sin x_0 = -\frac{6}{10} = -\frac{3}{5},$$

$$\cos x_0 = -\frac{4}{5},$$

$$x_0 = -\arctg \frac{3}{4},$$

如图 1.80 所示.

作下列三角函数的图形:

288.  $y = \cos x.$

解 如图 1.81 所示.

289.  $y = \operatorname{tg} x.$

解 如图 1.82 所示.




图 1.80

290.  $y = \operatorname{ctg} x$ .

解 如图 1.83 所示.

291.  $y = \sec x$ .

解 如图 1.84 所示.

292.  $y = \csc x$ .

解 如图 1.85 所示.




图 1.81




图 1.82

图 1.83




图 1·84




图 1·85

293.  $y = \sin^2 x$ .

解 如图 1.86 所示.

294.  $y = \sin^3 x$ .

解 如图 1.87 所示.

295.  $y = \operatorname{ctg}^2 x$

解 如图 1.88 所示.




图 1·86




图 1·87

图 1·88

296.  $y = \sin x \cdot \sin 3x$ .

解 图形关于  $Oy$  轴对称, 周期为  $\pi$ . 将  $y = \frac{1}{2}\cos 2x$  及  $y = -\frac{1}{2}\cos 4x$  的图形叠加即得. 如图 1.89 所示.




图 1·89

297.  $y = \pm \sqrt{\cos x}$ .

解 图形关于  $Ox$  轴及  $Oy$  轴均对称, 是以  $2\pi$  为周期的周期函数, 如图 1.90 所示.




图 1·90

作下列函数的图形:

298.  $y = \sin x^2$ .

解 图形关于  $Oy$  轴对称. 因为

$$f(\sqrt{\pi}) = f(\sqrt{2\pi}) = \cdots = f(\sqrt{n\pi}) = 0.$$

并且  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{(n+1)\pi} - \sqrt{n\pi}) = 0$ , 所以曲线和横轴的相邻交点的相互距离所成的数列的极限为零.

由不等式  $\sin x^2 < x^2$ , 我们知道这条曲线位于抛物线  $y = x^2$  的下方, 如图 1.91 所示.

299.  $y = \sin \frac{1}{x}$ .

解  $-1 \leq y \leq 1$ .  $\lim_{x \rightarrow \infty} y = 0$ ,  $y = 0$  为渐近线.

当  $x$  由  $+\infty$  减小到  $\frac{2}{\pi}$  时, 则  $\frac{1}{x}$  由 0 增大到  $\frac{\pi}{2}$ , 而  $y$  由 0 增到 1; 但当  $x$  由  $\frac{2}{\pi}$  减小到  $\frac{2}{3\pi}$ , 则  $\frac{1}{x}$  由  $\frac{\pi}{2}$  增大到  $\frac{3\pi}{2}$ , 而  $y$  由 1 减小到 -1. 当  $x = \frac{1}{\pi}$  时,  $y = 0$  等. 因为  $y$  是奇函数, 故图形关于原点对称. 当  $x$  无限接近 0 时, 函数在 -1 与 1 之间摆动, 并且凝聚于 0 点, 而在点  $x = 0$  处, 函数  $y$  没有定义. 如图 1.92 所示.




图 1.91




图 1·92

$$300. \quad y = x \cos \frac{\pi}{x}.$$

解  $-x \leq y \leq x, \lim_{x \rightarrow \infty} y = \infty.$

当  $x = \frac{2}{2k+1}$  ( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ) 时,  $y = 0$ .

当  $x > 2$  时,  $y$  单调增加, 因为  $y$  是奇函数, 故图形关于原点对称. 而在点  $x = 0$ , 函数  $y$  没有定义.

当  $x$  无限接近 0 时, 函数作无限次衰减摆动, 并凝聚于  $O$  点. 如图 1.93 所示.




图 1·93

$$301. y = \operatorname{tg} \frac{\pi}{x}.$$

**解** 当  $x = \frac{1}{k}$  ( $k = \pm 1, \pm 2, \dots$ ) 时,  $y = 0$ .

当  $x \rightarrow \frac{2}{2k+1}$  ( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ) 时,  $y \rightarrow \infty$ .

当  $x > 2$  时,  $y > 0$ , 且当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $y \rightarrow 0$ .

因为  $y$  为奇函数, 故图形关于原点对称.

当  $x \rightarrow 0$  时, 图形凝聚于  $O$  点, 而在点  $x = \frac{2}{2k+1}$  及  $0$ , 函数  $y$  是没有定义的.

如图 1.94 所示.




图 1.94

$$302. y = x \left( 2 + \sin \frac{1}{x} \right).$$

**解** 先作  $y = x \sin \frac{1}{x}$  的图形. 因为  $y$  为偶函数, 故图形关于  $Oy$  轴对称.

当  $x = \frac{2}{(2k+1)\pi} (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$  时,  $y = \pm x$ .

当  $x = \frac{1}{k\pi} (k=\pm 1, \pm 2, \dots)$  时,  $y=0$ .

当  $x > \frac{2}{\pi}$  时,  $y$  单调增加, 且有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 1^+$$

如图 1.95 所示(在点  $x=0$  无定义).




图 1.95

其次, 再将函数  $y = 2x$  及  $y = x \sin \frac{1}{x}$  的图形“叠加”, 即得

$$y = x \left( 2 + \sin \frac{1}{x} \right)$$

的图形. 如图 1.96 所示.

\* ) 此结果参看本章 § 5.

$$303. y = \pm \sqrt{1 - x^2} \sin \frac{\pi}{x}.$$

解 图形关于原点及  
 $Oy$  轴,  $Ox$  轴均对称.

由于

$$\begin{aligned} & -\sqrt{1 - x^2} \leqslant y \\ & \leqslant \sqrt{1 - x^2} \\ & (|x| \leqslant 1), \end{aligned}$$

故图形位于圆  $x^2 + y^2 = 1$  内.

将函数  $y = \pm \sqrt{1 - x^2}$

与  $y = \sin \frac{\pi}{x}$  的纵坐标

对应相乘, 即可描出  
所求的图形.

如图 1.97 所示.

$$304. y = \frac{\sin x}{x}.$$

解  $\lim_{x \rightarrow 0} y = 1$ .

$\lim_{x \rightarrow \infty} y = 0$ . 由于  $|y| \leqslant \frac{1}{|x|}$ ,

故图形在  $y = -\frac{1}{x}$

及  $y = \frac{1}{x}$  之间, 又图形关于  $Oy$  轴对称. 当  $x = k\pi$  时,  $y =$




图 1.96




图 1.97

$0$  ( $k = \pm 1, \pm 2, \dots$ ).

如图 1·98 所示.




图 1·98

305.  $y = e^x \cos x$ .

解 由于  $-e^x \leqslant y \leqslant e^x$ , 故图形在  $y = e^x$  及  $y = -e^x$  之间.

当  $x = (2k + 1) \frac{\pi}{2}$  ( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ) 时,  $y = 0$ . 且  $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = 0$ , 但  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \cos x$  却不存在.

如图 1.99 所示.




图 1.99

$$306. y = \pm 2^{-x} \sqrt{\sin \pi x}.$$

解 当  $2k \leq x \leq (2k+1)$  ( $k = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$ ) 时,  $y$  值才确定. 当  $x = 2k + \frac{1}{2}$  时,  $y = \pm 2^{-x}$ .

图形关于  $Ox$  轴对称.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 0$ , 而  $\lim_{x \rightarrow -\infty} y$  不存在.

如图 1·100 所示.




图 1·100

$$307. y = \frac{\cos x}{1+x^2}.$$

$$\text{解 } -\frac{1}{1+x^2} \leq y \leq \frac{1}{1+x^2},$$

图形在  $y = -\frac{1}{1+x^2}$  及  $= \frac{1}{1+x^2}$  之间, 且关于  $Oy$  轴对称.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} y = 1.$$

如图 1·101 所示.




图 1·101

308.  $y = \ln(\cos x)$ .

解 存在域是使  $\cos x > 0$  的开区间

$$\left( (4k-1)\frac{\pi}{2}, (4k+1)\frac{\pi}{2} \right) \quad (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

的全体. 函数  $y$  是以  $2\pi$  为周期的周期函数. 在区间  $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$  内,  $y$  单调增加, 且  $y < 0$ . 在  $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$  内,  $y$  单调减小,  $y < 0$ . 最大值是  $y = \ln \cos 0 = 0$ .

又  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}+0} y = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} y = -\infty$ , 如图 1·102 所示.




图 1·102

309.  $y = \cos(\ln x)$ .

解 存在域为数  $x > 0$  的全体.

当  $x = e^{(2k+1)\frac{\pi}{2}}$  ( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ) 时,  $y = 0$ .

当  $x = e^{2k\pi}$  ( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ) 时,  $y = 1$ ;

而当  $x = e^{(2k+1)\pi}$  时,  $y = -1$ .

图形始终在直线  $y = -1$  和  $y = 1$  之间摆动, 而且越靠近原点时, 摆动越密.

如图 1.103 所示. (两轴所取的单位不一致).




图 1.103.

310.  $y = e^{\frac{1}{\sin x}}$ .

解  $y > 0$ .

函数  $y$  是以  $2\pi$  为周期的周期函数.

当  $0 < x < \frac{\pi}{2}$  时,  $y$  单调减少;

当  $\frac{\pi}{2} < x < \pi$  时,  $y$  单调增加. 又有

$$\lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow \pi^-} y = +\infty.$$

$y|_{x=\frac{\pi}{2}} = e$  为区间  $(0, \pi)$  内, 函数  $y$  的最小值.

同理,  $x$  由  $\pi$  到  $\frac{3\pi}{2}$  时,  $y$  由 0 增到  $\frac{1}{e}$ ; 而  $x$  由  $\frac{3\pi}{2}$  到  $2\pi$  时,  $y$  由  $\frac{1}{e}$  减到 0.  $\lim_{x \rightarrow \pi^+} y = \lim_{x \rightarrow 2\pi^-} y = 0$ .

如图 1·104 所示.

作下列反三角函

数的图形:

$$311. y = \arcsin x.$$

解 如图 1.105 所示的 AB 段曲线.

$$312. y = \arccos x.$$

解 如图 1.106 所示的 AB 段曲线.




图 1·104




图 1·105




图 1·106

313.  $y = \operatorname{arctg} x$ .

解 如图 1.107 所示的 AB 段曲线.

314.  $y = \operatorname{arcctg} x$ .

解 如图 1.108 所示的 AB 段曲线.




图 1.107




图 1.108

315.  $y = \arcsin \frac{1}{x}$ .

解 图形关于原点对称.

存在域是区间  $(-\infty, -1)$  和  $(1, +\infty)$ .

当  $1 \leq x < +\infty$  时, 由于  $\frac{1}{x}$  单调减少, 所以,  $y$  也是减函数, 且有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1+0} y &= \frac{\pi}{2} \\ &= y|_{x=1}, \lim_{x \rightarrow +\infty} y \\ &= 0.\end{aligned}$$

如图 1.109 所示.




图 1.109

$$316. y = \arccos \frac{1}{x}.$$

解 存在域是区间  $(-\infty, -1]$  和  $[1, +\infty)$ .

当  $1 \leq x < +\infty$  时, 由于  $\frac{1}{x}$  单调减少, 所以,  $y$  是增函数, 且有

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} y = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} y = \frac{\pi}{2}.$$

同理, 当  $-\infty < x \leq -1$  时,  $y$  单调增加, 且有

$$\lim_{x \rightarrow -1-0} y = \pi, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} y = \frac{\pi}{2}.$$

如图 1·110 所示.




图 1·110

$$317. y = \operatorname{arctg} \frac{1}{x}.$$

解 图形关于原点对称.

当  $x > 0$  时, 由于  $\frac{1}{x}$  单调减少, 所以,  $y$  是减函数, 且有

$$\lim_{x \rightarrow +0} y = \frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} y = 0.$$

如图 1·111 所示.

318.  $y = \arcsin(\sin x)$ .

解  $\sin y = \sin x$ ,  $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ .

因此, 当  $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$  时,  $y = x$ ;

当  $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$  时,  $y = \pi - x$ ;

当  $\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{5\pi}{2}$  时,  $y = x - 2\pi$ .

一般地,

当  $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$  时,  $y = x - 2k\pi$ ;  
( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ )

而当  $\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq x \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$  时,  $y = (\pi - x) + 2k\pi$ .

如图 1·112 所示.




图 1·111




图 1·112

$$319. y = \arcsin(\cos x).$$

解  $\sin y = \cos x, -\frac{\pi}{2} \leqslant y \leqslant \frac{\pi}{2}$ .

因此, 当  $-\pi \leqslant x \leqslant 0$  时,  $y = \frac{\pi}{2} + x$ ;

当  $0 \leqslant x \leqslant \pi$  时,  $y = \frac{\pi}{2} - x$ .

一般地,

当  $(2k-1)\pi \leqslant x \leqslant 2k\pi$  时,  $y = \left( \frac{\pi}{2} + x \right) - 2k\pi$   
 $(k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ ;

而当  $2k\pi \leqslant x \leqslant (2k+1)\pi$  时,  $y = \left( \frac{\pi}{2} - x \right) + 2k\pi$ .

如图 1·113 所示.




图 1·113

$$320. y = \arccos(\cos x).$$

解  $\cos y = \cos x, 0 \leqslant y \leqslant \pi$ .

因此, 当  $0 \leqslant x \leqslant \pi$  时,  $y = x$ ;

当  $\pi \leqslant x \leqslant 2\pi$  时,  $y = 2\pi - x$ ;

当  $-\pi \leqslant x \leqslant 0$  时,  $y = -x$ .

一般地，

当  $(2k - 1)\pi \leq x \leq 2k\pi$  时， $y = -x + 2k\pi$  ( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ )；

而当  $2k\pi \leq x \leq (2k + 1)\pi$  时， $y = x - 2k\pi$ .

如图 1·114 所示。




图 1·114

321.  $y = \operatorname{arctg}(\operatorname{tg}x)$ .

解  $\operatorname{tg}y = \operatorname{tg}x$ ,  $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ .

因此, 当  $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  时,  $y = x$ ;

当  $\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$  时,  $y = x - \pi$ ;

当  $-\frac{3\pi}{2} < x < -\frac{\pi}{2}$  时,  $y = \pi + x$ .

一般地,

当  $-\frac{\pi}{2} + k\pi < x < \frac{\pi}{2} + k\pi$  时,  $y = x - k\pi$  ( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ).

如图 1·115 所示.




图 1·115

$$322. y = \arcsin(2\sin x).$$

$$\text{解 } \sin y = 2\sin x, -\frac{2}{\pi} \leq y \leq \frac{\pi}{2}.$$

存在域为区间:

$$\left(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right), \left(\frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}\right), \dots$$

的全体. 即  $\left(-\frac{\pi}{6} + k\pi, \frac{\pi}{6} + k\pi\right)$  ( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ )

的全体.

利用复合函数作图法得其图形, 如图 1.116 所示, 它关于原点对称.




图 1·116

323. 设

$$(a) y_1 = 1 - \frac{x}{2}; \quad (b) y_1 = \frac{2x}{1+x^2};$$

$$(c) y_1 = \frac{1-x}{1+x}, \quad (d) y_1 = e^x.$$

作函数

$$y = \arcsin y_1$$

的图形.

解 (a) 存在域

为满足不等式

$$0 \leq x \leq 4$$

的数  $x$  的集合.

当  $0 \leq x \leq 2$  时,

$y$  由  $\frac{\pi}{2}$  减少到 0;

而当  $2 \leq x \leq 4$  时,

$y$  由 0 减少到  $-\frac{\pi}{2}$ .

如图 1·117 所示.




图 1·117

(b) 图形关于原点对称. 存在域为全体实数.

当  $x$  由 0 增到 1

时, 由于  $\frac{2x}{1+x^2}$

为增函数, 故  $y$  由

0 增到的  $\frac{\pi}{2}$ . 而当

$x > 1$  时,  $\frac{2x}{1+x^2}$  为减函数, 故  $y$  由  $\frac{\pi}{2}$  减少到 0, 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y$




图 1·118

$= 0$ . 如图 1·118 所示.

(b) 要  $\left| \frac{1-x}{1+x} \right| \leqslant 1$ , 只要  $x \geqslant 0$ , 故存在域为  $x \geqslant 0$  的数  $x$  的集合. 当  $x$  由 0 增到 1 时,  $\frac{1-x}{1+x}$  由 1 减少到 0, 而  $y$  则由  $\frac{\pi}{2}$  减少到 0; 而当  $x$  由 1 增到  $+\infty$  时,  $\frac{1-x}{1+x}$  由 0 减少到  $-1$ , 而  $y$  由 0 减少到  $-\frac{\pi}{2}$ , 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = -\frac{\pi}{2}$ , 如图 1·119 所示.




图 1·119

(c) 存在域为  $-\infty < x \leqslant 0$  的数  $x$  的集合. 当  $x$  由  $-\infty$  增到 0 时,  $e^x$  由 0 增到 1, 而  $y$  则由 0 增到  $\frac{\pi}{2}$ , 如图

1·120 所示.




图 1·120

324. 设

$$(a) y_1 = x^2; (b) y_1 = \frac{1}{x^2};$$

$$(e) y_1 = \ln x; (r) y_1 = \frac{1}{\sin x}.$$

作函数

$$y = \arctg y_1$$

的图形.

解 (a) 如图 1·121 所示的 AB 曲线.

(b) 如图 1·122 所示.

(c) 如图 1·123 所示的 OA 曲线.

(r) 以  $2\pi$  为周期. 当  $x$  由 0 增到  $\frac{\pi}{2}$  时,  $\frac{1}{\sin x}$  由  $+\infty$  减到 1, 而  $y$  则由  $\frac{\pi}{2}$  减到  $\frac{\pi}{4}$ . 余类推, 如图 1·124 所示.




图 1·121




图 1·122




图 1·123




图 1·124

325. 已知函数  $y = f(x)$  的图形，

作下列各函数的图形

$$(a) y = -f(x);$$

$$(b) y = f(-x);$$

$$(c) y = -f(-x).$$

解 (a) 函数  $y = -f(x)$

的图形和函数  $y = f(x)$

的图形关于  $Ox$  轴

对称. 如图 1·125

所示.

(b) 函数  $y =$

$f(-x)$  的图形和

函数  $y = f(x)$  的

图形关于  $Oy$  轴

对称. 如图 1·126 所示.




图 1·125




图 1·126

(b) 函数  $y = -f(-x)$  的图形和函数  $y = f(x)$  的图形关于原点对称. 如图 1·127 所示.

326. 已知函数  $y = f(x)$  的图形, 作下列各函数的图形:

- (a)  $y = f(x - x_0)$ ;  
 (b)  $y = y_0 + f(x - x_0)$ ;

- (c)  $y = f(2x)$ ;  
 (d)  $y = f(kx + b)$   
 $(k \neq 0)$

解 (a) 函数  $y = f(x - x_0)$  的图形可由  $y = f(x)$  的图形平移距离  $|x_0|$  得出.




图 1·127




图 1·128

当  $x_0 > 0$  时, 向右平移;

当  $x_0 < 0$  时, 向左平移.

如图 1·128 所示.

(b) 函数  $y = y_0 + f(x - x_0)$  的图形可由  $y = f(x)$  的图形先平移距离  $|x_0|$ , 再上下平移距离  $|y_0|$  得出, 其中

当  $y_0 > 0$  时, 向上平移;

当  $y_0 < 0$  时, 向下平移.

事实上, 只要先将坐标原点平移到点  $(x_0, y_0)$ . 坐标轴的

方向均不变,再在新坐标系中作  $y' = f(x')$  的图形,其中  $y' = y - y_0$ ,  $x' = x - x_0$ .

图形如图 1·129 所示.




图 1·129

(b)  $y = f(2x)$  的图形可由  $y = f(x)$  的图形沿  $Ox$  轴方向缩小二倍得出.

图形如图 1·130 所示.




图 1·130

(c)  $y = f(kx + b)$

的图形可由  $y = f(x)$  的图形先沿  $Ox$  轴方向“压缩” $k$  倍 ( $0 < k < 1$  时, 理解为“放大”). 然后再将所得图形平移距离  $|b|$ .

图形如图 1.131 所

示.

### 327. 作函数的图形

(a)  $y = 2 + \sqrt{1 - x}$ ; (b)  $y = 1 - e^{-x}$ ;

(c)  $y = \ln(1 + x)$ . (d)  $y = -\frac{\pi}{2} \arcsin(1 + x)$ ;

(e)  $y = 3 + 2\cos 3x$ .

解 (a) 如图 1.132 所示.

(b) 如图 1.133 所示.

(c) 如图 1.134 所示.




图 1.131




图 1.132




图 1.133

(e) 如图 1.135 所示的  $AB$  曲线.

(π) 如图 1·136 所示.




图 1·134




图 1·135




图 1·136

328. 已知函数  $y = f(x)$  的图形, 作下列函数的图形:

$$(a) y = |f(x)|; \quad (b) y = \frac{1}{2}(|f(x)| + f(x));$$

$$(b) y = \frac{1}{2}(|f(x)| - f(x)).$$

解 (a) 当  $f(x) \geq 0$  时,  $y = f(x)$ ;  
 当  $f(x) < 0$  时,  
 $y = -f(x)$ ;

如图 1·137 黑粗线所示.

(b) 当  $f(x) \geq 0$  时,  $y = f(x)$ ;  
 当  $f(x) < 0$  时,  
 $y = 0$ .

如图 1·138 黑粗线所示.

(c) 当  $f(x) \geq 0$  时,  $y = 0$ ;  
 当  $f(x) < 0$  时,  
 $y = -f(x)$ .

如图 1·139 黑粗线所示.

329. 已知函数  $y = f(x)$  的图形, 作下列函数的图形:

- (a)  $y = f^2(x)$ ; (b)  $y = \sqrt{f(x)}$ ;
- (c)  $y = \ln f(x)$ ; (d)  $y = f[f(x)]$ ;




图 1·137




图 1·138




图 1·139

(d)  $y = \operatorname{sng} f(x)$ ; (e)  $y = [f(x)]$ .

解 (a) 以  $y = 1$  为图形的分界线.

如图 1·140 所示. 1:  $y = f(x)$ ; 2:  $y = f^2(x)$ .

(b) 当  $f(x) > 1$  时,  $\sqrt{f(x)} < f(x)$ ; 而当  $0 \leq f(x) < 1$  时,  $\sqrt{f(x)} \geq f(x)$ .

如图 1·141 所示. 1:  $y = f(x)$ ; 2:  $y = \sqrt{f(x)}$ .




图 1·140




图 1·141

(c) 当  $f(x) \geq 1$  时,  $\ln f(x) < f(x)$ ; 而当  $0 < f(x) < 1$  时,  $\ln f(x) > f(x)$ , 故  $y = \ln f(x)$  的图形始终在  $y = f(x)$  之下.

如图 1·142 所示.

(d) 若  $f(x)$  的存在域为  $[a, b]$ , 则仅当  $f(x)$  之值在  $a$  与  $b$  之间, 才能使  $f[f(x)]$  有意义. 其详细作图法见 330 题(b).

如图 1·143 所示. 1:  $y = f(x)$ ; 2:  $y = f[f(x)]$ .

(e) 当  $f(x) > 0$  时,  $y = 1$ ; 当  $f(x) = 0$  时,  $y = 0$ ; 当  $f(x) < 0$  时,  $y = -1$ .

如图 1·144 所示.




图 1·142




图 1·143

(e) 当  $n \leqslant f(x) < n + 1$  时,  $y = n$  ( $n$  为自然数).

如图 1·145 所示.

其中图 1·144 及 1·145 均为黑粗线所示的图形.




图 1·144




图 1·145

330. 已知函数  $y = f(x)$  和  $y = g(x)$  的图形, 作下列函数的图形:

- (a)  $y = f(x) + g(x)$ ; (b)  $y = f(x)g(x)$ ;
- (c)  $y = f[g(x)]$ .

解 (a) 利用图形相加法即得.

如图 1.146 所示.

(b) 利用图形相乘法  
即得.

如图 1.147 所示.

(c) 如图 1.148 所示.  
设  $P$  点是  $Ox$  轴上横坐标为  $x$  的点. 通过  $P$  点引铅直线, 它和  $y = g(x)$  的图形相交得  $Q$  点(当然假定值  $PQ$  在  $f(x)$  的存在域内).  $PQ = g(x)$ . 过  $Q$  点引水平线, 它与  $y = x$  交于  $R$  点, 过  $R$  作铅直线与  $Ox$  轴及  $y = f(x)$  分别交于  $T$  点及  $S$  点, 则  $OT = TR = PQ = g(x)$ , 因而  $TS = f[g(x)]$ . 最后, 把  $S$  点向通过  $P$  点的铅直线投影得  $M$  点, 此即函数  $y = f[g(x)]$  图形上的  
一点. 至于该图形上的其它点, 同法求得. 但要注意,  
函数  $y = f[g(x)]$  的存在域是满足不等式




图 1.146




图 1.147




图 1.148

$$a \leq g(x) \leq b$$

的数  $x$  的集合, 式中  $[a, b]$  是  $f(x)$  的存在域.

利用图形的相加法, 作下列函数的图形:

331.  $y = 1 + x + e^x$ .

解 如图 1.149 所示.

332.  $y = (x+1)^{-2} + (x-1)^{-2}$

解 图形关于  $Oy$  轴对称.

如图 1.150 所示.




图 1.149




图 1.150

333.  $y = x + \sin x$ .

解 如图 1.151 所示.

$$P_1Q_1 = P_2Q_2 = \dots = 1.$$

334.  $y = x + \operatorname{arctg} x$ .

解 如图 1.152 所示, 图中仅画了主值的一支, 一般地, 在平行线  $y = x + (2k+1)\frac{\pi}{2}$  及  $y = x + (2k-1)\frac{\pi}{2}$  之间 ( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ), 有类似的一支.




图 1.151




图 1.152

$$335. \quad y = \cos x + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{3} \cos 3x.$$

**解** 图形关于  $Oy$  轴对称, 且关于直线  $x=k\pi$  对称.  
周期为  $2\pi$ . 如图 1.153 所示.




图 1.153

$$336. \quad y = \sin x - \frac{1}{3} \sin 3x + \frac{1}{5} \sin 5x.$$

**解** 图形关于原点对称, 周期为  $2\pi$ , 且有  $f(x+\pi) = -f(x)$ , 故在  $[0, 2\pi]$  内图形关于直线  $x=\pi$  反对称\*. 因此, 我们只需做出  $[0, \pi]$  内的图形即可.

如图 1.154 所示.

\* ) 即关于点  $\pi$  对称, 也称之为以  $\pi$  为周期的反周期函数.




图 1.154

$$337. y = \sin^4 x + \cos^4 x.$$

解 图形关于  $Oy$  轴对称, 周期为  $\frac{\pi}{2}$ .

如图 1.155 所示.




图 1.155

$$338. y = |1-x| + |1+x|.$$

解 当  $-1 \leq x \leq 1$  时,  $y = 2$ ;

当  $x < -1$  时,  $y = -2x$ ;

当  $x > 1$  时,  $y = 2x$ .

如图 1.156 所示.

$$339. y = |1-x| - |1+x|.$$




图 1.156

解 当  $-1 \leq x \leq 1$  时,  $y = -2x$ ;

当  $x < -1$  时,  $y = 2$ ;

当  $x > 1$  时,  $y = -2$ .

如图 1.157 所示.

340. 作双曲线函数的图形:

(a)  $y = \operatorname{ch}x$ , 式中  $\operatorname{ch}x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$ ;

(b)  $y = \operatorname{sh}x$ ; 式中  $\operatorname{sh}x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$ ;

(c)  $y = \operatorname{th}x$ ; 式中  $\operatorname{th}x = \frac{\operatorname{sh}x}{\operatorname{ch}x}$ .

解 如图 1.158 所示.




图 1.157




图 1.158

利用图形的相乘法, 作下列函数的图形:

341.  $y = x \sin x$ .

解 当  $x = k\pi$  ( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ) 时,  $y = 0$ .

图形关于  $Oy$  轴对称.

当  $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$  时,  $y = x$ ;

又当  $x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$  时,  $y = -x$ .

如图 1.159 所示.




图 1.159

342.  $y = x \cos x$ .

解 图形关于原点对称.




图 1.160

当  $x = (2k+1)\frac{\pi}{2}$  ( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ) 时,  $y = 0$ ;

当  $x = 2k\pi$  时,  $y = x$ ; 当  $x = (2k+1)\pi$  时,  $y = -x$ .

如图 1.160 所示.

343.  $y = x^2 \sin^2 x$ .

**解** 只要将图形  $y = x \sin x$  作出后, 再按 329 题(a) 的作法画出. 如图 1.161 所示.

其实, 我们也可由下列几点画出该函数的图形:

$$0 \leqslant y \leqslant x^2;$$

当  $x = k\pi (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$  时,  $y=0$ ;

当  $x=(2k+1)\frac{\pi}{2}$  时,  $y=x^2$ .

图形关于  $Oy$  轴对称.




图 1.161

344.  $y = \frac{\sin x}{1+x^2}$ .

**解** 图形关于原点对称.

当  $x=k\pi (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$  时,  $y=0$ ;

当  $x=\frac{3\pi}{2}+2k\pi$  时,  $y=-\frac{1}{1+x^2}$ ;




图 1.162

当  $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$  时,  $y = \frac{1}{1+x^2}$ .

当  $x \rightarrow \infty$  时,  $y \rightarrow 0$ .

如图 1.162 所示.

345.  $y = e^{-x^2} \cos 2x$ .

解 因  $-e^{-x^2} \leq y \leq e^{-x^2}$ , 故图形在图形  $y = e^{-x^2}$  及  $y = -e^{-x^2}$  之间.

如图 1.163 所示.




图 1.163

346.  $y = x \operatorname{sgn}(\sin x)$ .




图 1.164

解 图形关于  $Oy$  轴对称.

当  $x=k\pi$  ( $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ) 时,  $y=0$ ;

当  $2k\pi < x < (2k+1)\pi$  时,  $y=x$ ;

当  $(2k+1)\pi < x < (2k+2)\pi$  时,  $y=-x$ .

如图 1.164 所示.

347.  $y=[x] \cdot |\sin \pi x|$ .

解 当  $x=k$  ( $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ) 时,  $y=0$ .

当  $n < x < n+1$  ( $n$  为自然数) 时,  $y=n|\sin \pi x|$ .

如图 1.165 所示.




图 1.165

348.  $y=\cos x \cdot \operatorname{sgn}(\sin x)$ .

解 图形关于原点对称. 周期为  $\pi$ .

当  $x=k\pi$  ( $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ) 时,  $y=0$ ;

当  $2k\pi < x < (2k+1)\pi$  时,  $y=\cos x$ ;

当  $(2k+1)\pi < x < (2k+2)\pi$  时,  $y=-\cos x$ .

如图 1.166 所示.




图 1.166

349. 设

$$f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & \text{若 } |x| \leq 1; \\ 0, & \text{若 } |x| > 1. \end{cases}$$

作函数

$$y = f(x)f(a-x)$$

当 (a)  $a = 0$ , (b)  $a = 1$ ,

(c)  $a = 2$  时的图形.

解 (a)  $y = f(x)f(-x)$ .

因为  $f(x)$  为偶函数,

所以,  $y = f^2(x)$ .




图 1.167

由函数  $f(x)$  的定义易得

$$y = \begin{cases} (1+x)^2, & \text{若 } -1 \leq x < 0, \\ (1-x)^2, & \text{若 } 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{若 } |x| > 1. \end{cases}$$

如图 1.167 所示.

$$(b) y = f(x) \cdot f(1-x).$$

由函数  $f(x)$  的定义易得

$$y = \begin{cases} 0, & \text{若 } x \leq 0, \\ x - x^2, & \text{若 } 0 < x < 1, \\ 0, & \text{若 } x \geq 1. \end{cases}$$

如图 1.168 所示.




图 1.168

$$(b) y = f(x)f(2-x).$$

由函数  $f(x)$  的定义易得

$$y=0.$$

如图 1.169 所示.



图 1.169

350. 作函数  $y = x + \sqrt{x} \operatorname{sgn}(\sin \pi x)$  的图形.

解 当  $2k < x < 2k+1$  ( $k = 0, 1, 2, \dots$ ) 时,

$$\sin \pi x > 0,$$

$$\operatorname{sgn}(\sin \pi x) = 1,$$

$$\text{因而, } y = x + \sqrt{x}.$$

而当  $2k+1 < x < 2k+2$  时,




图 1.170

$$y = x - \sqrt{x}.$$

图 1.170 中系函数

$$y = \sqrt{x} \operatorname{sgn}(\sin \pi x)$$

的图形(黑粗线所示).

其中在  $y=x$  上的一支系  $y=\sqrt{x}+x$  的一段.

至于函数

$y = x + \sqrt{x} \cdot \operatorname{sgn}(\sin \pi x)$  的图形如图 1.171 所示.

作函数

$$y = \frac{1}{f(x)}$$

的图形, 设:




图 1.171

$$351. f(x) = x^2(1-x^2).$$

$$\text{解 } y = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{1-x^2}.$$

利用图形的相加法, 将函数  $y = \frac{1}{x^2}$  及  $y = \frac{1}{1-x^2}$  的图形相加即得. 如图 1.172 所示.

$$352. f(x) = x(1-x)^2.$$

解  $y = \frac{1}{x(1-x)^2} = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} + \frac{1}{(1-x)^2}$ .

当  $x > 0$  时,  $y > 0$ ;

当  $x < 0$  时,  $y < 0$ .

利用图形的相加法即得, 如图 1.173 所示.




图 1.172





图 1.173

353.  $f(x) = \sin^2 x$ .

解  $y = \frac{1}{\sin^2 x}$  是一周期为  $\pi$  的周期函数.

图形关于  $Oy$  轴对称. 如图 1.174 所示.



354.  $f(x) = \ln x$ .

图 1.174

解  $y = \frac{1}{\ln x}$ .

当  $0 < x < 1$  时,  $y$  由 0 下降到  $-\infty$ ;

当  $1 < x < +\infty$  时,  $y$  由  $+\infty$  下降到 0. 如图 1.175 所示.




图 1.175

355.  $f(x) = e^x \sin x$ .

解  $y = e^{-x} \csc x$ .




图 1.176

因为  $|\csc x| \geq 1$ , 所以

$$|y| \geq e^{-x}.$$

利用图形的相乘法即得. 如图 1.176 所示.

356. 设:

$$f(u) = \begin{cases} -1, & \text{若 } -\infty < u < -1; \\ u, & \text{若 } -1 \leq u \leq 1; \\ 1, & \text{若 } 1 < u < +\infty. \end{cases}$$

作复合函数

$$y = f(u)$$

的图形, 其中  $u = 2 \sin x$ .

解 如图 1.177 所示.

当  $|x - k\pi| \leq \frac{\pi}{6}$  时,

$$\begin{aligned} y &= 2 \sin x; \text{ 当 } \frac{\pi}{6} < |x - k\pi| \\ &< \frac{5\pi}{6}, y = (-1)^k (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \end{aligned}$$

357. 设

$$\varphi(x) = \frac{1}{2}(x + |x|) \text{ 和}$$

$$\psi(x) = \begin{cases} x, & \text{若 } x < 0; \\ x^2, & \text{若 } x \geq 0. \end{cases}$$

作下列函数的图形:

$$(a) y = \varphi[\varphi(x)]; \quad (b) y = \varphi[\psi(x)],$$

$$(c) y = \psi[\varphi(x)]; \quad (d) y = \psi[\psi(x)].$$

$$\text{解 (a)} \varphi(x) = \begin{cases} x, & \text{若 } x \geq 0; \\ 0, & \text{若 } x < 0. \end{cases}$$

$\varphi[\varphi(x)] = \varphi(x)$ . 如图 1.178 所示.




图 1.177




图 1.178




图 1.179

$$(6) \varphi[\psi(x)] = \begin{cases} x^2, & \text{若 } x \geq 0; \\ 0, & \text{若 } x < 0. \end{cases}$$

如图 1.179 所示.

$$(b) \psi[\varphi(x)] = \begin{cases} x^2, & \text{若 } x \geq 0; \\ 0, & \text{若 } x < 0. \end{cases}$$

如图 1.179 所示.

$$(r) \psi[\psi(x)] = \begin{cases} x^4, & \text{若 } x \geq 0; \\ x, & \text{若 } x < 0. \end{cases}$$

如图 1.180 所示.

358. 设

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1, & \text{若 } |x| \leq 1; \\ 0, & \text{若 } |x| > 1. \end{cases}$$

及

$$\psi(x) = \begin{cases} 2 - x^2, & \text{若 } |x| \leq 2; \\ 2, & \text{若 } |x| > 2. \end{cases}$$

作函数:

$$(a) y = \varphi[\varphi(x)];$$

$$(6) y = \varphi[\psi(x)];$$

$$(b) y = \psi[(\varphi(x))];$$

$$(r) y = \psi[\psi(x)] \text{ 的图形.}$$

$$\text{解 (a)} \varphi[\varphi(x)] = 1.$$

如图 1.181 所示.




图 1.180




图 1.181

(6)  $\varphi[\psi(x)] = \varphi[\psi(-x)]$ , 故图形关于  $Oy$  轴对称.

当  $0 \leq x < 1$  时,  
 $\psi(x) = 2 - x^2$ ,

由于

$$1 < 2 - x^2 \leq 2,$$

所以,  $\varphi[\psi(x)] = 0$ .

当  $1 \leq x \leq \sqrt{3}$   
 时,  $\psi(x) = 2 - x^2$ , 由  
 于

$$-1 \leq 2 - x^2 \leq 1,$$

所以,  $\varphi[\psi(x)] = 1$ .

当  $\sqrt{3} < x \leq 2$   
 时,  $\psi(x) = 2 - x^2$ , 由于

$$-2 \leq 2 - x^2 < -1,$$

所以,  $\varphi[\psi(x)] = 0$ .

当  $x > 2$  时,  $\psi(x) = 2$ , 所以,  $\varphi[\psi(x)] = 0$ . 如图 1.182  
 所示.




图 1.182




图 1.183

$$(b) \varphi[\psi(x)] = \begin{cases} 1, & \text{若 } |x| \leq 1; \\ 2, & \text{若 } |x| > 1. \end{cases}$$

如图 1.183 所示.

$$(c) \psi[\psi(x)] = \begin{cases} 2 - (2 - x^2)^2, & \text{若 } |x| \leq 2; \\ -2, & \text{若 } |x| > 2. \end{cases}$$

如图 1.184 所示.




图 1.184

359. 由函数  $f(x)$  定义于正数域  $x > 0$  内, 把  $f(x)$  延拓到负数域  $x < 0$  内, 使所得的函数为: (1) 偶函数; (2) 奇函数. 设

$$(a) f(x) = 1 - x; \quad (b) f(x) = 2x - x^2;$$

$$(c) f(x) = \sqrt{x}; \quad (d) f(x) = \sin x;$$

$$(e) f(x) = e^x; \quad (f) f(x) = \ln x.$$

作出对应的函数的图形.

解 (a) (1) 当  $x < 0$  时, 定义  $f(x) = 1 + x$ , 则  $f(x)$  在整个数轴上为偶函数.

(2) 当  $x < 0$  时, 定义  $f(x) = -(1 + x)$ , 则  $f(x)$  在整个数轴上为奇函数.

如图 1.185 所示.

(b) (1) 当  $x < 0$  时, 定义  $f(x) = -2x - x^2$  即行;

(2) 当  $x < 0$  时, 定义  $f(x) = 2x + x^2$  即行.

如图 1.186 所示.




图 1.185




图 1.186

- (b) (1) 当  $x < 0$  时, 定义  $f(x) = \sqrt{-x}$  即行;  
 (2) 当  $x < 0$  时, 定义  $f(x) = -\sqrt{-x}$  即行.

如图 1.187 所示.

- (c) (1) 当  $x < 0$  时, 定义  $f(x) = -\sin x = |\sin x|$  即行;  
 (2) 当  $x < 0$  时, 定义  $f(x) = \sin x$  即行.

如图 1.188 所示.

- (d) (1) 当  $x < 0$  时, 定义  $f(x) = e^{-x}$  即行;  
 (2) 当  $x < 0$  时, 定义  $f(x) = -e^{-x}$  即行.  
 (e) (1) 当  $x < 0$  时, 定义  $f(x) = \ln(-x)$  即行;  
 (2) 当  $x < 0$  时, 定义  $f(x) = -\ln(-x)$  即行.

如图 1.190 所示.




图 1.187




图 1.188

如图 1.189 所示.




图 1.189




图 1.190

360. 确定下列函数的图形对于什么垂直轴对称:

$$(a) y = ax^2 + bx + c; \quad (b) y = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{(1-x)^2};$$

$$(c) y = \sqrt{a+x} + \sqrt{b-x} \quad (0 < a < b);$$

$$(d) y = a + b \cos x.$$

解 (a)  $y = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}$ . 它关于直线  $x = -\frac{b}{2a}$

对称. (b) 显然图形对于直线  $x = \frac{1}{2}$  对称.

(b) 显然图形对于直线  $x = \frac{b-a}{2}$  对称.

(c) 对于直线  $x = k\pi$  ( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ) 对称.

361. 确定下列函数的图形的对称中心:

(a)  $y = ax + b$ ; (b)  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ;

(c)  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ;

(d)  $y = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-3}$ ;

(e)  $y = 1 + \sqrt[3]{x-2}$ .

解 (a) 显然对称中心为  $(x_0, ax_0 + b)$ ,  $x_0$  任意.

(b) 设对称中心为  $(x_0, y_0)$ , 则对充分大的  $x$ , 有  $y$  使  
 $y + y_0 = \frac{c(x+x_0)+b}{c(x+x_0)+d}$ ,  $-y + y_0 = \frac{a(-x+x_0)+b}{c(-x+x_0)+d}$ , 由此  
易得  $x_0 = -\frac{d}{c}$ ,  $y_0 = \frac{a}{c}$ .

(c) 用类似于(b)的方法, 可得对称中心为  $(x_0, y)$ , 其  
中  $x_0 = -\frac{b}{3a}$ ,  $y_0 = ax_0^3 + bx_0^2 + cx_0 + d$ .

(d) 类似于(c), 可得对称中心为  $(2, 0)$ .

(e) 类似于(d), 可得对称中心为  $(2, 1)$ .

362. 作周期函数的图形:

(a)  $y = |\sin x|$ ; (b)  $y = \operatorname{sgn} \cos x$ ;

(c)  $y = f(x)$ , 其中  $f(x) = A \frac{x}{l} \left( 2 - \frac{x}{l} \right)$ , 假设  $0 \leq x \leq 2l$   
和  $f(x+2l) \equiv f(x)$ ;

(d)  $y = [x] - 2 \left[ \frac{x}{2} \right]$ ;

(e)  $y = (x)$ , 此处  $(x)$  为从数  $x$  至与它最近的整数间的距离.

解 (a) 如图 1.191 所示, 周期  $\pi$ .

(b) 如图 1.192 所示, 周期  $2\pi$ .




图 1.191




图 1.192




图 1.193




图 1.194

(b) 当  $0 \leq x \leq 2l$  时,

由  $f(x)$  的定义易得

$$f(x+2kl) = f(x) \quad (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots),$$

故知所给函数为以  $2l$  为周期的周期函数, 它在  $[0, 2l]$  内的图形为一抛物线, 顶点为  $(l, A)$ . 如图 1.193 所示.

(c) 周期为  $2^+$ , 如图 1.194 所示.

\* ) 原本该题为  $y = |x| - 2\left[\frac{x}{2}\right]$ , 当  $x \geq 0$  时, 它是以 2 为周期函数.




图 1.195

(d) 周期为 1, 如图 1.195 所示.

363. 证明: 若函数  $y=f(x)$  ( $-\infty < x < +\infty$ ) 的图形对于二垂直轴  $x=a$  和  $x=b$  ( $b > a$ ) 对称, 则函数  $f(x)$  为周期函数.

证 设  $x$  为任一实数, 则按假设有

$$f(a+x)=f(a-x) \text{ 及 } f(b+x)=f(b-x).$$

在  $f(a+x)=f(a-x)$  中将  $x$  换成  $x+(b-a)$ , 则得

$$f(x+b)=f(a-x-b+a)=f(2a-b-x);$$

而  $f(x+b)=f(b-x)$ , 所以

$$f(b-x)=f(2a-b-x).$$

将  $b-x$  换成  $x$ , 则得  $f(x)=f(2a-2b+x)$ .

再将  $x$  换成  $2(b-a)+x$ , 即得

$$f(x+2(b-a))=f(x),$$

即  $f(x)$  为一以  $2(b-a)$  为周期的周期函数. 如图 1.196 所示.




图 1.196

364. 证明: 若函数  $y=f(x)$  ( $-\infty < x < +\infty$ ) 的图形对于两点  $A(a, y_0)$  和  $B(b, y_1)$  ( $b > a$ ) 对称, 则函数  $f(x)$  是线性函数与周期函数的和. 特别是, 若  $y_0=y_1$ , 则函数  $f(x)$  是周期函数.

证 设  $x$  是任一实数, 按假设有:

$$f(a+x)-y_0=y_0-f(a-x), \quad (1)$$

$$f(b+x)-y_1=y_1-f(b-x). \quad (2)$$

在(1)中, 将  $x$  换成  $x+(b-a)$  则得

$$f(b+x)-y_0=y_0-f(2a-b-x) \quad (3)$$

将(3)代入(2)得

$$2y_1-f(b-x)=2y_0-f(2a-b-x),$$

即

$$f(b-x)=2(y_1-y_0)+f(2a-b-x) \quad (4)$$

在(4)中, 将  $b-x$  换成  $x$ , 则得

$$f(x)=2(y_1-y_0)+f(2a-2b+x) \quad (5)$$

再在(5)中将  $x$  换成  $2(b-a)+x$ , 则得

$$f(x)=2(y_0-y_1)+f[2(b-a)+x].$$

令

$$f(x)=-\frac{y_0-y_1}{b-a}x+\varphi(x) \quad (6)$$

下面证明  $\varphi(x)$  一定是周期函数. 事实上, 我们有

$$\begin{aligned}f[x+2(b-a)] &= -\frac{y_0-y_1}{b-a}[x+2(b-a)] \\&\quad + \varphi[x+2(b-a)], \\f(x) - f[x+2(b-a)] &= 2(y_0-y_1) + \varphi(x) \\&\quad - \varphi[x+2(b-a)].\end{aligned}$$

因此由(5)式可得

$$\varphi(x) = \varphi[x+2(b-a)]. \quad (7)$$

由(6)式和(7)式可知,  $f(x)$  是一个线性函数与一个周期函数的和.

若  $y_0=y_1$ , 则由(6)式和(7)式可知,  $f(x)$  是一个周期函数.

365. 证明: 若函数  $y=f(x)$  ( $-\infty < x < +\infty$ ) 的图形关于点  $A(a, y_0)$  及直线  $x=b$  ( $b \neq a$ ) 对称, 则函数  $f(x)$  是周期函数.

证 设  $x$  为任一实数, 按假设则有

$$\begin{aligned}f(a+x)-y_0 &= y_0-f(a-x), \\f(b+x) &= f(b-x).\end{aligned} \quad (1)$$

在(1)中, 将  $x$  换成  $x+(b-a)$ , 则得

$$f(b+x)=2y_0-f(2a-b-x),$$

即

$$f(b-x)=2y_0-f(2a-b-x). \quad (2)$$

在(2)中, 将  $b-x$  换成  $x$ , 则得

$$f(x)=2y_0-f(2a-2b+x). \quad (3)$$

在(3)中, 将  $x$  换成  $2b-2a+x$ , 则得

$$f(2b-2a+x)=2y_0-f(x). \quad (4)$$

由(3)(4)得  $f(2a-2b+x)=f(2b-2a+x)$ , 再将  $x$  换成  $2b-2a+x$ , 即得

$$f(x)=f(4(b-a)+x).$$

此即证明  $f(x)$  为一以  $4(b-a)$  为周期的周期函数.

366. 设  $f(x+1)=2f(x)$  及当  $0 \leq x \leq 1$  时,  $f(x)=x(1-x)$ , 作函数

$$y=f(x) \quad (-\infty < x < +\infty)$$

的图形.

解 当  $0 \leq x \leq 1$  时, 图形为一抛物线, 顶点为  $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ .

当  $1 \leq x \leq 2$  时, 只要将纵标放大 2 倍, 余类推.

如图 1.197 所示.




图 1.197

当  $x=\frac{2n+1}{2}$  时,  $y=\frac{2^n}{4}=2^{n-2}$ , 因而当  $n \rightarrow +\infty$  时,  $y \rightarrow +\infty$ ; 当  $n \rightarrow -\infty$  时,  $y \rightarrow 0$ .

367. 设  $f(x+\pi)=f(x)+\sin x$ ; 且当  $0 \leq x \leq \pi$  时,  $f(x)=0$ . 作函数

$$y=f(x) \quad (-\infty < x < +\infty)$$

的图形.

解 由题设知

当  $0 \leq x \leq \pi$  时,  $f(x)=0$ ;

当  $\pi < x \leq 2\pi$  时, 设  $0 < x_1 \leq \pi$ , 则有

$$f(x) = f(x_1 + \pi) = f(x_1) + \sin x_1 = \sin x_1;$$

当  $2\pi < x \leq 3\pi$  时, 设  $\pi < x_2 \leq 2\pi$ , 则有

$$f(x) = f(x_2 + \pi) = f(x_2) + \sin x_2 = 0;$$

余类推. 周期为  $2\pi$ . 如图 1.198 所示.




图 1.198




图 1.199

368. 作函数  $y = y(x)$  的图形, 设:

$$(a) x = y - y^3; \quad (b) x = \frac{1-y}{1+y^2};$$

$$(c) x = y - \ln y; \quad (d) x^2 = \sin y.$$




图 1.200




图 1.201




图 1.202

解 (a) 如图 1.199 所示.

(b) 如图 1.200 所示.

(b) 如图 1.201 所示.

(c) 如图 1.202 所示.

369. 作出下列用参数表示的各函数的图形, 设:

(a)  $x = 1 - t, y = 1 - t^2$ ;

(b)  $x = t + \frac{1}{t}, y = t + \frac{1}{t^2}$ ;

(c)  $x = 10 \cos t, y = \sin t$

(椭圆);

(d)  $x = \cosh t, y = \sinh t$

(双曲线);

(e)  $x = 5 \cos^2 t, y = 3 \sin^2 t$ ;

(f)  $x = 2(t - \sin t), y = 2(1 - \cos t)$  (摆线);

(g)  $x = \sqrt[4]{t+1}, y = \sqrt[4]{t+1} (t > 0)$ .

解 (a)  $y - 1 = -(x - 1)^2$ . 如图 1.203 所示.

(b) 如图 1.204 所示.




图 1.204

(b)  $\frac{x^2}{10^2} + \frac{y^2}{1^2} = 1$ . 如图 1.205 所示.

(г)  $x^2 - y^2 = 1$ . 如图 1.206 所示.

(д)  $\frac{x}{5} + \frac{y}{3} = 1$ , 如图 1.207 所示.

(е) 如图 1.208 所示.

(ж) 如图 1.209 所示.




图 1.205




图 1.206




图 1.207




图 1.208




图 1.209

370. 作下列隐函数的图形：

- (a)  $x^2 - xy + y^2 = 1$  (椭圆);
- (b)  $x^3 + y^3 - xy = 0$  (笛卡尔叶形线);
- (c)  $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$  (抛物线);
- (d)  $\sin x = \sin y$ ;
- (e)  $\cos(\pi x^2) = \cos(\pi y)$ ;
- (f)  $x^y = y^x$  ( $x > 0, y > 0$ );
- (g)  $x - |x| = y - |y|$ .

解 (a) 将坐标轴按正向绕原点旋转  $45^\circ$ , 得新坐标系  $Ox'y'$ , 则由旋转公式得

$$x = \frac{x' - y'}{\sqrt{2}},$$

$$y = \frac{x' + y'}{2}.$$

代入原式得

$$\frac{x'^2}{2} + \frac{y'^2}{3} = 1.$$

如图 1.210 所示.

(b) 渐近线为  $x + y + 1 = 0$ .

如图 1.211 所示.

(c) 如图 1.212 所示.

(d) 如图 1.213 所示.




图 1.210




图 1.211




图 1.212




图 1.213

- (d)  $y = x + 2k\pi$  或  $y = (2k + 1)\pi - x$   
 $(k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ . 如图 1.214 所示.  
(e)  $y = x^2 + 2k$  或  $y = 2k - x^2 (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$

如图 1.215 所示.




图 1.214




图 1.215

- (ж) 如图 1.216 所示. 参看 1544 题的作图法.  
(е) 如图 1.217 所示. 图形包括第一象限阴影部分  
(连同边界);  $x \geq 0, y \geq 0$  以及第三象限的黑粗线部分;  $y$

$= x, x < 0, y < 0.$




图 1.216




图 1.217

371. 在极坐标  $(r, \varphi)$  系中作出函数  $r = r(\varphi)$  的图形.

设:

(a)  $r = \varphi$  (阿基米得螺线); (b)  $r = \frac{\pi}{\varphi}$  (双曲螺线);

(c)  $r = \frac{\varphi}{\varphi + 1}$  ( $0 \leqslant \varphi < +\infty$ );

(d)  $r = 2^{\frac{\varphi}{2\pi}}$  (对数螺线);

(e)  $r = 2(1 + \cos\varphi)$  (心脏形线);

(f)  $r = 10\sin 3\varphi$  (三瓣玫瑰线);




图 1.218

(g)  $r^2 = 36\cos 2\varphi$  (贝努里双纽线);

$$(3) \varphi = \frac{r}{r-1} (r > 1); (4) \varphi = 2\pi \sin r.$$

解 (a) 如图 1.218 所示.  $M_1M_2 = M_2M_3 = \dots = 2\pi$ .

(b) 如图 1.219 所示.




图 1.219

(c) 如图 1.220 所示.




图 1.220

(d) 如图 1.221 所示.

(e) 如图 1.222 所示.

(f) 如图 1.223 所示.

(g) 如图 1.224 所示.

(h) 如图 1.225 所示.




图 1.221




图 1.223




图 1.222




图 1.224




图 1.225

(n) 如图 1.226 所示.




图 1.226

372. 作函数  $y = x^3 - 3x + 1$  的图

形,以求方程式

$$x^3 - 3x + 1 = 0$$

的近似解.

解 如图 1.227 所示.

因  $y|_{x=0} = 1 > 0$ ,

$$y|_{x=0.4} = -0.136,$$

所以,在 0 与 0.4 之间有一实根,

约为 0.35.

同法可求得其它二根为 1.53 及

-1.88.

用图解法解下列方程:

373.  $x^3 - 4x - 1 = 0$ .

解 作函数  $y = x^3$  及  $y = 4x + 1$  的图形,它们的交点的横坐标即所求之根(图 1.228).

在图示的根  $x_0$  邻近研究函数  $f(x) = x^3 - 4x - 1$ ,若  $f(x_0 - \delta) \cdot f(x_0 + \delta) < 0$ ,则根  $x_0$  界于  $x_0 - \delta$  及  $x_0 + \delta$  之间,其中  $\delta$  为很小的某个正数. 下列各题同.

经判别,根的近似解为

-1.86; -0.25; 2.11.

374.  $x^4 - 4x + 1 = 0$ .

解 作函数  $y = x^4$  及  $y = 4x - 1$  的图形,如图 1.229 所示.

交点的横坐标即所求之根,其近




图 1.227




图 1.228




图 1.229

似值为 0.25; 1.49.

375.  $x = 2^{-x}$ .

解 作函数  $y = 2^{-x}$  及  $y = x$  的图形, 如图 1.230 所示.

交点的横坐标为 0.64, 此即所求之根的近似值.

376.  $\lg x = 0.1x$ .

解 作函数  $y = \lg x$  及  $y = 0.1x$  的图形, 如图 1.231 所示:




图 1.230




图 1.231

交点的横坐标为 1.37 及 10, 此即所求之根, 前者为近似值, 后者为精确值.

377.  $10^x = x^2$ .

解 作函数  $y = 10^x$  及  $y = x^2$  的图形, 如图 1.232 所示. 交点的横坐标为 -0.54, 此即所求之根的近似值.

378.  $\operatorname{tg} x = x (0 \leq x \leq 2\pi)$

解 作函数




图 1.232

$y = \operatorname{tg} x$  及  $y = x$   
的图形,如图 1.233 所示.

交点的横坐标为 0 及 4.49,此即所求之根,前者为精确值,后者为近似值.




图 1.233




图 1.234

用图解法以解下列方程组:

$$379. x + y^2 = 1, 16x^2 + y = 4.$$

解 作函数

$$y^2 = 1 - x \text{ 及 } -y + 4 = 16x^2$$

的图表,如图 1.234 所示.

交点为点  $A, B, C$  及  $D$ ,它们的一对坐标即所求之解(近似值):

$$x_1 = -0.42, y_1 = 1.19(A \text{ 点})$$

$$x_2 = 0.45, y_2 = 0.74(B \text{ 点})$$

$$x_3 = 0.54, y_3 = -0.68(C \text{ 点});$$

$$x_4 = -0.57, y_4 = 1.25(D \text{ 点}).$$

$$380. x^2 + y^2 = 100, y = 10(x^2 - x - 2).$$

解 作函数

$$x^2 + y^2 = 100$$

$$\text{及 } y = 10(x^2 - x - 2)$$

的图形,如图 1.235 所示.

交点为点  $A, B, C$  及  $D$ ,  
它们的一对坐标即所求之  
解(近似值):

$$x_1 = -1.30;$$

$$y_1 = 9.92(A \text{ 点});$$

$$x_2 = 2.30,$$

$$y_2 = 9.73(B \text{ 点});$$

$$x_3 = 1.62,$$

$$y_3 = -9.87(C \text{ 点});$$

$$x_4 = -0.62, y_4 = -9.98(D \text{ 点}).$$




图 1.235

## § 5. 函数的极限

1° 函数的有界性 设存在有某两数  $m$  和  $M$ ,使得

当  $x \in (a, b)$  时,  $m < f(x) < M$ ,

则称函数  $f(x)$  在这区间  $(a, b)$  上为有界的.

数  $m_0 = \inf_{x \in (a, b)} \{f(x)\}$  称为函数  $f(x)$  在这区间  $(a, b)$  上的下确界,

而数  $M_0 = \sup_{x \in (a, b)} \{f(x)\}$  称为函数  $f(x)$  在这区间  $(a, b)$  上的上确界.

差  $M_0 - m_0$  称为函数在区间  $(a, b)$  上的振幅.

2° 函数在某一点的极限 符号

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

表示对于任一个数  $\epsilon > 0$ , 都存在有数  $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ , 使得对于满足条件式  $0 < |x - a| < \delta$ , 并使  $f(x)$  有意义的一切  $x$ , 有下列不等式成立:

$$|f(x) - A| < \epsilon.$$

函数的极限(1)存在的必要而且充分的条件是: 对于每一个数列  $x_n \rightarrow a$  ( $n = 1, 2, \dots$ ), 下面的等式都成立

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

有两个著名的极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e.$$

哥西判别法. 函数  $f(x)$  在  $a$  点的极限存在, 当而且仅当, 对于每一个  $\epsilon > 0$ , 都能找得着  $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ , 使得, 只要是

$$0 < |x' - a| < \delta \text{ 和 } 0 < |x'' - a| < \delta,$$

$$\text{就有 } |f(x') - f(x'')| < \epsilon.$$

式中  $x'$  和  $x''$  是属于函数  $f(x)$  的定义域内的.

3° 单侧的极限 若

$$\text{当 } 0 < a - x < \delta(\epsilon) \text{ 时, 有 } |A' - f(x)| < \epsilon,$$

则称数  $A'$  为函数  $f(x)$  在  $a$  点的左极限:

$$A' = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a - 0).$$

同样, 若当  $0 < x - a < \delta(\epsilon)$  时, 有  $|A'' - f(x)| < \epsilon$ , 则称数  $A''$  为函数  $f(x)$  在  $a$  点的右极限:

$$A'' = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a + 0).$$

函数  $f(x)$  在  $a$  点的极限存在的必要而且充分的条件为:

$$f(a - 0) = f(a + 0).$$

4° 无穷极限 符号

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

表示对于任何的  $E > 0$ , 只要是

$$0 < |x - a| < \delta(E), \text{ 则有 } |f(x)| > E.$$

5° 子列极限 若对于某数列  $x_n \rightarrow a$  有等式

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = B,$$

则称数(或符号  $\infty$ )  $B$  为函数  $f(x)$  在  $a$  点的子列极限(有穷的或无穷的).

这些子列极限中最小的和最大的用

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow a} f(x) \text{ 和 } \overline{\lim}_{x \rightarrow a} f(x)$$

来表示, 分别称为函数  $f(x)$  在  $a$  点的下极限和上极限.

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow a} f(x) = \overline{\lim}_{x \rightarrow a} f(x)$$

为函数  $f(x)$  在  $a$  点有极限(有穷的或无穷的)的必要而且充分的条件.

381. 函数  $f(x)$  由下面的条件所定义:

若  $x = \frac{m}{n}$ , 则  $f(x) = n$ ,

式中  $m$  和  $n$  为互质的整数, 且  $n > 0$ ;

若  $x$  为无理数, 则

$$f(x) = 0.$$

证明此函数在每一点  $x$  为有穷的, 但并非有界的(即在这点的任何邻域中是无界的).

证 任给  $x_0 > 0$ , 当  $x_0$  固定时,  $f(x_0)$  值确定. 由于有理数在数轴上处处稠密, 故在  $x_0$  的任何邻域  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  内总有无限多个有理数. 下面证明对于任给的  $\delta > 0$ , 函数  $f(x)$  在区间  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  内是无界的. 若不然, 存在  $M > 0$ , 使当  $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  时,

$$|f(x)| \leq M.$$

于是, 在  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  中的有理数只能表示成

$$\frac{k}{1}, \frac{k}{2}, \dots, \frac{k}{[M]},$$

其中  $k$  是与分母互质的整数,  $[M]$  为  $M$  的整数部分. 由

于这些有理数都在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  中, 故有

$$(x_0 - \delta)[M] < k < (x_0 + \delta)[M],$$

上式表明在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  中的有理数仅为有限个, 这与有理数在数轴上的处处稠密性相矛盾.

于是, 本题所定义的函数  $f(x)$  在每一点  $x$  (有穷) 的任何邻域中是无界的.

382. 若函数  $f(x)$  在: (a) 开区间, (b) 闭区间内的每一点确定而有界, 则此函数在这给定的区间内或对应的闭区间内是否为有界的?

举出适当的例子.

解 (a) 一般地说, 不一定. 例如, 函数  $f(x) = \frac{1}{x}$  在  $(0, 1)$  内每一点确定而有界, 但它在  $(0, 1)$  内无界.

(b) 是有界的. 事实上, 若  $f(x)$  在  $[a, b]$  无界, 则存在  $x_n \in [a, b]$  使  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$ . 取子列  $x_{n_k} \rightarrow x_0 \in [a, b]$ . 显然,  $f(x)$  在  $x_0$  无界 (即在  $x_0$  的任何邻域中无界), 矛盾.

383. 证明函数  $f(x) = \frac{1+x^2}{1+x^4}$

在间隔  $-\infty < x < +\infty$  中是有界的.

证 当  $|x| \leq 1$  时,  $|f(x)| < \frac{1+1}{1} = 2$ .

当  $|x| > 1$  时,  $|f(x)| < \frac{1+x^2}{1+x^4} < 1$ .

因而, 当  $-\infty < x < +\infty$  时,  $|f(x)| < 2$ . 即函数  $f(x)$  是有界的.

384. 证明函数

$$f(x) = \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x}$$

在点  $x = 0$  的任何邻域内是无界的, 但当  $x \rightarrow 0$  时不成为无穷大.

证 当  $x = \frac{2}{(2k+1)\pi}$  时,  $f(x) = 0$ ; 而当  $x = \frac{1}{k\pi}$  时,  
 $f(x) = (-1)^k k\pi$ . 于是当  $k \rightarrow \infty$  时, 点  $\frac{2}{(2k+1)\pi}$  及  $\frac{1}{k\pi}$   
 均在点  $x = 0$  的任何邻域内. 由于  $|(-1)^k \cdot k\pi| \rightarrow +\infty$  ( $k \rightarrow +\infty$ ), 故函数  $f(x)$  在点  $x = 0$  的任何邻域内是  
 无界的. 然而当  $k \rightarrow \infty$  时,  $f(x)$  不断地与  $Ox$  轴相交, 即  
 $f(x) = 0$  (这样的数  $x$  的集合是无限的). 因而, 当  $x \rightarrow 0$   
 时,  $f(x)$  又不成为无穷大.

385. 研究函数  $f(x) = \ln x \cdot \sin^2 \frac{\pi}{x}$  在区间  $0 < x < \epsilon$  内的有界性.

解 上方有界, 它小于  $|\ln \epsilon|$ . 下方无界.

386. 证明函数

$$f(x) = \frac{x}{1+x}$$

在域  $0 \leq x < +\infty$  内有下确界  $m_0 = 0$  和上确界  $M_0 = 1$ .

证  $1 > f(x) \geq 0$ , 且  $f(x)$  单调上升趋近于 1, 所以,

$$m_0 = 0, M_0 = 1.$$

387. 函数  $f(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上有定义且单调上升, 则在此闭区间内函数的下确界和上确界等于什么?

解  $m_0 = f(a), M_0 = f(b)$ , 其中  $m_0$  及  $M_0$  代表下确界及上确界, 以下各题均采用此符号.

求函数的下确界和上确界:

388.  $f(x) = x^2$  在  $(-2, 5)$  内.

解  $m_0 = 0, M_0 = 25.$

389.  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$  在  $(-\infty, +\infty)$  内.

解  $m_0 = 0, M_0 = 1.$

390.  $f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$  在  $(0, +\infty)$  内.

解 由于  $f(x)$  在  $(0, 1)$  内为增函数, 而在  $(1, +\infty)$  内为减函数, 且  $f(1)$  存在, 所以,

$$m_0 = 0, M_0 = f(1) = 1.$$

391.  $f(x) = x + \frac{1}{x}$  在  $(0, +\infty)$  内.

解 由  $x + \frac{1}{x} \geq 2$  知  $m_0 = f(1) = 2, M_0 = +\infty.$

392.  $f(x) = \sin x$  在  $(0, +\infty)$  内.

解  $m_0 = -1, M_0 = 1.$

393.  $f(x) = \sin x + \cos x$  在  $[0, 2\pi]$  内.

解 由  $f(x) = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$  知  $m_0 = -\sqrt{2}, M_0 = \sqrt{2}.$

394.  $f(x) = 2^x$  在  $(-1, 2)$  内.

解  $m_0 = f(-1) = \frac{1}{2}, M_0 = f(2) = 4.$

395.  $f(x) = [x]$ : (a) 在  $(0, 2)$  内, (b) 在  $[0, 2]$  内.

解 (a)  $m_0 = 0, M_0 = 1;$

(b)  $m_0 = 0, M_0 = 2.$

396.  $f(x) = x - [x]$  在  $[0, 1]$  内.

解  $m_0 = 1, M_0 = 1.$

397. 求函数  $f(x) = x^2$  在下列区间内的振幅:

(a)  $(1, 3);$  (b)  $(1, 9, 2, 1);$

(B)(1.99, 2.01) (C)(1.999, 2.001).

解 (a) 振幅以  $\omega$  表示之.  $\omega = M_0 - m_0$

因为  $m_0 = 1, M_0 = 9$ , 所以

$$\omega = 8.$$

(B)  $m_0 = (1.9)^2, M_0 = (2.1)^2,$

$$\omega = (2.1)^2 - (1.9)^2 = 0.8.$$

(C)  $\omega = (2.01)^2 - (1.99)^2 = 0.08.$

(D)  $\omega = (2.001)^2 - (1.999)^2 = 0.008.$

### 398. 求函数

$$f(x) = \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$$

在下列区间内的振幅:

(A)  $(-1, +1);$  (B)  $(-0.1, 0.1);$

(C)  $(-0.01, 0.01);$  (D)  $(-0.001, 0.001).$

解 (A)  $\omega = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi;$

(B)  $\omega = \pi;$

(C)  $\omega = \pi;$

(D)  $\omega = \pi.$

399. 设  $m[f]$  和  $M[f]$  分别为函数  $f(x)$  在区间  $(a, b)$  内的下确界和上确界。

证明若  $f_1(x)$  和  $f_2(x)$  为定义于  $(a, b)$  内的函数，则

$$m[f_1 + f_2] \geq m[f_1] + m[f_2]$$

及

$$M[f_1 + f_2] \leq M[f_1] + M[f_2].$$

举出函数  $f_1(x)$  和  $f_2(x)$  的例子, 使它们在最后的二关

系中是：(a) 等式的情形，(b) 不等式的情形。

证 因为

$$m[f_1] \leq f_1 \leq M[f_1]$$

及

$$m[f_2] \leq f_2 \leq M[f_2],$$

所以，

$$m[f_1] + m[f_2] \leq f_1 + f_2,$$

从而有

$$m[f_1] + m[f_2] \leq m[f_1 + f_2].$$

又因

$$f_1 + f_2 \leq M[f_1] + M[f_2],$$

所以，

$$M[f_1 + f_2] \leq M[f_1] + M[f_2].$$

(a) 当  $f_1(x)$  及  $f_2(x)$  在  $(a, b)$  内具有相同的单调性，且  $m$  及  $M$  均为有限时，取等式。

(b)  $f_1(x) = x^2, f_2(x) = -x^2$  在区间  $(-1, 1)$  内

$$m[f_1] = 0, M[f_1] = 1;$$

$$m[f_2] = -1, M[f_2] = 0.$$

又因为  $f_1 + f_2 = 0$ ，所以

$$m[f_1 + f_2] = M[f_1 + f_2] = 0.$$

此时

$$m[f_1 + f_2] > m[f_1] + m[f_2],$$

$$M[f_1 + f_2] < M[f_1] + M[f_2].$$

取不等式的符号。

400. 设函数  $f(x)$  定义于域  $[a, +\infty)$  内，并且在每一个闭区

间  $[a, b]$  上是有界的. 假定

$$m(x) = \inf_{a \leq \xi \leq x} f(\xi)$$

及  $M(x) = \sup_{a \leq \xi \leq x} f(\xi).$

作函数  $y = m(x)$  和  $y = M(x)$  的图形, 设

$$(a) f(x) = \sin x, \quad (b) f(x) = \cos x.$$

解 (a) 如图 1.236 所示. (b) 如图 1.236 所示




图 1.236

401. 利用  $(\epsilon - \delta)$  论证法, 证明

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4.$$

填下表:

$\epsilon$	0.1	0.01	0.001	0.0001	...
$\delta$					

证  $|x^2 - 4| = |x - 2||x + 2|.$

先限制  $|x - 2| < 1$ , 即  $1 < x < 3$ , 则

$$|x^2 - 4| = |x - 2||x + 2| < 5|x - 2|,$$

取  $\delta = \min\{1, \frac{\epsilon}{5}\}$ . 于是, 当  $0 < |x - 2| < \delta$  时,

$$|x^2 - 4| < \epsilon,$$

即

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4.$$

$\epsilon$	0.1	0.01	0.001	0.0001	...
$\delta$	0.02	0.002	0.0002	0.00002	...

402. 以《 $E - \delta$ 》的说法, 证明

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(1-x)^2} = +\infty.$$

填下表:

$E$	10	100	1000	10000	...
$\delta$					...

证 任给  $E > 0$ ,

要使  $\frac{1}{|1-x|^2} > E$ ,

只要  $0 < |x - 1| < \frac{1}{\sqrt{E}}$ ,

又只要  $0 < |x - 1| < \frac{1}{E}$  ( $E > 1$ ),

取  $\delta = \min\left\{1, \frac{1}{E}\right\}$ ,

则当  $0 < |x - 1| < \delta$  时,

$$\left| \frac{1}{(1-x)^2} \right| > E,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(1-x)^2} = +\infty.$$

$E$	10	100	1000	10000	...
$\delta$	0.1	0.01	0.001	0.0001	...

403. 利用不等式表示下列各式:

$$(a) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = b; \quad (6) \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = b;$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = b.$$

举出适当的例子.

解 (a) 对于任给的  $\epsilon > 0$ , 存在数  $\delta > 0$ , 使当  $0 < |x - a| < \delta$  时,

$$|f(x) - b| < \epsilon,$$

此即  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b.$

例如,  $f(x) = x + 1, \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2.$

(6) 对于任给的  $\epsilon > 0$ , 存在数  $\delta > 0$ , 使当  $0 < a - x < \delta$  时,

$$|f(x) - b| < \epsilon,$$

此即  $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = b.$

例如,

$$\text{若 } f(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{当 } x \leq 1; \\ 2, & \text{当 } x > 1, \end{cases}$$

则  $\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = 2$

(b) 对于任给的  $\epsilon > 0$ , 存在数  $\delta > 0$ , 使当  $0 < x - a < \delta$  时

$$|f(x) - b| < \epsilon,$$

此即  $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = b.$

例如本题(6)之例, 即有

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = 2.$$

利用不等式表示下列各式，并举出适当的例子：

404. (a)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$ ; (b)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$ ;

(c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ .

解(a) 任给  $\epsilon > 0$ , 存在数  $N > 0$ , 使当  $|x| > N$  时,

$$|f(x) - b| < \epsilon,$$

此即  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$ .

(b) 任给  $\epsilon > 0$ , 存在数  $N > 0$ , 使当  $x < -N$  时,

$$|f(x) - b| < \epsilon,$$

此即  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$ .

(c) 任给  $\epsilon > 0$ , 存在数  $N > 0$ , 使当  $x > N$  时,

$$|f(x) - b| < \epsilon,$$

此即  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ .

例如, 对于函数  $f(x) = \frac{1}{x^2}$ , 即有

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0.$$

405. (a)  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ ; (b)  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ ;

(c)  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ ; (d)  $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \infty$ ;

(e)  $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = -\infty$ ; (f)  $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = +\infty$ ;

(g)  $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \infty$ ; (h)  $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = -\infty$ ;

(i)  $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = +\infty$ .

解 (a) 任给  $E > 0$ , 存在数  $\delta > 0$ , 使当  $0 < |x - a| < \delta$  时,

$$|f(x)| > E,$$

此即

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b.$$

例如,  $f(x) = \frac{1}{x-1}$ , 即有

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty.$$

(6) 任给  $E > 0$ , 存在数  $\delta > 0$ , 使当  $0 < |x - a| < \delta$  时,

$$f(x) < -E,$$

此即

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty.$$

例如,  $f(x) = \frac{-1}{(x-1)^2}$ , 即有

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty.$$

(b) 任给  $E > 0$ , 存在数  $\delta > 0$ , 使当  $0 < |x - a| < \delta$  时,

$$f(x) > E.$$

此即

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty.$$

例如,  $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$ , 即有

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty.$$

(c) 任给  $E > 0$ , 存在数  $\delta > 0$ , 使当  $0 < a - x < \delta$  时,

$$|f(x)| > E.$$

此即

$$\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \infty.$$

例如,  $f(x) = \frac{(-1)^{\lceil \frac{1}{1-x} \rceil}}{1-x}$ , 即有

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = \infty.$$

(d) 任给  $E > 0$ , 存在数  $\delta > 0$ , 使当  $0 < a - x < \delta$  时,

$$f(x) < -E,$$

此即

$$\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = -\infty.$$

例如,  $f(x) = \frac{1}{x-1}$ , 即有

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty.$$

(e) 任给  $E > 0$ , 存在数  $\delta > 0$ , 使当  $0 < a - x < \delta$  时,

$$f(x) > E,$$

此即

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = +\infty.$$

例如,  $f(x) = \frac{1}{1-x}$ , 即有

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty.$$

(x) 任给  $E > 0$ , 存在数  $\delta > 0$ , 使当  $0 < x - a < \delta$  时,

$$|f(x)| > E.$$

此即

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \infty.$$

例如,  $f(x) = \frac{(-1)^{\lceil \frac{1}{x-1} \rceil}}{x-1}$ , 即有

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \infty.$$

(a) 任给  $E > 0$ , 存在数  $\delta > 0$ , 使当  $0 < x - a < \delta$  时,

$$f(x) < -E,$$

此即

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = -\infty.$$

例如,  $f(x) = \frac{1}{1-x}$ , 即有

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty.$$

(u) 任给  $E > 0$ , 存在数  $\delta > 0$ , 使当  $0 < x - a < \delta$  时,

$$f(x) > E,$$

此即

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = +\infty.$$

例如,  $f(x) = \frac{1}{x-1}$ , 即有

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = +\infty.$$

406. (a)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$     (b)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ ;  
(c)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$ ;    (d)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$ ;  
(e)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$ ;    (f)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ ;  
(g)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty$ ;    (h)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ ;  
(i)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

解 (a) 任给  $E > 0$ , 存在数  $N > 0$ , 使当  $|x| > N$  时,

$$|f(x)| > E,$$

此即  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ .

例如,  $f(x) = x^3$ , 则有  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ .

(b) 任给  $E > 0$ , 存在数  $N > 0$ , 使当  $|x| > N$  时,

$$f(x) < -E,$$

此即  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$ .

例如,  $f(x) = -x^2$ , 即有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty.$$

(c) 任给  $E > 0$ , 存在数  $N > 0$ , 使当  $|x| > N$  时,

$$f(x) > E,$$

此即  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$ .

例如,  $f(x) = x^2$ , 即有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty.$$

(d) 任给  $E > 0$ , 存在数  $N > 0$ , 使当  $x < -N$  时,

$$|f(x)| > E,$$

此即  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$ .

例如,  $f(x) = (-1)^{[x^2]}x$ , 即有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty.$$

(d) 任给  $E > 0$ , 存在数  $N > 0$ , 使当  $x < -N$  时,

$$f(x) < -E,$$

此即

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

例如,  $f(x) = x$ , 即有

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

(e) 任给  $E > 0$ , 存在数  $N > 0$ , 使当  $x < -N$  时,

$$f(x) > E,$$

此即

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$

例如,  $f(x) = -x$ , 即有

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$

(\*) 任给  $E > 0$ , 存在数  $N > 0$ , 使当  $x > N$  时,

$$|f(x)| > E,$$

此即

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty.$$

例如,  $f(x) = (-1)^{[x]}x^2$ , 即有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty.$$

(g) 任给  $E > 0$ , 存在数  $N > 0$ , 使当  $x > N$  时,

$$f(x) < -E,$$

此即

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$$

例如,  $f(x) = -x$ , 即有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$$

(h) 任给  $E > 0$ , 存在数  $N > 0$ , 使当  $x > N$  时,

$$f(x) > E,$$

此即  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

例如,  $f(x) = x$ , 即有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

407. 命  $y = f(x)$ . 利用不等式表示下列各情况:

- (a) 当  $x \rightarrow a$  时,  $y \rightarrow b - 0$ ;
- (b) 当  $x \rightarrow a - 0$  时,  $y \rightarrow b - 0$ ;
- (c) 当  $x \rightarrow a + 0$  时,  $y \rightarrow b - 0$ ;
- (d) 当  $x \rightarrow a$  时,  $y \rightarrow b + 0$ ;
- (e) 当  $x \rightarrow a - 0$  时,  $y \rightarrow b + 0$ ;
- (f) 当  $x \rightarrow a + 0$  时,  $y \rightarrow b + 0$ ;
- (g) 当  $x \rightarrow \infty$  时,  $y \rightarrow b - 0$ ;
- (h) 当  $x \rightarrow -\infty$  时,  $y \rightarrow b - 0$ ;
- (i) 当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $y \rightarrow b - 0$ ;
- (j) 当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $y \rightarrow b + 0$ ;
- (k) 当  $x \rightarrow -\infty$  时,  $y \rightarrow b + 0$ ;
- (l) 当  $x \rightarrow -\infty$  时,  $y \rightarrow b - 0$ ;
- (m) 当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $y \rightarrow +0$ .

举出适当的例子.

解 (a) 任给  $\epsilon > 0$ , 存在数  $\delta > 0$ , 使当  $0 < |x - a| < \delta$  时,

$$0 < b - y < \epsilon,$$

此即  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b - 0$ ;

或

当  $x \rightarrow a$  时,  $y \rightarrow b - 0$ .

例如,  $y = -|x|$ , 即有

当  $x \rightarrow 0$  时,  $y \rightarrow 0 - 0$ .

(6) 任给  $\epsilon > 0$ , 存在数  $\delta > 0$ , 使当  $0 < a - x < \delta$  时,

$$0 < b - y < \epsilon,$$

此即

$$\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = b - 0.$$

例如,  $y = x$ , 即有

当  $x \rightarrow 0 - 0$  时,  $y \rightarrow 0 - 0$ .

(b) 任给  $\epsilon > 0$ , 存在数  $\delta > 0$ , 使当  $0 < x - a < \delta$  时,

$$0 < b - y < \epsilon,$$

此即, 当  $x \rightarrow a + 0$  时,  $y \rightarrow b - 0$ .

例如,  $y = -x$ , 即有

当  $x \rightarrow 0 + 0$  时,  $y \rightarrow 0 - 0$ .

(c) 任给  $\epsilon > 0$ , 存在数  $\delta > 0$ , 使当  $0 < |a - x| < \delta$  时,

$$0 < y - b < \epsilon,$$

此即, 当  $x \rightarrow a$  时,  $y \rightarrow b + 0$ .

例如,  $y = |x|$ , 即有

当  $x \rightarrow 0$  时,  $y \rightarrow 0 + 0$ .

(d) 任给  $\epsilon > 0$ , 存在数  $\delta > 0$ , 使当  $0 < a - x < \delta$  时,

$$0 < y - b < \epsilon,$$

此即, 当  $x \rightarrow a - 0$  时,  $y \rightarrow b + 0$ .

例如,  $y = -x$ , 即有

当  $x \rightarrow 0 - 0$  时,  $y \rightarrow 0 + 0$ .

(e) 任给  $\epsilon > 0$ , 存在数  $\delta > 0$ , 使当  $0 < x - a < \delta$  时,

$$0 < y - b < \epsilon,$$

此即, 当  $x \rightarrow a + 0$  时,  $y \rightarrow b + 0$ .

例如,  $y = x$ , 即有

当  $x \rightarrow 0 + 0$  时,  $y \rightarrow 0 + 0$ .

(\*) 任给  $\epsilon > 0$ , 存在数  $N > 0$ , 使当  $|x| > N$  时,

$$0 < b - y < \varepsilon,$$

此即,当  $x \rightarrow \infty$  时,  $y \rightarrow b - 0$ .

例如,  $y = -\frac{1}{|x|}$ , 即有

$$\text{当 } x \rightarrow \infty \text{ 时, } y \rightarrow 0 - 0.$$

(a) 任给  $\varepsilon > 0$ , 存在数  $N > 0$ , 使当  $x < -N$  时,

$$0 < b - y < \varepsilon,$$

此即,当  $x \rightarrow -\infty$  时,  $y \rightarrow b - 0$ .

例如,  $y = \frac{1}{x}$ , 即有

$$\text{当 } x \rightarrow -\infty \text{ 时, } y \rightarrow 0 - 0.$$

(n) 任给  $\varepsilon > 0$ , 存在数  $N > 0$ , 使当  $x > N$  时,

$$0 < b - y < \varepsilon,$$

此即,当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $y \rightarrow b - 0$ .

例如,  $y = -\frac{1}{x}$ , 即有

$$\text{当 } x \rightarrow +\infty, y \rightarrow 0 - 0.$$

(e) 任给  $\varepsilon > 0$ , 存在数  $N > 0$ , 使当  $|x| > N$  时,

$$0 < y - b < \varepsilon,$$

此即,当  $x \rightarrow \infty$  时,  $y \rightarrow b + 0$ .

例如,  $y = \frac{1}{|x|}$ , 即有

$$\text{当 } x \rightarrow \infty \text{ 时, } y \rightarrow 0 + 0.$$

(l) 任给  $\varepsilon > 0$ , 存在数  $N > 0$ , 使当  $x < -N$  时,

$$0 < y - b < \varepsilon,$$

此即,当  $x \rightarrow -\infty$  时,  $y \rightarrow b + 0$ .

例如,  $y = -\frac{1}{x}$ , 即有

$$\text{当 } x \rightarrow -\infty \text{ 时, } y \rightarrow 0 + 0.$$

(M) 任给  $\epsilon > 0$ , 存在数  $N > 0$ , 使当  $x > N$  时,

$$0 < y - b < \epsilon,$$

此即, 当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $y \rightarrow b + 0$ .

例如,  $y = \frac{1}{x}$ , 即有

当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $y \rightarrow 0 + 0$ .

408. 设

$$p(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_r,$$

式中  $a_i (i = 0, 1, \dots, n)$  为实数.

证明  $\lim_{x \rightarrow \infty} |p(x)| = +\infty$ .

证 不妨设  $a_0 \neq 0$ , 则

$$\begin{aligned} |p(x)| &\geq |a_0| \cdot |x^n| \cdot \left| 1 - \left( \frac{|a_1|}{|a_0|} \cdot \frac{1}{|x|} \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \frac{|a_2|}{|a_0|} \cdot \frac{1}{|x|^2} + \cdots + \frac{|a_n|}{|a_0|} \cdot \frac{1}{|x|^n} \right) \right|, \end{aligned}$$

由于  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{|x|^i} = 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ , 故存在  $E_1 > 0$ , 使当  $|x| > E_1$  时, 恒有

$$\begin{aligned} &\left| 1 - \left( \frac{|a_1|}{|a_0|} \cdot \frac{1}{|x|} + \frac{|a_2|}{|a_0|} \cdot \frac{1}{|x|^2} + \cdots + \frac{|a_n|}{|a_0|} \cdot \frac{1}{|x|^n} \right) \right| \\ &> \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

从而有

$$|p(x)| > \frac{1}{2} |a_0| \cdot |x|^n.$$

任给  $M > 0$ , 设

$$E_2 = \sqrt[n]{\frac{2M}{|a_0|}}.$$

取

$$E = \max(E_1, E_2),$$

则当  $|x| > E$  时, 恒有

$$|p(x)| > M,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow \infty} |p(x)| = +\infty.$$

409. 设:

$$R(x) = \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_m},$$

式中  $a_0 \neq 0, b_0 \neq 0$ .

证明:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} R(x) = \begin{cases} \infty, & \text{若 } n > m; \\ \frac{a_0}{b_0}, & \text{若 } n = m; \\ 0, & \text{若 } n < m. \end{cases}$$

证 分子分母同除以  $x^n$ , 得

$$R(x) = \frac{a_0 + a_1 x^{-m-1} + \cdots + a_n x^{-n}}{b_0 + b_1 x^{-1} + \cdots + b_m x^{-m}}.$$

当  $n > m$  时, 分子趋于无穷, 分母趋于  $b_0$ ,  
所以,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} R(x) = \infty.$$

当  $n = m$  时, 分子趋于  $a_0$ , 分母趋于  $b_0$ , 所以,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} R(x) = \frac{a_0}{b_0}.$$

当  $n < m$  时, 分子趋于 0, 分母趋于  $b_0$ , 所以,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} R(x) = 0.$$

410. 设：

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)},$$

式中  $P(x)$  和  $Q(x)$  为  $x$  的多项式，且

$$P(a) = Q(a) = 0.$$

下式有什么可能的值

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{P(x)}{Q(x)}?$$

解 若  $a$  仅为  $P(x) = 0$  及  $Q(x) = 0$  的一重根，则极限

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{P(x)}{Q(x)}$$

为一确定值(不等于零).

若  $a$  为  $P(x) = 0$  的  $n$  重根，而为  $Q(x) = 0$  的  $m$  重根，则当  $n > m$  ( $n, m$  均大于 1) 时，此极限为 0；当  $n < m$  时，此极限为  $\infty$ ；当  $n = m$  时，此极限为一不等于零的值。

总之，极限

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{P(x)}{Q(x)}$$

为零，或为  $\infty$ ，或为不等于零的值。

求下列各式之值：

411. (a)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1}$ ; (b)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1}$

(b)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1}$

解 (a)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} = \frac{-1}{-1} = 1.$

(b)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{(2x + 1)(x - 1)}$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{2x+1} = \frac{2}{3}.$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{x^2}}{2 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} = \frac{1}{2}.$$

$$412. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)(1+2x)(1+3x)-1}{x}.$$

解  $(1+x)(1+2x)(1+3x) = 1 + 6x + 11x^2 + 6x^3,$

于是,

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)(1+2x)(1+3x)-1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (6 + 11x + 6x^2) = 6. \end{aligned}$$

$$413. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^5 - (1+5x)}{x^2 + x^5}.$$

$$\begin{aligned} & \text{解 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^5 - (1+5x)}{x^2 + x^5} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^5 + 5x^4 + 10x^3 + 10x^2}{x^2 + x^5} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + 5x^2 + 10x + 10}{x^3 + 1} \\ &= 10. \end{aligned}$$

$$414. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+mx)^n - (1+nx)^m}{x^2} \quad (m \text{ 与 } n \text{ 为自然数}).$$

$$\begin{aligned} & \text{解 } \frac{(1+mx)^n - (1+nx)^m}{x^2} \\ &= \frac{[(1+nmx + \frac{1}{2!}n(n-1)m^2x^2 + \cdots + m^n x^n)]}{x^2} \\ &+ \frac{-(1+mnx + \frac{1}{2!}m(m-1)n^2x^2 + \cdots + n^m x^m)}{x^2} \end{aligned}$$

$$= \frac{n}{2}(n-1)m^2 - \frac{m}{2}(m-1)n^2 + o(x)^2 \\ = \frac{1}{2}mn(n-m) + o(x),$$

于是,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+mx)^n - (1+nx)^m}{x^2} = \frac{1}{2}mn(n-m).$$

\* ) $o(x)$  表示当  $x \rightarrow 0$  时的无穷小量.

$$415. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}{(5x-1)^5}.$$

解 分子的最高次方为 5 次, 分母的最高次方也为 5 次, 因而当  $x \rightarrow \infty$  时, 此分式的极限为分子与分母的最高次方系数之比, 于是

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}{(5x-1)^5} = \frac{1}{5^5}.$$

$$416. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x-3)^{20}(3x+2)^{30}}{(2x+1)^{50}}.$$

解 分子与分母的最高次方相同, 故

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x-3)^{20}(3x+2)^{30}}{(2x+1)^{50}} = \frac{2^{20} \cdot 3^{30}}{2^{50}} = \left(\frac{3}{2}\right)^{30}.$$

$$417. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)(x^2+1)\cdots(x^n+1)}{[(nx)^n+1]^{\frac{n+1}{2}}}.$$

解 分子的最高次方为

$$1+2+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2},$$

它与分母的最高次方相同, 所以

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)(x^2+1)\cdots(x^n+1)}{[(nx)^n+1]^{\frac{n+1}{2}}} = n^{-\frac{n(n+1)}{2}}.$$

$$418. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-5x+6}{x^2-8x+15}.$$

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad & \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 8x + 15} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x-2)}{(x-3)(x-5)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-2}{x-5} = -\frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

419.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^4 - 4x + 3}$ .

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^4 - 4x + 3} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2(x+2)}{(x-1)^2(x^2 + 2x + 3)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{x^2 + 2x + 3} = \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

420.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^4 - x^3 - x + 1}$ .<sup>\*)</sup>

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^4 - x^3 - x + 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2(x+2)}{(x-1)^2(x^2 + x + 1)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{x^2 + x + 1} = 1.
 \end{aligned}$$

\* ) 原书 419 题与 420 题相同.

421.  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x^2 - 4x + 8}{x^4 - 8x^2 + 16}$ .

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad & \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x^2 - 4x + 8}{x^4 - 8x^2 + 16} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^2(x+2)}{(x-2)^2(x+2)^2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{4}.
 \end{aligned}$$

422.  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - 2x - 1}{x^5 - 2x - 1}$ .

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad & \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - 2x - 1}{x^5 - 2x - 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x^2 - x - 1)}{(x+1)(x^4 - x^3 + x^2 - x - 1)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 1}{x^4 - x^3 + x^2 - x - 1} = \frac{1}{3}.
 \end{aligned}$$

$$423. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 - x - 2)^{20}}{(x^3 - 12x + 16)^{10}}.$$

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad & \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 - x - 2)^{20}}{(x^3 - 12x + 16)^{10}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^{20}(x+1)^{20}}{(x-2)^{20}(x+4)^{10}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+1)^{20}}{(x+4)^{10}} \\
 &= \frac{3^{20}}{6^{10}} = \left(\frac{3}{2}\right)^{10}.
 \end{aligned}$$

$$424. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + \cdots + x^n - n}{x - 1}.$$

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad & x + x^2 + \cdots + x^n - n \\
 &= (x-1) + (x^2-1) + \cdots + (x^n-1) \\
 &= (x-1)[1 + (x+1) + \cdots \\
 &\quad + (x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + 1)] \\
 &= (x-1)[n + (n-1)x + (n-2)x^2 \\
 &\quad + \cdots + x^{n-1}].
 \end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + \cdots + x^n - n}{x - 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} [n + (n-1)x + (n-2)x^2 + \cdots + x^{n-1}] \\
 &= n + (n-1) + (n-2) + \cdots + 1 \\
 &= \frac{n(n+1)}{2}.
 \end{aligned}$$

$$425. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m - 1}{x^n - 1} \quad (m \text{ 和 } n \text{ 为自然数}).$$

解 
$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m - 1}{x^n - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1}{x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1} \\ &= \frac{m}{n}. \end{aligned}$$

$$426. \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x^n - a^n) - na^{n-1}(x - a)}{(x - a)^2} \quad (n \text{ 表自然数}).$$

解 设  $x = a + y$ , 则当  $x \rightarrow a$  时,  $y \rightarrow 0$ .

代入, 得

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x^n - a^n) - na^{n-1}(x - a)}{(x - a)^2} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(a + y)^n - a^n - na^{n-1}y}{y^2} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \left[ \frac{n}{2}(n-1)a^{n-2} + \frac{1}{3!}n(n-1)(n-2)a^{n-3}y \right. \\ &\quad \left. + \cdots + y^{n-2} \right] \\ &= \frac{n(n-1)}{2}a^{n-2}. \end{aligned}$$

$$427. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{n+1} - (n+1)x + n}{(x-1)^2} \quad (n \text{ 表自然数}).$$

解 设  $x = 1 + y$ , 则当  $x \rightarrow 1$  时,  $y \rightarrow 0$ . 代入, 得

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{n+1} - (n+1)x + n}{(x-1)^2} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(1+y)^{n+1} - (n+1)(1+y) + n}{y^2} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \left[ \frac{n(n+1)}{2} + \frac{1}{3!}(n+1)n(n-1)y + \cdots + y^{n-1} \right] \\ &= \frac{n(n+1)}{2}. \end{aligned}$$

$$428. \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n} \right) (m \text{ 和 } n \text{ 为自然数}).$$

**解** 当  $m = n$  时, 此极限显然为零.

当  $m \neq n$  时, 不失一般性, 假设  $m < n$ , 且

$$m + l = n.$$

此时

$$\begin{aligned} & \frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n} \\ &= \frac{m(1+x+\cdots+x^{m-1}) - n(1+x+\cdots+x^{n-1})}{(1-x)(1+x+x^2+\cdots+x^{n-1})(1+x+\cdots+x^{m-1})} \\ &= \frac{-l - lx - \cdots - lx^{m-1} + mx^m + mx^{m+1} + \cdots + mx^{m+l-1}}{(1-x)(1+x+\cdots+x^{m-1})(1+x+\cdots+x^{m+l-1})} \\ &= -\frac{mx^{m+l-2} + 2mx^{m+l-3} + \cdots + mlx^{m-1}}{(1+x+\cdots+x^{m-1})(1+x+\cdots+x^{m+l-1})} \\ &\quad - \frac{+l(m-1)x^{m-2} + l(m-2)x^{m-3} + \cdots + l}{(1+x+\cdots+x^{m-1})(1+x+\cdots+x^{m+l-1})}. \end{aligned}$$

于是,

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n} \right) \\ &= -\frac{m[1+2+\cdots+(l-1)] + l[m+(m-1)+\cdots+1]}{mn} \\ &= -\frac{\frac{ml(l-1)}{2} + \frac{ml(m+l)}{2}}{mn} = -\frac{ml(m+l)}{2mn} \\ &= \frac{m-n}{2}. \end{aligned}$$

当  $m = n$  时, 上述结果就等于零. 即上述结果对  $m = n$  的情况仍然适用.

总之, 不论  $m$  及  $n$  为任何的自然数, 均有

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n} \right) = \frac{m-n}{2}.$$

429.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[ \left( x + \frac{a}{n} \right) + \left( x + \frac{2a}{n} \right) + \cdots + \left( x + \frac{(n-1)a}{n} \right) \right].$

解 
$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[ \left( x + \frac{a}{n} \right) + \left( x + \frac{2a}{n} \right) + \cdots + \left( x + \frac{(n-1)a}{n} \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left\{ (n-1)x + \frac{a}{n} (1+2+\cdots+(n-1)) \right\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n} \left( x + \frac{a}{2} \right) \\ &= x + \frac{a}{2}. \end{aligned}$$

430.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[ \left( x + \frac{a}{n} \right)^2 + \left( x + \frac{2a}{n} \right)^2 + \cdots + \left( x + \frac{(n-1)a}{n} \right)^2 \right].$

解 
$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[ \left( x + \frac{a}{n} \right)^2 + \left( x + \frac{2a}{n} \right)^2 + \cdots \right. \\ & \quad \left. + \left( x + \frac{(n-1)a}{n} \right)^2 \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left\{ (n-1)x^2 + \frac{2ax}{n} (1+2+\cdots+(n-1)) \right. \\ & \quad \left. + \frac{a^2}{n^2} (1^2 + 2^2 + \cdots + (n-1)^2) \right\} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left\{ (n-1)x^2 + \frac{n-1}{1} ax + \frac{(n-1)(2n-1)}{6n} a^2 \right\} \\ &= x^2 + ax + \frac{a^2}{3}. \end{aligned}$$

431.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 3^2 + \cdots + (2n-1)^2}{2^2 + 4^2 + \cdots + (2n)^2}.$

解  $1^2 + 3^2 + \cdots + (2n-1)^2 = \frac{n}{3}(4n^2 - 1),$

$$2^2 + 4^2 + \cdots + (2n)^2 = \frac{2n(n+1)(2n+1)}{3}.$$

于是,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 3^2 + \cdots + (2n-1)^2}{2^2 + 4^2 + \cdots + (2n)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{2(n+1)} = 1$$

$$432. \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1^3 + 2^3 + \cdots + n^3}{n^3} - \frac{n}{4} \right).$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1^3 + 2^3 + \cdots + n^3}{n^3} - \frac{n}{4} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n^2(n+1)^2}{4n^3} - \frac{n}{4} \right)^{*} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{4n} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

\* ) 利用 3 题及 1 题的结果.

$$433. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^3 + 4^3 + 7^3 + \cdots + (3n-2)^3}{[1+4+7+\cdots+(3n-2)]^2}.$$

解 令

$$1^3 + 4^3 + 7^3 + \cdots + (3n-2)^3 = x_n,$$

$$[1+4+7+\cdots+(3n-2)]^2 = y_n,$$

则  $y_{n+1} > y_n$ , 且  $y_n \rightarrow +\infty$ , 由于

$$\begin{aligned} & \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} \\ &= \frac{(3n+1)^3}{(1+4+7+\cdots+(3n+1))^2 - (1+4+7+\cdots+(3n-2))^2} \\ &= \frac{(3n+1)^3}{\left[ \frac{(1+n)(3n+2)}{2} + \frac{n(3n-1)}{2} \right] (3n+1)} \rightarrow 3 \\ & \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

利用 143 题的结果即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^3 + 4^3 + 7^3 + \cdots + (3n-2)^3}{[1+4+7+\cdots+(3n-2)]^2} = 3.$$

434. 把由抛物线  $y = b\left(\frac{x}{a}\right)^2$ ,  $Ox$  轴及直线  $x = a$  所围成的曲边三角形  $OAM$ (图 1.

237) 的面积, 当作以  $\frac{a}{n}$  为底的各内接矩形面积之和当  $n \rightarrow \infty$  的极限值, 求此面积.

解 底的  $n$  个分点为

$$0, \frac{a}{n}, \frac{2a}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}a;$$

它们所对应的高为

$$0, b\left(\frac{1}{n}\right)^2, b\left(\frac{2}{n}\right)^2, \dots,$$

$$b\left(\frac{n-1}{n}\right)^2.$$

于是, 得内接的  $n$  个矩形面积之和为

$$ab \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{k}{n}\right)^2 = \frac{ab(n-1)(2n-1)}{6n^2},$$

当  $n \rightarrow \infty$  时, 它趋向于  $\frac{ab}{3}$ , 即

$$\text{面积 } OAM = \frac{ab}{3}.$$

求极限:

$$435. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x+1}}.$$

解 分子分母同除以  $\sqrt{x}$ , 得




图 1·237

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x + 1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{1}{x^3}}}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}}} \\ &= 1. \end{aligned}$$

436.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x}}{\sqrt{2x+1}}.$

**解** 分子分母同除以  $\sqrt{x}$ , 得

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x}}{\sqrt{2x+1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + x^{-\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{4}}}{\sqrt{2 + \frac{1}{x}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

437.  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{1+2x}-3}{\sqrt{x}-2}.$

**解** 分子分母同乘以它们的共轭因式, 得

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{1+2x}-3}{\sqrt{x}-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(\sqrt{1+2x}-3)(\sqrt{1+2x}+3)(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)(\sqrt{1+2x}+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2(x-4)(\sqrt{x}+2)}{(x-4)(\sqrt{1+2x}+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{1+2x}+3} \end{aligned}$$

$$= \frac{4}{3}.$$

438.  $\lim_{x \rightarrow -8} \frac{\sqrt{1-x} - 3}{2 + \sqrt[3]{x}}.$

**解** 
$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow -8} \frac{\sqrt{1-x} - 3}{2 + \sqrt[3]{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -8} \frac{(\sqrt{1-x} - 3)(\sqrt{1-x} + 3)(4 + \sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt[3]{x})}{(2 + \sqrt[3]{x})(4 + \sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt[3]{x})(\sqrt{1-x} + 3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -8} \frac{-(8+x)(4 + \sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt[3]{x})}{(8+x)(\sqrt{1-x} + 3)} \\ &= -\lim_{x \rightarrow -8} \frac{4 + \sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt[3]{x}}{\sqrt{1-x} + 3} \\ &= -2. \end{aligned}$$

439.  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a} + \sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2 - a^2}}.$

**解** 
$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a} + \sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2 - a^2}} \\ &\cong \lim_{x \rightarrow a} \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{a} + \sqrt{x-a})(\sqrt{x} + \sqrt{a})}{\sqrt{x^2 - a^2}(\sqrt{x} + \sqrt{a})} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x-a}(\sqrt{x-a} + \sqrt{x} + \sqrt{a})}{\sqrt{x-a} \cdot \sqrt{x+a}(\sqrt{x} + \sqrt{a})} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x-a} + \sqrt{x} + \sqrt{a}}{\sqrt{x+a}(\sqrt{x} + \sqrt{a})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2a}} (a > 0). \end{aligned}$$

440.  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+13} - 2\sqrt{x+1}}{x^2 - 9}.$

$$\begin{aligned}
 & \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+13} - 2\sqrt{x+1}}{x^2 - 9} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(\sqrt{x+13} - 2\sqrt{x+1})(\sqrt{x+13} + 2\sqrt{x+1})}{(x+3)(x-3)(\sqrt{x+13} + 2\sqrt{x+1})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-3(x-3)}{(x-3)(x+3)(\sqrt{x+13} + 2\sqrt{x+1})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-3}{(x+3)(\sqrt{x+13} + 2\sqrt{x+1})} \\
 &= -\frac{1}{16}.
 \end{aligned}$$

$$441. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt[3]{x-6} + 2}{x^3 + 8}.$$

$$\begin{aligned}
 & \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt[3]{x-6} + 2}{x^3 + 8} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(\sqrt[3]{x-6} + 2)(\sqrt[3]{(x-6)^2} - 2\sqrt[3]{x-6} + 4)}{(x^3 + 8)(\sqrt[3]{(x-6)^2} - 2\sqrt[3]{x-6} + 4)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{1}{(x^3 - 2x + 4)(\sqrt[3]{(x-6)^2} - 2\sqrt[3]{x-6} + 4)} \\
 &= \frac{1}{144}.
 \end{aligned}$$

$$442. \lim_{x \rightarrow 6} \frac{\sqrt[4]{x} - 2}{\sqrt{x} - 4}.$$

$$\text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 16} \frac{\sqrt[4]{x} - 2}{\sqrt{x} - 4} = \lim_{x \rightarrow 16} \frac{1}{\sqrt[4]{x} + 2} = \frac{1}{4}.$$

$$443. \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{9+2x} - 5}{\sqrt[3]{x} - 2}.$$

$$\text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{9+2x} - 5}{\sqrt[3]{x} - 2}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 8} \frac{(\sqrt[3]{9+2x}-5)(\sqrt[3]{9+2x}+5)(\sqrt[3]{x^2}+2\sqrt[3]{x}+4)}{(\sqrt[3]{x}-2)(\sqrt[3]{x^2}+2\sqrt[3]{x}+4)(\sqrt[3]{9+2x}+5)} \\
&= 2 \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt[3]{x^2}+2\sqrt[3]{x}+4}{\sqrt[3]{9+2x}+5} = \frac{12}{5}.
\end{aligned}$$

444.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x}-1}{x}$  ( $n$  为整数).

$$\begin{aligned}
&\text{解 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x}-1}{x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt[3]{1+x}-1)(\sqrt[3]{(1+x)^{n-1}} + \sqrt[3]{(1+x)^{n-2}} + \dots + 1)}{x(\sqrt[3]{(1+x)^{n-1}} + \sqrt[3]{(1+x)^{n-2}} + \dots + 1)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt[3]{(1+x)^{n-1}} + \sqrt[3]{(1+x)^{n-2}} + \dots + \sqrt[3]{1+x} + 1} \\
&= \frac{1}{n}.
\end{aligned}$$

445.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-2x-x^2}-(1+x)}{x}.$

$$\begin{aligned}
&\text{解 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-2x-x^2}-(1+x)}{x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1-2x-x^2}-1-x)(\sqrt{1-2x-x^2}+1+x)}{x(\sqrt{1-2x-x^2}+1+x)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2(2+x)}{\sqrt{1-2x-x^2}+1+x} \\
&= -2.
\end{aligned}$$

446.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{8+3x-x^2}-2}{x+x^2}.$

$$\begin{aligned}
&\text{解 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{8+3x-x^2}-2}{x+x^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt[3]{8+3x-x^2}-2)}{(x+x^2)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \cdot \frac{(\sqrt[3]{(8+3x-x^2)^2} + 2\sqrt[3]{8+3x-x^2} + 4)}{(\sqrt[3]{(8+3x-x^2)^2} + 2\sqrt[3]{8+3x-x^2} + 4)} \\
 & = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3-x}{(1+x)(\sqrt[3]{(8+3x-x^2)^2} + 2\sqrt[3]{8+3x-x^2} + 4)} \\
 & = \frac{1}{4}.
 \end{aligned}$$

447.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{27+x} - \sqrt[3]{27-x}}{x + 2\sqrt[3]{x^4}}$

$$\begin{aligned}
 & \text{解 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{27+x} - \sqrt[3]{27-x}}{x + 2\sqrt[3]{x^4}} \\
 & = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt[3]{27+x} - \sqrt[3]{27-x})}{(x + 2\sqrt[3]{x^4})} \\
 & \cdot \frac{(\sqrt[3]{(27+x)^2} + \sqrt[3]{27^2-x^2} + \sqrt[3]{(27-x)^2})}{(\sqrt[3]{(27+x)^2} + \sqrt[3]{27^2-x^2} + \sqrt[3]{(27-x)^2})} \\
 & = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{(1+2\sqrt[3]{x})(\sqrt[3]{(27+x)^2} + \sqrt[3]{27^2-x^2} + \sqrt[3]{(27-x)^2})} \\
 & = \frac{2}{27}.
 \end{aligned}$$

448.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}}$

$$\begin{aligned}
 & \text{解 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}} \\
 & = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x})(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})}{(\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x})(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} \\
 & \cdot \frac{(\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{1-x^2} + \sqrt[3]{(1-x)^2})}{(\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{1-x^2} + \sqrt[3]{(1-x)^2})} \\
 & = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{1-x^2} + \sqrt[3]{(1-x)^2}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{3}{2}.$$

449.  $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt[3]{x+20}}{\sqrt[4]{x+9} - 2}.$

解 
$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt[3]{x+20}}{\sqrt[4]{x+9} - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 7} \frac{(\sqrt[3]{(x+2)^3} - \sqrt[3]{(x+20)^2})(\sqrt[4]{x+9} + 2)(\sqrt{x+9} + 4)}{(\sqrt[4]{x+9} - 2)(\sqrt[4]{x+9} + 2)(\sqrt{x+9} + 4)} \\ &\quad \cdot \frac{(\sqrt[6]{(x+2)^{15}} + \sqrt[6]{(x+2)^{12}(x+20)^2} + \dots + \sqrt[6]{(x+20)^{16}})}{(\sqrt[6]{(x+2)^{15}} + \dots + \sqrt[6]{(x+20)^{16}})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 7} \frac{[(x+2)^3 - (x+20)^2](\sqrt[4]{x+9} + 2)(\sqrt{x+9} + 4)}{(x-7)(\sqrt[6]{(x+2)^{15}} + \dots + \sqrt[6]{(x+2)^{16}})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 7} \frac{(x-7)(x^2 + 12x + 56)(\sqrt[4]{x+9} + 2)(\sqrt{x+9} + 4)}{(x-7)(\sqrt[6]{(x+2)^{15}} + \dots + \sqrt[6]{(x+20)^{16}})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 7} \frac{(x^2 + 12x + 56)(\sqrt[4]{x+9} + 2)(\sqrt{x+9} + 4)}{(\sqrt[6]{(x+2)^{15}} + \sqrt[6]{(x+2)^{12}(x+20)^2} + \dots + \sqrt[6]{(x+20)^{16}})} \\ &= \frac{189 \cdot 4 \cdot 8}{3^5 + 3^4 \cdot 3 + 3^3 \cdot 3^2 + 3^2 \cdot 3^3 + 3 \cdot 3^4 + 3^5} \\ &= \frac{6048}{1458} = 4 \frac{4}{27} \end{aligned}$$

450.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1 + \frac{x}{3}} - \sqrt[4]{1 + \frac{x}{4}}}{1 - \sqrt{1 - \frac{x}{2}}}.$

解 
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1 + \frac{x}{3}} + \sqrt[4]{1 + \frac{x}{4}}}{1 - \sqrt{1 - \frac{x}{2}}}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[ \sqrt[12]{\left(1 + \frac{x}{3}\right)^4} - \sqrt[12]{\left(1 + \frac{x}{4}\right)^3} \right] \left[ 1 + \sqrt{1 - \frac{x}{2}} \right]}{\left[ 1 - \sqrt{1 - \frac{x}{2}} \right] \left[ 1 + \sqrt{1 - \frac{x}{2}} \right]} \\
&\quad \cdot \frac{\left[ \sqrt[12]{\left(1 + \frac{x}{3}\right)^{44}} + \cdots + \sqrt[12]{\left(1 + \frac{x}{4}\right)^{33}} \right]}{\left[ \sqrt[12]{\left(1 + \frac{x}{3}\right)^{44}} + \cdots + \sqrt[12]{\left(1 + \frac{x}{4}\right)^{33}} \right]} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \left( \frac{7}{12} + \frac{23x}{48} + \frac{7x^2}{54} + \frac{x^3}{81} \right) \left[ 1 + \sqrt{1 - \frac{x}{2}} \right]}{\frac{x}{2} \left[ \sqrt[12]{\left(1 + \frac{x}{3}\right)^{44}} + \cdots + \sqrt[12]{\left(1 + \frac{x}{4}\right)^{33}} \right]} \\
&= \frac{7}{36}.
\end{aligned}$$

451.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt[5]{1+5x} - (1+x)}.$

解  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt[5]{1+5x} - (1+x)}$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 (\sqrt[5]{(1+5x)^4} + \sqrt[5]{(1+5x)^3}(1+x) + \cdots + (1+x)^4)}{(1+5x) - (1+x)^5} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{(1+5x)^4} + \sqrt[5]{(1+5x)^3}(1+x) + \cdots + (1+x)^4}{-10 - 10x - 5x^2 - x^3} \\
&= -\frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

452.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[m]{1+ax} - \sqrt[n]{1+\beta x}}{x}$  ( $m$  及  $n$  为整数).

解 如果  $m$  及  $n$  为正整数, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[m]{1+ax} - \sqrt[n]{1+\beta x}}{x}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+\alpha x)^n - (1+\beta x)^m}{x(\sqrt[mn]{(1+\alpha x)^{n(mn-1)}} + \cdots + \sqrt[mn]{(1+\beta x)^{m(mn-1)}})} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(na - m\beta) + (C_n^2 \alpha^2 x + \cdots + \alpha^n x^{n-1} - C_m^2 \beta^2 - \cdots - \beta^m x^{m-1})}{\sqrt[mn]{(1+\alpha x)^{n(mn-1)}} + \cdots + \sqrt[mn]{(1+\beta x)^{m(mn-1)}}} \\
&= \frac{na - m\beta}{mn} = \frac{\alpha}{m} - \frac{\beta}{n}.
\end{aligned}$$

如果  $m$  及  $n$  为负整数. 设  $m = -m'$ ,  $n = -n'$ , 其中  $m'$  及  $n'$  为正整数, 则

$$\sqrt[n']{1+\alpha x} - \sqrt[m']{1+\beta x} = \frac{\sqrt[n']{1+\beta x} - \sqrt[n']{1+\alpha x}}{\sqrt[n']{1+\alpha x} \cdot \sqrt[m']{1+\beta x}}.$$

上式的分母趋于 1, 于是利用本题前半段的结果, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n']{1+\beta x} - \sqrt[n']{1+\alpha x}}{x} = \frac{\beta}{n'} - \frac{\alpha}{m'} = \frac{\alpha}{m} - \frac{\beta}{n}.$$

如果  $m$  及  $n$  中有一个为负整数, 另一个为正整数, 则同法可证上述结论仍然成立. 因此,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+\alpha x} - \sqrt[m]{1+\beta x}}{x} = \frac{\alpha}{m} - \frac{\beta}{n} \quad (mn \neq 0).$$

$$453. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+\alpha x} \cdot \sqrt[m]{1+\beta x} - 1}{x} \quad (m \text{ 及 } n \text{ 为整数}).$$

**解** 与 452 题相同, 先设  $m$  及  $n$  为正整数.

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+\alpha x} \cdot \sqrt[m]{1+\beta x} - 1}{x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+\alpha x)^n (1+\beta x)^m - 1}{x(\sqrt[mn]{(1+\alpha x)^{n(mn-1)} \cdot (1+\beta x)^{m(mn-1)}} + \cdots + 1)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{n\alpha + m\beta + o(x)}{\sqrt[mn]{(1+\alpha x)^{n(mn-1)} (1+\beta x)^{m(mn-1)}} + \cdots + 1} \\
&= \frac{n\alpha + m\beta}{mn} \\
&= \frac{\alpha}{m} + \frac{\beta}{n}.
\end{aligned}$$

若  $m$  及  $n$  为负整数, 则此结果仍然成立. 事实上, 只须设  $m = -m'$ ,  $n = -n'$ , 其中  $m'$  及  $n'$  为正整数. 于是,

$$\sqrt[m]{1+ax} \cdot \sqrt[n]{1+\beta x} - 1 = \frac{1 - \sqrt[m]{1+ax} \cdot \sqrt[n]{1+\beta x}}{\sqrt[m]{1+ax} \cdot \sqrt[n]{1+\beta x}}.$$

再利用前半段结果, 即得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt[m]{1+ax} \cdot \sqrt[n]{1+\beta x}}{x(\sqrt[m]{1+ax} \cdot \sqrt[n]{1+\beta x})} = -\frac{a}{m'} - \frac{\beta}{n'} = \frac{a}{m} + \frac{\beta}{n}.$$

若  $m$  及  $n$  中只有一个为负整数, 则同法可证上述结论仍然成立. 因而, 当  $m$  及  $n$  为整数时, 有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[m]{1+ax} \cdot \sqrt[n]{1+\beta x} - 1}{x} = \frac{a}{m} + \frac{\beta}{n} \quad (mn \neq 0).$$

454. 设  $P(x) = a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$  又  $m$  表整数, 求证:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[m]{1+P(x)} - 1}{x} = \frac{a_1}{m}.$$

$$\begin{aligned} \text{证} \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[m]{1+P(x)} - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{P(x)}{x(\sqrt[m]{1+P(x)^{m-1}} + \cdots + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_1 + a_2x + \cdots + a_nx^{n-1}}{(1+P(x))^{\frac{m-1}{m}} + \cdots + 1} \\ &= \frac{a_1}{m}. \end{aligned}$$

求下列的极限:

455.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[m]{x} - 1}{\sqrt[n]{x} - 1}$  ( $m$  及  $n$  表整数).

解 当  $m$  及  $n$  为正整数时, 我们有

$$\frac{\sqrt[n]{x} - 1}{\sqrt[m]{x} - 1} = \frac{x^{\frac{n-1}{n}} + x^{\frac{n-2}{n}} + \dots + 1}{x^{\frac{m-1}{m}} + x^{\frac{m-2}{m}} + \dots + 1} \rightarrow \frac{n}{m} (x \rightarrow 1).$$

若  $m$  及  $n$  为负整数时, 设  $m = -m'$ ,  $n = -n'$ ,  
其中  $m'$  及  $n'$  为正整数, 于是

$$\frac{\sqrt[n]{x} - 1}{\sqrt[m]{x} - 1} = \frac{1 - \sqrt[n]{x}}{1 - \sqrt[m]{x}} \cdot \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[m]{x}} \rightarrow \frac{n'}{m'} = \frac{n}{m} \quad (x \rightarrow 1).$$

当  $m$  及  $n$  中只有一个为负整数仍然成立. 因此

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[n]{x} - 1}{\sqrt[m]{x} - 1} = \frac{n}{m} \quad (m \neq 0).$$

$$456. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1 - \sqrt{x})(1 - \sqrt[3]{x}) \cdots (1 - \sqrt[n]{x})}{(1 - x)^{n-1}}$$

解 设  $x = t^{n!}$ , 则

$$\begin{aligned} & \frac{(1 - \sqrt{x})(1 - \sqrt[3]{x}) \cdots (1 - \sqrt[n]{x})}{(1 - x)^{n-1}} \\ &= \frac{(1 - t^{3 \cdot 4 \cdots n})(1 - t^{2 \cdot 4 \cdot 5 \cdots n}) \cdots (1 - t^{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdots (n-1)})}{(1 - t^{n!})^{n-1}} \\ &= \frac{(1+t+t^2+\cdots+t^{\frac{n!}{2}-1})(1+t+\cdots+t^{\frac{n!}{3}-1}) \cdots (1+t+\cdots+t^{\frac{n!}{n}-1})}{(1+t+\cdots+t^{n!-1})^{n-1}} \end{aligned}$$

当  $x \rightarrow 1$  时,  $t \rightarrow 1$ , 于是上式趋向于

$$\frac{\frac{n!}{2} \cdot \frac{n!}{3} \cdots \frac{n!}{n}}{(n!)^{n-1}} = \frac{1}{n!},$$

即

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1 - \sqrt{x})(1 - \sqrt[3]{x}) \cdots (1 - \sqrt[n]{x})}{(1 - x)^{n-1}} = \frac{1}{n!}.$$

$$457. \lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt{(x+a)(x+b)} - x].$$

$$\begin{aligned}
 & \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt{(x+a)(x+b)} - x] \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+a)(x+b) - x^2}{\sqrt{(x+a)(x+b)} + x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + ax + bx + ab - x^2}{1 + \sqrt{\left(1 + \frac{a}{x}\right)\left(1 + \frac{b}{x}\right)}} = \frac{a+b}{2}.
 \end{aligned}$$

$$458. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x} \right).$$

$$\begin{aligned}
 & \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x + \sqrt{x + \sqrt{x}}) - x}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} + \sqrt{x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x}}}}{1 + \sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{1}{x^3}}}} \\
 &= \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

$$459. \lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x^2 + 2x} - 2\sqrt{x^2 + x} + x)$$

解 设  $x = \frac{1}{t}$ , 则

$$\begin{aligned}
 & x(\sqrt{x^2 + 2x} - 2\sqrt{x^2 + x} + x) \\
 &= \frac{\sqrt{1+2t} - 2\sqrt{1+t} + 1}{t^2} \\
 &= \frac{(\sqrt{1+2t} + 1)^2 - 4(1+t)}{t^2(\sqrt{1+2t} + 1 + 2\sqrt{1+t})}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2(\sqrt{1+2t} - 1 - t)}{t^2(\sqrt{1+2t} + 1 + 2\sqrt{1+t})} \\
&= \frac{2(\sqrt{1+2t} - 1 - t)(1 + \sqrt{1+2t})^2}{t^2(\sqrt{1+2t} + 1 + 2\sqrt{1+t})(1 + \sqrt{1+2t})^2} \\
&= \frac{-4}{(\sqrt{1+2t} + 1 + 2\sqrt{1+t})(1 + \sqrt{1+2t})^2}.
\end{aligned}$$

当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $t \rightarrow 0$ , 于是上式趋向于  $-\frac{1}{4}$ ,

即

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x^2 + 2x} - 2\sqrt{x^2 + x} + x) = -\frac{1}{4}.$$

$$460. \lim_{x \rightarrow +0} \left( \sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{1}{x}} - \sqrt{\frac{1}{x}} - \sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{1}{x}} \right).$$

解

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow +0} \left( \sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{1}{x}} - \sqrt{\frac{1}{x}} - \sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{1}{x}} \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\left[ \frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{1}{x}} \right] - \left[ \frac{1}{x} - \sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{1}{x}} \right]}{\sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{1}{x}} - \sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{1}{x}}} \\
&= \lim_{x \rightarrow +0} \frac{2\sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{1}{x}}}{\sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{1}{x}} - \sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{1}{x}}}
\end{aligned}$$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1 + \sqrt{x}}}{\sqrt{1 + \sqrt{x+x\sqrt{x}}} + \sqrt{1 - \sqrt{x+x\sqrt{x}}}} \\ = 1.$$

461.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + x^2 + 1} - \sqrt[3]{x^3 - x^2 + 1})$

**解**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + x^2 + 1} - \sqrt[3]{x^3 - x^2 + 1})$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{\sqrt[3]{(x^3 + x^2 + 1)^2} + \sqrt[3]{(x^3 + x^2 + 1)(x^3 - x^2 + 1)} + \sqrt[3]{(x^3 - x^2 + 1)^2}}$$

$$= \frac{2}{3}.$$

462.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + 3x^2} - \sqrt{x^2 - 2x}).$

**解**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + 3x^2} - \sqrt{x^2 - 2x})$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^3 + 3x^2)^2 - (x^2 - 2x)^3}{\sqrt[6]{(x^3 + 3x^2)^{10}} + \sqrt{(x^3 + 3x^2)^8(x^2 - 2x)^3} + \dots + \sqrt[6]{(x^2 - 2x)^{15}}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^6 \left( 12 - \frac{3}{x} + \frac{8}{x^2} \right)}{\sqrt[6]{(x^3 + 3x^2)^{10}} + \dots + \sqrt[6]{(x^2 - 2x)^{15}}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{12 - \frac{3}{x} + \frac{8}{x^2}}{\sqrt[6]{\left( 1 + \frac{3}{x} \right)^{10}} + \dots + \sqrt[6]{\left( 1 - \frac{2}{x} \right)^{15}}}$$

$$= 2.$$

463.  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{3}} [(x+1)^{\frac{2}{3}} - (x-1)^{\frac{2}{3}}].$

**解**  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{3}} [(x+1)^{\frac{2}{3}} - (x-1)^{\frac{2}{3}}]$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{\frac{1}{3}} [(x+1)^{\frac{2}{3}} - (x-1)^{\frac{2}{3}}] \cdot ((x+1)^{\frac{4}{3}} + (x^2 - 1)^{\frac{2}{3}} + (x-1)^{\frac{4}{3}})}{(x+1)^{\frac{4}{3}} + (x^2 - 1)^{\frac{2}{3}} + (x-1)^{\frac{4}{3}}}$$

$$\begin{aligned}
&= 4 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{4}{3}} - \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)^{\frac{2}{3}} + \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{\frac{4}{3}}} \\
&= \frac{4}{3}.
\end{aligned}$$

464.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} (\sqrt{x+2} - 2\sqrt{x+1} + \sqrt{x}).$

$$\begin{aligned}
&\text{解 } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} (\sqrt{x+2} - 2\sqrt{x+1} + \sqrt{x}) \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{\frac{3}{2}} (\sqrt{x+2} - 2\sqrt{x+1} + \sqrt{x})(\sqrt{x+2} + 2\sqrt{x+1} + \sqrt{x})}{\sqrt{x+2} + 2\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^{\frac{3}{2}} (\sqrt{x^2+2x} - x - 1)(\sqrt{x^2+2x} + x + 1)}{(\sqrt{x+2} + 2\sqrt{x+1} + \sqrt{x})(\sqrt{x^2+2x} + x + 1)} \\
&= -2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\left[\sqrt{1 + \frac{2}{x}} + 2\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1\right] \left[\sqrt{1 + \frac{2}{x}} + 1 + \frac{1}{x}\right]} \\
&= -\frac{1}{4}.
\end{aligned}$$

465.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt[n]{(x + \alpha_1) \cdots (x + \alpha_n)} - x]$

$$\begin{aligned}
&\text{解 } \lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt[n]{(x + \alpha_1) \cdots (x + \alpha_n)} - x] \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x + \alpha_1) \cdots (x + \alpha_n) - x^n}{\sum_{j=1}^n \left( \prod_{i=1}^n (x + \alpha_i)^{\frac{n-i}{n}} \right) x^{j-1}} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left( \sum_{i=1}^n \alpha_i \right) x^{n-1} + \cdots + \prod_{i=1}^n \alpha_i}{\sum_{j=1}^n \left( \prod_{i=1}^n (x + \alpha_i)^{\frac{n-i}{n}} \right) x^{j-1}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{i=1}^n a_i + o\left(\frac{1}{x}\right)}{\sum_{j=1}^n \left( \prod_{i=1}^j \left(1 + \frac{a_i}{x}\right)^{\frac{n-i}{n}} \right)} \\
 &= \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n}.
 \end{aligned}$$

466.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x - \sqrt{x^2 - 1})^n + (x + \sqrt{x^2 - 1})^n}{x^n}$  ( $n$  表自然数).

$$\begin{aligned}
 &\text{解 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x - \sqrt{x^2 - 1})^n + (x + \sqrt{x^2 - 1})^n}{x^n} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[ \left(1 - \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}\right)^n + \left(1 + \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}\right)^n \right] \\
 &= 2^n.
 \end{aligned}$$

467.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x^2} + x)^n - (\sqrt{1+x^2} - x)^n}{x}$  ( $n$  表自然数).

$$\begin{aligned}
 &\text{解 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x^2} + x)^n - (\sqrt{1+x^2} - x)^n}{x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x} [(x + \sqrt{1+x^2})^{n-1} + (x + \sqrt{1+x^2})^{n-2} \\
 &\quad (\sqrt{1+x^2} - x) + \cdots + (\sqrt{1+x^2} - x)^{n-1}] \\
 &= 2n.
 \end{aligned}$$

468. 设二次方程式  $ax^2 + bx + c = 0$  的系数  $a$  趋于零, 系数  $b$  与  $c$  为常数, 且  $b \neq 0$ , 试研究此二次方程式之二根  $x_1$  及  $x_2$  的性质.

$$\text{解 } x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

不失一般性,假设  $b > 0$ ,于是,有

$$\lim_{a \rightarrow 0} x_2 = \infty$$

及

$$\begin{aligned}\lim_{a \rightarrow 0} x_1 &= \lim_{a \rightarrow 0} \frac{(-b + \sqrt{b^2 - 4ac})(-b - \sqrt{b^2 - 4ac})}{2a(-b - \sqrt{b^2 - 4ac})} \\&= -2c \lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{b + \sqrt{b^2 - 4ac}} \\&= -\frac{c}{b}.\end{aligned}$$

469. 从条件:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2 + 1}{x + 1} - ax - b \right) = 0$$

求常数  $a$  和  $b$ .

$$\begin{aligned}\text{解 } \frac{x^2 + 1}{x + 1} - ax - b \\= \frac{(1 - a)x^2 - (a + b)x + (1 - b)}{x + 1}.\end{aligned}$$

按假设,上式的极限为零的必要条件是

$$1 - a = 0 \quad \text{及} \quad a + b = 0,$$

解之,得

$$a = 1, \quad b = -1.$$

470. 从条件:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - a_1 x - b_1) = 0$$

$$\text{和} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - a_2 x - b_2) = 0$$

求常数  $a_i$  和  $b_i$  ( $i = 1, 2$ ).

$$\begin{aligned}\text{解 } \sqrt{x^2 - x + 1} - a_1 x - b_1 \\= \frac{(1 - a_1^2)x^2 - (1 + 2a_1 b_1)x + (1 - b_1^2)}{\sqrt{x^2 - x + 1} + a_1 x + b_1},\end{aligned}$$

上式极限为零的必要条件是

$$1 - a_1^2 = 0 \quad \text{及} \quad 1 + 2a_1 b_1 = 0,$$

解之, 得

$$a_1 = \pm 1, \quad b_1 = \mp \frac{1}{2}.$$

同理可得

$$a_2 = \pm 1, \quad b_2 = \mp \frac{1}{2}.$$

求下列的极限:

471.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x}.$

解  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x} = 5 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{5x}$   
 $= 5 \cdot 1 = 5.$

472.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x}.$

解 当  $x \rightarrow \infty$  时,  $\frac{1}{x}$  为无穷小量, 而  $|\sin x| \leq 1$ ,

故  $\frac{\sin x}{x}$  当  $x \rightarrow \infty$  时为无穷小量, 即

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0.$$

473.  $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin mx}{\sin nx}$  ( $m$  及  $n$  为整数).

解 设  $x = \pi + y$ , 则当  $x \rightarrow \pi$  时,  $y \rightarrow 0$ . 于是,

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin mx}{\sin nx} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(-1)^m \sin my}{(-1)^n \sin ny} \\ &= (-1)^{m-n} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin my}{my} \cdot \frac{ny}{\sin ny} \cdot \frac{m}{n} \end{aligned}$$

$$= (-1)^{m-n} \frac{m}{n}.$$

474.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}.$

解  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2}$   
 $= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 = \frac{1}{2}.$

475.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{\sin^3 x}.$

解  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{\sin^3 x} \leq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin x}{\cos x - \sin x}$   
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\cos x \sin^2 x}$   
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{4\sin^2 \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2} \cos x}$   
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2\cos^2 \frac{x}{2} \cos x} = \frac{1}{2}.$

476.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x - \sin 3x}{\sin x}.$

解  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x - \sin 3x}{\sin x}$   
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\cos 4x \sin x}{\sin x}$   
 $= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \cos 4x = 2.$

$$477. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 3x}{x^2}.$$

$$\begin{aligned}\text{解 } & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 3x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin 2x \sin x}{x^2} \\ &= 4 \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin x}{x} \right)^2 \cos x = 4.\end{aligned}$$

$$478. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \sin x - \cos x}{1 + \sin px - \cos px}.$$

$$\begin{aligned}\text{解 } & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \sin x - \cos x}{1 + \sin px - \cos px} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin^2 \frac{x}{2} + \sin x}{2\sin^2 \frac{px}{2} + \sin px} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x}{2} \left( \sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right)}{\sin \frac{px}{2} \left( \sin \frac{px}{2} + \cos \frac{px}{2} \right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \cdot \frac{\frac{px}{2}}{\sin \frac{px}{2}} \cdot \frac{1}{p} \cdot \frac{\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2}}{\sin \frac{px}{2} + \cos \frac{px}{2}} \\ &= \frac{1}{p} \quad (p \neq 0).\end{aligned}$$

$$479. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \operatorname{tg} 2x \operatorname{tg} \left( \frac{\pi}{4} - x \right).$$

$$\text{解 } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \operatorname{tg} 2x \operatorname{tg} \left( \frac{\pi}{4} - x \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin 2x \sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right)}{\cos 2x \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right)} \\
&= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\cos 2y \sin y}{\sin 2y \cos y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\cos 2y}{2 \cos^2 y} \\
&= \frac{1}{2},
\end{aligned}$$

其中  $x = \frac{\pi}{4} + y$ .

480.  $\lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}$ .

解 设  $x = 1-y$ , 则

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2} &= \lim_{y \rightarrow 0} y \operatorname{ctg} \frac{\pi y}{2} \\
&= \lim_{y \rightarrow 0} \left[ \frac{\frac{\pi y}{2}}{\sin \frac{\pi y}{2}} \cdot \frac{2}{\pi} \cdot \cos \frac{\pi y}{2} \right] = \frac{2}{\pi}.
\end{aligned}$$

481. 证明等式:

(a)  $\lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a$ ; (b)  $\lim_{x \rightarrow a} \cos x = \cos a$ ;

(c)  $\lim_{x \rightarrow a} \operatorname{tg} x = \operatorname{tg} a$  ( $a \neq \frac{2n-1}{2}\pi$ ;  $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ).

证 (a)  $|\sin x - \sin a| = 2 \left| \sin \frac{x-a}{2} \right| \cdot \left| \cos \frac{x+a}{2} \right|$   
 $\leq 2 \left| \sin \frac{x-a}{2} \right| \leq |x-a|$ .

任给  $\epsilon > 0$ , 要使

$$|\sin x - \sin a| < \epsilon,$$

只须  $|x-a| < \epsilon$ , 取  $\delta = \epsilon$ , 则当  $0 < |x-a| < \delta$  时,

$$|\sin x - \sin a| < \epsilon.$$

此即  $\lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a$ .

$$(6) \lim_{x \rightarrow a} \cos x = \lim_{x \rightarrow a} \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

$$= \sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \cos a.$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow a} \operatorname{tg} x = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} \sin x}{\lim_{x \rightarrow a} \cos x} = \frac{\sin a}{\cos a} = \operatorname{tg} a.$$

其中  $a \neq \frac{2n-1}{2}\pi$ ,  $n = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$

求下列的极限:

$$482. \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x - a}.$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad & \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{2 \cos \frac{x+a}{2} \sin \frac{x-a}{2}}{x-a} \\ & = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos \frac{x+a}{2} \sin \frac{x-a}{2}}{\frac{x-a}{2}} = \cos a. \end{aligned}$$

$$483. \lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos x - \cos a}{x - a}.$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad & \lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos x - \cos a}{x - a} \\ & = \lim_{x \rightarrow a} \frac{-\sin \frac{x-a}{2}}{\frac{x-a}{2}} \cdot \sin \frac{x+a}{2} \\ & = -\sin a. \end{aligned}$$

$$484. \lim_{x \rightarrow a} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} a}{x - a}.$$

$$\text{解} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin(x-a)}{(x-a)\cos x \cos a}$$

$$= \frac{1}{\cos^2 a} \quad (a \neq \frac{2k+1}{2}\pi; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

485.  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg} a}{x - a}$ .

解 
$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow a} \frac{\operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg} a}{x - a} \\ &= - \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin(x-a)}{x-a} \cdot \frac{1}{\sin x \sin a} \\ &= - \frac{1}{\sin^2 a} \quad (a \neq k\pi; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \end{aligned}$$

486.  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sec x - \sec a}{x - a}$ .

解 
$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sec x - \sec a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos a - \cos x}{(x-a) \cos x \cos a} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin \frac{x+a}{2}}{\cos x \cos a} \cdot \frac{\sin \frac{x-a}{2}}{\frac{x-a}{2}} \\ &= \frac{\sin a}{\cos^2 a} \quad (a \neq \frac{2k+1}{2}\pi; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \end{aligned}$$

487.  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\operatorname{cosec} x - \operatorname{cosec} a}{x - a}$ .

解 
$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow a} \frac{\operatorname{cosec} x - \operatorname{cosec} a}{x - a} \\ &= - \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x - a} \cdot \frac{1}{\sin x \sin a} \\ &= - \frac{\cos a}{\sin^2 a} \quad (a \neq k\pi; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \end{aligned}$$

\* ) 利用 482 题的结果.

488.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(a+2x) - 2\sin(a+x) + \sin a}{x^2}$ .

解 
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(a+2x) - 2\sin(a+x) + \sin a}{x^2}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin(a+2x) - \sin(a+x)] - [\sin(a+x) - \sin a]}{x^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\cos\left(a + \frac{3x}{2}\right)\sin\frac{x}{2} - 2\cos\left(a + \frac{x}{2}\right)\sin\frac{x}{2}}{x^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin\frac{x}{2}\left[\cos\left(a + \frac{3x}{2}\right) - \cos\left(a + \frac{x}{2}\right)\right]}{x^2} \\
&= -\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 \cdot \sin(a+x) \\
&= -\sin a.
\end{aligned}$$

489.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(a+2x) - 2\cos(a+x) + \cos a}{x^2}$

$$\begin{aligned}
&\text{解 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(a+2x) - 2\cos(a+x) + \cos a}{x^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\cos(a+2x) - \cos(a+x)] - [\cos(a+x) - \cos a]}{x^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2\sin\left(a + \frac{3x}{2}\right)\sin\frac{x}{2} + 2\sin\left(a + \frac{x}{2}\right)\sin\frac{x}{2}}{x^2} \\
&= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin\frac{x}{2}\left[\sin\left(a + \frac{3x}{2}\right) - \sin\left(a + \frac{x}{2}\right)\right]}{x^2} \\
&= -\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 \cos(a+x) \\
&= -\cos a.
\end{aligned}$$

490.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(a+2x) - 2\operatorname{tg}(a+x) + \operatorname{tg} a}{x^2}$

$$\begin{aligned}
& \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(a+2x) - 2\operatorname{tg}(a+x) + \operatorname{tg}a}{x^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\operatorname{tg}(a+2x) - \operatorname{tg}(a+x)) - (\operatorname{tg}(a+x) - \operatorname{tg}a)}{x^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{\sin(a+2x)\cos(a+x) - \cos(a+2x)\sin(a+x)}{\cos(a+2x)\cos(a+x)} \right. \\
&\quad \left. + \frac{-\cos a \sin(a+x) - \cos(a+x)\sin a}{\cos(a+x)\cos a} \right\} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x [\cos(a+x)\cos a - \cos(a+x)\cos(a+2x)]}{x^2 \cos a \cos(a+2x) \cos^2(a+x)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} \cdot \frac{2\sin(a+x)}{\cos a \cos(a+2x) \cos(a+x)} \\
&= \frac{2\sin a}{\cos^3 a} \quad (a \neq \frac{2k+1}{2}\pi; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
491. \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ctg}(a+2x) - 2\operatorname{ctg}(a+x) + \operatorname{ctg}a}{x^2} \\
& \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ctg}(a+2x) - 2\operatorname{ctg}(a+x) + \operatorname{ctg}a}{x^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x \sin(a+x)(\sin a - \sin(a+2x))}{x^2 \sin a \sin^2(a+x) \sin(a+2x)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin x}{x} \right)^2 \frac{2\cos(a+x)}{\sin a \cdot \sin(a+x) \sin(a+2x)} \\
&= \frac{2\cos a}{\sin^3 a} \quad (a \neq k\pi; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
492. \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(a+x)\sin(a+2x) - \sin^2 a}{x} \\
& \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(a+x)\sin(a+2x) - \sin^2 a}{x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}[\cos x - \cos(2a+3x)] - \sin^2 a}{x}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos(2a + 3x) - (1 - \cos 2a)}{2x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left[ -\frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{x} + \frac{\sin \frac{3x}{2}}{\frac{3x}{2}} \cdot \frac{3\sin\left(2a + \frac{3x}{2}\right)}{2} \right] \\
&= \frac{3}{2} \sin 2a.
\end{aligned}$$

493.  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{2\sin^2 x + \sin x - 1}{2\sin^2 x - 3\sin x + 1}$ .

$$\begin{aligned}
\text{解 } &\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{2\sin^2 x + \sin x - 1}{2\sin^2 x - 3\sin x + 1} \\
&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{(2\sin x - 1)(\sin x + 1)}{(2\sin x - 1)(\sin x - 1)} \\
&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{\sin x + 1}{\sin x - 1} = -3.
\end{aligned}$$

494.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{1 - \cos x}$ .

解 因为

$$\begin{aligned}
&1 - \cos x \cos 2x \cos 3x \\
&= 1 - \frac{1}{2}(\cos 4x + \cos 2x)\cos 2x \\
&= 1 - \frac{1}{2}\cos 4x \cos 2x - \frac{1}{2}\cos^2 2x \\
&= 1 - \frac{1}{4}(\cos 6x + \cos 2x) - \frac{1}{4}(1 + \cos 4x) \\
&= \frac{1}{2}(\sin^2 x + \sin^2 2x + \sin^2 3x).
\end{aligned}$$

所以,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{1 - \cos x}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(\sin^2 x + \sin^2 2x + \sin^2 3x)}{2 \sin 2 \frac{x}{2}} \\
&= \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \left[ \left( \frac{\sin x}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 + \left( \frac{\sin 2x}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 + \left( \frac{\sin 3x}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 \right] \\
&= \frac{1}{4}(4 + 16 + 36) = 14.
\end{aligned}$$

495.  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin \left( x - \frac{\pi}{3} \right)}{1 - 2 \cos x}.$

解 设  $x = \frac{\pi}{3} + y$ , 则

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin \left( x - \frac{\pi}{3} \right)}{1 - 2 \cos x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{1 - \cos y + \sqrt{3} \sin y} \\
&= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{y}{\sin \frac{y}{2}} \sin \frac{y}{2} + \sqrt{3} \frac{\sin y}{y}}{\frac{y}{\sin \frac{y}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.
\end{aligned}$$

496.  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\operatorname{tg}^3 x - 3 \operatorname{tg} x}{\cos \left( x + \frac{\pi}{6} \right)}.$

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\operatorname{tg}^3 x - 3 \operatorname{tg} x}{\cos \left( x + \frac{\pi}{6} \right)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\operatorname{tg} x \cdot \frac{\sin^2 x - 3 \cos^2 x}{\cos^2 x}}{\frac{\sqrt{3}}{2} \cos x - \frac{1}{2} \sin x}
\end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\operatorname{tg}x(\sin x + \sqrt{3}\cos x)}{-\frac{1}{2}\cos^2 x} = -24.$$

497.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(a+x)\operatorname{tg}(a-x) - \operatorname{tg}^2 a}{x^2}.$

解  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(a+x)\operatorname{tg}(a-x) - \operatorname{tg}^2 a}{x^2}$   
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left( \frac{\operatorname{tg}a + \operatorname{tg}x}{1 - \operatorname{tg}a\operatorname{tg}x} \right) \left( \frac{\operatorname{tg}a - \operatorname{tg}x}{1 + \operatorname{tg}a\operatorname{tg}x} \right) - \operatorname{tg}^2 a}{x^2}$   
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}^2 x (\operatorname{tg}^4 a - 1)}{x^2 (1 - \operatorname{tg}^2 a \operatorname{tg}^2 x)} = \operatorname{tg}^4 a - 1 = \frac{-\cos 2a}{\cos^4 a}$   
 $(a \neq \frac{2k+1}{2}\pi; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$

498.  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - \operatorname{ctg}^3 x}{2 - \operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg}^3 x}.$

解  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - \operatorname{ctg}^3 x}{2 - \operatorname{ctg} x - \operatorname{ctg}^3 x}$   
 $= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin^3 x - \cos^3 x}{2\sin^3 x - \sin^2 x \cos x - \cos^3 x}$   
 $= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 x + \sin x \cos x + \cos^2 x}{2\sin^2 x + \sin x \cos x + \cos^2 x} = \frac{3}{4}.$

499.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \operatorname{tg}x} - \sqrt{1 + \sin x}}{x^3}.$

解  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \operatorname{tg}x} - \sqrt{1 + \sin x}}{x^3}$   
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}x - \sin x}{x^3 (\sqrt{1 + \operatorname{tg}x} + \sqrt{1 + \sin x})}$   
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x (1 - \cos x)}{x^3 \cos x (\sqrt{1 + \operatorname{tg}x} + \sqrt{1 + \sin x})}$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{4\left(\frac{x}{2}\right)^2} \cdot \\
&\quad \frac{1}{\cos x (\sqrt{1 + \tan x} + \sqrt{1 + \sin x})} \\
&= \frac{1}{4}.
\end{aligned}$$

500.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt{1 + x \sin x} - \sqrt{\cos x}}.$

解

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt{1 + x \sin x} - \sqrt{\cos x}} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 (\sqrt{1 + x \sin x} + \sqrt{\cos x})}{\sqrt{1 + x \sin x} - \sqrt{\cos x}} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x \sin x} + \sqrt{\cos x}}{\frac{\sin x}{x} + \frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{x^2}} = \frac{4}{3},
\end{aligned}$$

501.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}.$

解

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sqrt[3]{\cos x} (1 - \sqrt[6]{\cos x})}{\sin^2 x} \\
&= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x} \cdot \frac{\sqrt[3]{\cos x}}{1 + \sqrt[6]{\cos x} + \dots + \sqrt[6]{\cos^5 x}} \\
&= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{4\left(\frac{x}{2}\right)^2} \cdot \frac{x^2}{\sin^2 x} \cdot
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{\sqrt[3]{\cos x}}{1 + \sqrt[6]{\cos x} + \cdots + \sqrt[6]{\cos^5 x}} \\ &= \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

502.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \cos x^2}}{1 - \cos x}.$

$$\begin{aligned} \text{解 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \cos x^2}}{1 - \cos x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2} \sin \frac{x^2}{2}}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} \\ &= \sqrt{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x^2}{2}}{\frac{x^2}{2}} \cdot \left[ \frac{\frac{x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right]^2 = \sqrt{2}. \end{aligned}$$

503.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{1 - \cos(\sqrt{x})}.$

$$\begin{aligned} \text{解 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{1 - \cos(\sqrt{x})} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{2 \sin^2 \frac{\sqrt{x}}{2} (1 + \sqrt{\cos x})} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 \cdot \left( \frac{\frac{\sqrt{x}}{2}}{\sin \frac{\sqrt{x}}{2}} \right)^2 \cdot \frac{x}{1 + \sqrt{\cos x}} = 0. \end{aligned}$$

504.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x - \sqrt{\cos 2x} - \sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}.$

解 不妨令  $x \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ , 则

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x - \sqrt{\cos 2x} - \sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x + \cos x (1 - \sqrt{\cos 2x} - \sqrt[3]{\cos 3x})}{x^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos 2x} + \sqrt{\cos 2x}(1 - \sqrt[3]{\cos 3x})}{x^2} \\
&= \frac{1}{2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2(1 + \sqrt{\cos 2x})} \\
&\quad + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{x^2(1 + \sqrt[3]{\cos 3x} + \sqrt[3]{\cos^2 3x})} = 3.
\end{aligned}$$

505.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x}).$

解  $\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x}$   
 $= 2 \sin \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{2} \cos \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2}.$

因为  $\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} \rightarrow 0$

( $x \rightarrow +\infty$ ), 所以,

$$\sin \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{2} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty).$$

又因  $\left| \cos \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2} \right| \leq 1,$

故  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x}) = 0.$

506. (a)  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1+x}{2+x} \right)^{\frac{1-\sqrt{x}}{1-x}}$ ; (b)  $\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{1+x}{2+x} \right)^{\frac{1-\sqrt{x}}{1-x}},$

(c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{1+x}{2+x} \right)^{\frac{1-\sqrt{x}}{1-x}}.$

解 (a)  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1+x}{2+x} \right)^{\frac{1-\sqrt{x}}{1-x}} = \frac{1}{2};$

(b)  $\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{1+x}{2+x} \right)^{\frac{1-\sqrt{x}}{1-x}}$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{1+x}{2+x} \right)^{\frac{1}{1+\sqrt{x}}} = \sqrt{\frac{2}{3}};$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{1+x}{2+x} \right)^{\frac{1-\sqrt{x}}{1+x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{1+x}{2+x} \right)^{\frac{1}{1+\sqrt{x}}} = 1^0 = 1,$$

507.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x+2}{2x-1} \right)^{\frac{x^2}{x^2}}$ .

解  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x+2}{2x-1} \right)^{\frac{x^2}{x^2}} = 0.$

508.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + x + 1} \right)^{\frac{x^3}{1-x}}.$

解 因为当  $x \rightarrow \infty$  时,

$$\frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + x + 1} \rightarrow \frac{3}{2}.$$

及  $\frac{x^3}{1-x} = \frac{x^2}{\frac{1}{x}-1} \rightarrow -\infty,$

所以

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + x + 1} \right)^{\frac{x^3}{1-x}} = 0.$$

509.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sin^n \frac{2\pi n}{3n+1} \right).$

解 因为  $\left| \sin \frac{2\pi n}{3n+1} \right| \leq 1$ , 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^n \frac{2\pi n}{3n+1} = 0.$$

510.  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}+0} \left[ \operatorname{tg} \left( \frac{\pi}{8} + x \right) \right]^{\operatorname{tg} 2x}.$

解 因为当  $x \rightarrow \frac{\pi}{4} + 0$  时,

$$1 < \operatorname{tg} \left( \frac{\pi}{8} + x \right) < +\infty$$

及  $\operatorname{tg} 2x \rightarrow -\infty$ .

所以

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}+0} \left( \operatorname{tg} \left( \frac{\pi}{8} + x \right) \right)^{\operatorname{tg} 2x} = 0.$$

$$511. \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right)^{\frac{x-1}{x+1}}.$$

解  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right)^{\frac{x-1}{x+1}} = 1.$

$$512. \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} \right)^{x^2}.$$

解  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} \right)^{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{\frac{x^2 - 1}{2}} \right)^{\frac{x^2 - 1}{2} \cdot 2 + 1} = e^2.$

$$513. \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2 + 2x - 1}{2x^2 - 3x - 2} \right)^{\frac{1}{x}}.$$

解  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2 + 2x - 1}{2x^2 - 3x - 2} \right)^{\frac{1}{x}} = \left( \frac{1}{2} \right)^0 = 1.$

$$514. \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{1 - 2x}.$$

解  $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{1 - 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + (-2x))^{\frac{1}{3}(-2)} = e^{-2}.$

$$515. \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x + a}{x - a} \right)^x.$$

解  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x + a}{x - a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{\frac{x-a}{2a}} \right)^{\frac{x+a}{2a} \cdot 2a + a} = e^{2a}.$

$$516. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{a_1 x + b_1}{a_2 x + b_2} \right)^x (a_1 > 0, a_2 > 0).$$

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad & \left( \frac{a_1x + b_1}{a_2x + b_2} \right)^x = \left( \frac{a_1}{a_2} \right)^x \cdot \left( \frac{x + \frac{b_1}{a_1}}{x + \frac{b_2}{a_2}} \right)^x \\
 & = \left( \frac{a_1}{a_2} \right)^x \cdot \left( 1 + \frac{1}{\frac{x + \frac{b_2}{a_2}}{\frac{b_1}{a_1} - \frac{b_2}{a_2}}} \right)^{\frac{x + \frac{b_2}{a_2}}{\frac{b_1}{a_1} - \frac{b_2}{a_2}} \left( \frac{b_1}{a_1} - \frac{b_2}{a_2} \right) - \frac{b_2}{a_2}}
 \end{aligned}$$

(1) 当  $a_1 = a_2 = a$  时,

$$\begin{aligned}
 \left( \frac{a_1x + b_1}{a_2x + b_2} \right)^x &= \left( 1 + \frac{1}{\frac{x + \frac{b_2}{a}}{\frac{b_1 - b_2}{a}}} \right)^{\frac{x + \frac{b_2}{a}}{\frac{b_1 - b_2}{a}} \cdot \frac{b_1 - b_2}{a} - \frac{b_2}{a}} \\
 &= \frac{b_1 - b_2}{a}
 \end{aligned}$$

于是,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{a_1x + b_1}{a_2x + b_2} \right)^x = e^{\frac{b_1 - b_2}{a_1}}.$$

(2) 当  $a_1 < a_2$  时,  $0 < \frac{a_1}{a_2} < 1$ ,

于是,

$$\left( \frac{a_1}{a_2} \right)^x \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty),$$

$$\text{而} \quad \left( \frac{x + \frac{b_1}{a_1}}{x + \frac{b_2}{a_2}} \right)^x \rightarrow e^{\frac{b_1 - b_2}{a_1 - a_2}},$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{a_1x + b_1}{a_2x + b_2} \right)^x = 0.$$

(3) 当  $a_1 > a_2$  时,  $\frac{a_1}{a_2} > 1$ .

于是,

$$\left(\frac{a_1}{a_2}\right)^x \rightarrow +\infty,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{a_1 x + b_1}{a_2 x + b_2} \right)^x = +\infty.$$

517.  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2)^{\operatorname{ctg}^2 x}$ .

解  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2)^{\operatorname{ctg}^2 x}$   
 $= \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2)^{\frac{1}{x^2} \cdot (\frac{x}{\sin x})^2 \cdot \cos^2 x} = e.$

518.  $\lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sin \pi x)^{\operatorname{ctg} \pi x}$ .

解  $\lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sin \pi x)^{\operatorname{ctg} \pi x}$   
 $= \lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sin \pi x)^{\frac{1}{\sin \pi x} \cdot \cos \pi x} = e^{-1}.$

519.  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1 + \operatorname{tg} x}{1 + \sin x} \right)^{\frac{1}{\sin x}}$ .

解  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1 + \operatorname{tg} x}{1 + \sin x} \right)^{\frac{1}{\sin x}}$   
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \left( 1 + \frac{1}{\frac{1 + \sin x}{\operatorname{tg} x - \sin x}} \right)^{\frac{1 + \sin x}{\operatorname{tg} x - \sin x} \cdot \frac{1 - \cos x}{\cos x (1 + \sin x)}} = e^0 = 1.$

520.  $\lim_{x \rightarrow a} \left( \frac{\sin x}{\sin a} \right)^{\frac{1}{x-a}}$ .

解  $\lim_{x \rightarrow a} \left( \frac{\sin x}{\sin a} \right)^{\frac{1}{x-a}}$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \left[ 1 + \frac{1}{\frac{\sin x - \sin a}{\sin x - \sin a}} \right]^{\frac{\sin x - \sin a}{\sin x - \sin a} \cdot \frac{1}{\sin x - \sin a}} \\ = e^{\operatorname{ctga}^*}(a \neq k\pi; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

\* ) 利用 482 题的结果.

521.  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$ .

解  $\left( \frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = \left[ 1 + \frac{1}{\frac{\cos 2x - \cos x}{\cos x - \cos 2x}} \right]^{\frac{\cos 2x - \cos x}{\cos x - \cos 2x} \cdot \frac{1}{x^2}}$

因为

$$\frac{\cos x - \cos 2x}{x^2} = \frac{\cos x + 1 - 2\cos^2 x}{x^2}$$

$$= \frac{1 - \cos x}{x^2} (1 + 2\cos x) = \frac{1 + 2\cos x}{2} \cdot \left( \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 \rightarrow \frac{3}{2}$$

$(x \rightarrow 0)$ ,

所以,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{\frac{3}{2}}.$$

522.  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\operatorname{tg} x)^{\operatorname{tg} 2x}$ .

解  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\operatorname{tg} x)^{\operatorname{tg} 2x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\operatorname{tg} x)^{\frac{\operatorname{tg} 2x}{1 - \operatorname{tg}^2 x}}$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (1 + \operatorname{tg} x - 1)^{\frac{1}{\operatorname{tg} x - 1} \cdot \frac{-2\operatorname{tg} x}{\operatorname{tg} x + 1}} = e^{-1}.$$

523.  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\operatorname{tg} x}$ .

$$\begin{aligned} \text{解 } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\operatorname{tg} x} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (1 + \operatorname{ctg}^2 x)^{-\frac{\operatorname{tg} x}{2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (1 + \operatorname{ctg}^2 x)^{\frac{1}{\operatorname{ctg}^2 x} \cdot \frac{-\operatorname{ctg} x}{2}} = e^0 = 1. \end{aligned}$$

$$524. \lim_{x \rightarrow 0} \left( \operatorname{tg} \left( \frac{\pi}{4} - x \right) \right)^{\operatorname{ctg} x}.$$

$$\begin{aligned} \text{解 } \lim_{x \rightarrow 0} \left( \operatorname{tg} \left( \frac{\pi}{4} - x \right) \right)^{\operatorname{ctg} x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1 - \operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg} x} \right)^{\operatorname{ctg} x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left( 1 + \frac{1}{\frac{1 + \operatorname{tg} x}{2 \operatorname{tg} x} \cdot \left( \frac{-2}{1 + \operatorname{tg} x} \right)} \right)^{\frac{1 + \operatorname{tg} x}{2 \operatorname{tg} x} \cdot \left( \frac{-2}{1 + \operatorname{tg} x} \right)} = e^{-2}. \end{aligned}$$

$$525. \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x.$$

$$\begin{aligned} \text{解 } \left( \sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x &= \left( 1 + \left( \sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1 \right) \right)^{\frac{1}{\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1} \cdot x(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1)} \\ & \quad \text{因为} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1) &= \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} - \frac{2 \sin \frac{1}{2x} \sin \frac{1}{2x}}{\frac{1}{2x} \cdot 2} \\ &\rightarrow 1 \quad (x \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x = e.$$

$$526. \lim_{x \rightarrow +0} \sqrt[x]{\cos \sqrt{x}}.$$

$$\text{解 } \lim_{x \rightarrow +0} \sqrt[x]{\cos \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +0} e^{\frac{1}{x} \cdot \ln \cos \sqrt{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +0} e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{\ln(\cos \sqrt{x} + 1 + 1)}{\cos \sqrt{x} - 1} (\cos \sqrt{x} - 1) \\ = \lim_{x \rightarrow +0} e^{-\frac{1}{x} \cdot 2 \sin^2 \frac{\sqrt{x}}{2}} = e^{-\frac{1}{2}}.$$

\* ) 原题为  $x \rightarrow 0$ , 应改为  $x \rightarrow +0$ .

\*\* ) 利用 529 题的结果.

527.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n+x}{n-1} \right)^n$ .

解  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n+x}{n-1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{n-1} \right)^{\frac{n-1 \cdot (x+1)+1}{x+1}} = e^{x+1}$ .

528.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos^n \frac{x}{\sqrt{n}}$ .

解  $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos^n \frac{x}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{\sqrt{n}} \right)^{-\frac{x}{2}}$   
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{\sqrt{n}} \right)^{\frac{1}{\operatorname{tg}^2 \frac{x}{\sqrt{n}}} \cdot \left( \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{\sqrt{n}}}{\frac{x}{\sqrt{n}}} \right)^2 \cdot \left( -\frac{x^2}{2} \right)} = e^{-\frac{x^2}{2}}$ .

529.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$ .

解  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1$ .

530.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\ln(x+1) - \ln x)$ .

解  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\ln(x+1) - \ln x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right)^x \\ = \ln e = 1$ .

531.  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\ln x - \ln a}{x - a}$  ( $a > 0$ ).

解  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\ln x - \ln a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\ln \frac{x}{a}}{x - a}$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \ln \left( 1 + \frac{1}{\frac{a}{x-a}} \right)^{\frac{a}{x-a} \cdot \frac{1}{a}} = \ln e^{\frac{1}{a}} = \frac{1}{a}.$$

532.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\sin \ln(x+1) - \sin \ln x].$

解  $\sin \ln(x+1) - \sin \ln x$   
 $= 2 \cos \frac{\ln(x+1) + \ln x}{2} \sin \frac{\ln(x+1) - \ln x}{2}.$

因为

$$\ln(x+1) - \ln x = \ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right) \rightarrow 0 (x \rightarrow +\infty),$$

所以

$$\sin \frac{\ln(x+1) - \ln x}{2} \rightarrow 0;$$

又因  $\cos \frac{\ln(x+1) + \ln x}{2}$  为有界函数, 所以

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [\sin \ln(x+1) - \sin \ln x] = 0.$$

533.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 - x + 1)}{\ln(x^{10} + x + 1)}.$

解  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 - x + 1)}{\ln(x^{10} + x + 1)}$   
 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln x + \ln \left( 1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right)}{10 \ln x + \ln \left( 1 + \frac{1}{x^9} + \frac{1}{x^{10}} \right)}$   
 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \frac{1}{\ln x} \cdot \ln \left( 1 + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} \right)}{10 + \frac{1}{\ln x} \cdot \ln \left( 1 + \frac{1}{x^9} + \frac{1}{x^{10}} \right)} = \frac{1}{5}.$

534.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \lg \frac{100 + x^2}{1 + 100x^2} \right).$

解  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \lg \frac{100 + x^2}{1 + 100x^2} \right) = \lg \frac{1}{100} = -2.$

$$535. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(2 + e^{3x})}{\ln(3 + e^{2x})}$$

解  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(2 + e^{3x})}{\ln(3 + e^{2x})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x + \ln(2e^{-3x} + 1)}{2x + \ln(3e^{-2x} + 1)}$   
 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{1}{x} \ln(2e^{-3x} + 1)}{2 + \frac{1}{x} \ln(3e^{-2x} + 1)} = \frac{3}{2}.$

$$536. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + \sqrt{x} + \sqrt[3]{x})}{\ln(1 + \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x})}.$$

解  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + \sqrt{x} + \sqrt[3]{x})}{\ln(1 + \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x})}.$   
 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{2} \ln x + \ln(x^{-\frac{1}{2}} + 1 + x^{-\frac{1}{6}})}{\frac{1}{3} \ln x + \ln(x^{-\frac{1}{3}} + 1 + x^{-\frac{1}{12}})}$   
 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{\ln x} \cdot \ln(x^{-\frac{1}{2}} + 1 + x^{-\frac{1}{6}})}{\frac{1}{3} + \frac{1}{\ln x} \cdot \ln(x^{-\frac{1}{3}} + 1 + x^{-\frac{1}{12}})} = \frac{3}{2}.$

$$537. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log(x+h) + \log(x-h) - 2\log x}{h^2} (x > 0).$$

解  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log(x+h) + \log(x-h) - 2\log x}{h^2}$   
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log(x^2 - h^2) - \log x^2}{h^2}$   
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \left( -\frac{1}{x^2} \log \left( 1 - \frac{h^2}{x^2} \right)^{-\frac{x^2}{h^2}} \right) = -\frac{1}{x^2} \log e.$

$$538. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Intg} \left( \frac{\pi}{4} + ax \right)}{\sin bx}.$$

$$\begin{aligned}
& \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + ax\right)}{\sin bx} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \ln \left( 1 + (\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + ax\right) - 1) \right)^{\frac{1}{\sin bx}} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \ln \left[ 1 + \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4} + ax\right) - \cos\left(\frac{\pi}{4} + ax\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{4} + ax\right)} \right]^{\frac{1}{\sin bx}} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \ln \left[ 1 + \frac{\sqrt{2} \sin ax}{\cos\left(\frac{\pi}{4} + ax\right)} \right]^{\frac{\cos\left(\frac{\pi}{4} + ax\right)}{\sqrt{2} \sin ax} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\cos\left(\frac{\pi}{4} + ax\right)} \cdot \frac{\sin ax}{ax} \cdot \frac{bx}{\sin bx} \cdot \frac{a}{b}} \\
&= \ln e^{\frac{2a}{b}} = \frac{2a}{b}.
\end{aligned}$$

539.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos ax}{\ln \cos bx}$ .

$$\begin{aligned}
& \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos ax}{\ln \cos bx} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\ln \cos ax}{\cos ax - 1} \cdot \frac{\cos bx - 1}{\ln \cos bx} \cdot \frac{\cos ax - 1}{\cos bx - 1} \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{ax}{2}}{2 \sin^2 \frac{bx}{2}} = \frac{a^2}{b^2}.
\end{aligned}$$

540.  $\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \ln \frac{nx + \sqrt{1 - n^2 x^2}}{x + \sqrt{1 - x^2}} \right]$ .

$$\text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left[ \ln \frac{nx + \sqrt{1 - n^2 x^2}}{x + \sqrt{1 - x^2}} \right] = \ln 1 = 0.$$

541.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} (a > 0)$ .

**解** 设  $a^x - 1 = y$ , 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\log_a(1+y)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\log_a(1+y)^{\frac{1}{y}}}$$

$$= \frac{1}{\log_a e} = \ln a.$$

542.  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{a^x - x^a}{x - a}$  ( $a > 0$ ).

解 
$$\begin{aligned} \frac{a^x - x^a}{x - a} &= \frac{a^x \left( a^{x-a} - \left( \frac{x}{a} \right)^a \right)}{x - a} \\ &= a^a \cdot \frac{a^{x-a} - 1}{x - a} - a^a \cdot \frac{\left( \frac{x}{a} \right)^a - 1}{x - a} \\ &= a^a \frac{a^{x-a} - 1}{x - a} - a^a \frac{e^{a \ln \frac{x}{a}} - 1}{a \ln \frac{x}{a}} \cdot \frac{a \ln \left( 1 + \frac{x-a}{a} \right)}{x - a}, \end{aligned}$$

当  $x \rightarrow a$  时, 等式第一项趋向  $a^a \ln a$ , 而第二项趋向  $a^a \cdot 1 \cdot 1 = a^a$ , 所以,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{a^x - x^a}{x - a} = a^a \ln a - a^a = a^a \ln \frac{a}{e}.$$

543.  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^x - a^a}{x - a}$  ( $a > 0$ ).

解 
$$\frac{x^x - a^a}{x - a} = a^a \cdot \frac{e^{x \ln x - a \ln a} - 1}{x \ln x - a \ln a} \cdot \frac{x \ln x - a \ln a}{x - a}.$$

而当  $x \rightarrow a$  时,

$$\begin{aligned} \frac{x \ln x - a \ln a}{x - a} &= \frac{x \ln x - x \ln a}{x - a} + \ln a \\ &= \frac{x}{a} \cdot \frac{\ln \left( 1 + \frac{x-a}{a} \right)}{\frac{x-a}{a}} + \ln a \rightarrow 1 + \ln a = \ln ea. \end{aligned}$$

又

$$\frac{e^{x \ln a - a \ln a} - 1}{x \ln a - a \ln a} \rightarrow 1 (x \rightarrow a),$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^a - a^a}{x - a} = a^a \ln a.$$

$$544. \lim_{x \rightarrow 0} (x + e^x)^{\frac{1}{x}}.$$

$$\text{解 } \lim_{x \rightarrow 0} (x + e^x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\left(1 + \frac{x}{e^x}\right)^{\frac{e^x - e^{-x}}{x}}} = e \cdot e = e^2.$$

$$545. \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1 + x \cdot 2^x}{1 + x \cdot 3^x} \right)^{\frac{1}{x^2}}.$$

$$\text{解 } \left( \frac{1 + x \cdot 2^x}{1 + x \cdot 3^x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$$

$$= \left( 1 + \frac{1}{\frac{1 + x \cdot 3^x}{x(2^x - 3^x)}} \right)^{\frac{1 + x \cdot 3^x}{x(2^x - 3^x)} \cdot \frac{2^x - 3^x}{x(1 + x \cdot 3^x)}}$$

因为

$$\begin{aligned} & \frac{2^x - 3^x}{x(1 + x \cdot 3^x)} \\ &= \frac{1}{1 + x \cdot 3^x} \cdot \left( \frac{2^x - 1}{x} - \frac{3^x - 1}{x} \right) \rightarrow \\ & \ln 2 - \ln 3 \rightarrow \ln \frac{2}{3} \quad (x \rightarrow 0), \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1 + x \cdot 2^x}{1 + x \cdot 3^x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{\ln \frac{2}{3}} = \frac{2}{3}.$$

\* ) 利用 541 题的结果.

$$546. \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{tg}^n \left( \frac{\pi}{4} + \frac{1}{n} \right).$$

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{tg}^n \left( \frac{\pi}{4} + \frac{1}{n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1 + \operatorname{tg} \frac{1}{n}}{1 - \operatorname{tg} \frac{1}{n}} \right]^n \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{\frac{1 - \operatorname{tg} \frac{1}{n}}{2 \operatorname{tg} \frac{1}{n}}} \right)^{\frac{1 - \operatorname{tg} \frac{1}{n}}{2 \operatorname{tg} \frac{1}{n}} \cdot \frac{2 \operatorname{tg} \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} \cdot \frac{1}{1 - \operatorname{tg} \frac{1}{n}}} = e^2.
 \end{aligned}$$

547.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\alpha x} - e^{\beta x}}{\sin \alpha x - \sin \beta x}$

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\alpha x} - e^{\beta x}}{\sin \alpha x - \sin \beta x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\beta x} (e^{(\alpha-\beta)x} - 1)}{2 \cos \frac{\alpha+\beta}{2} x \sin \frac{\alpha-\beta}{2} x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{(\alpha-\beta)x} - 1}{(\alpha-\beta)x} \cdot \frac{\frac{\alpha-\beta}{2} x}{\sin \frac{\alpha-\beta}{2} x} \cdot \frac{e^{\beta x}}{\cos \frac{\alpha+\beta}{2} x} \\
 &= \ln e^{*\circ} = 1.
 \end{aligned}$$

\* ) 利用 541 题的结果.

548.  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^\alpha - a^\alpha}{x^\beta - a^\beta} \quad (\alpha > 0)$ .

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \frac{x^\alpha - a^\alpha}{x^\beta - a^\beta} &= a^{\alpha-\beta} \cdot \frac{\left(\frac{x}{a}\right)^\alpha - 1}{\left(\frac{x}{a}\right)^\beta - 1} \\
 &= a^{\alpha-\beta} \cdot \frac{e^{\alpha \ln \frac{x}{a}} - 1}{\alpha \ln \frac{x}{a}} \cdot \frac{\beta \ln \frac{x}{a}}{e^{\beta \ln \frac{x}{a}} - 1} \cdot \frac{\alpha}{\beta}.
 \end{aligned}$$

当  $x \rightarrow a$  时,  $\ln \frac{x}{a} \rightarrow 0$ , 于是上式趋向  $\frac{\alpha}{\beta} a^{\alpha-\beta}$ ,

即

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{\beta} - a^{\beta}}{x^{\beta} - a^{\beta}} = \frac{a}{\beta} a^{a-\beta} \quad (\beta \neq 0).$$

549.  $\lim_{x \rightarrow b} \frac{a^x - a^b}{x - b} \quad (a > 0).$

解  $\lim_{x \rightarrow b} \frac{a^x - a^b}{x - b} = \lim_{x \rightarrow b} a^b \cdot \frac{a^{x-b} - 1}{x - b} = a^b \ln a^b.$

\* ) 利用 541 题的结果.

550.  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} + a^{x-h} - 2a^x}{h^2} \quad (a > 0).$

解  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} + a^{x-h} - 2a^x}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} a^x \cdot \frac{a^h + a^{-h} - 2}{h^2}$   
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^x}{a^h} \left( \frac{a^h - 1}{h} \right)^2 = a^x \ln^2 a^*$ .

\* ) 利用 541 题的结果.

551.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+a)^{x+a}(x+b)^{x+b}}{(x+a+b)^{2x+a+b}}.$

解  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+a)^{x+a}(x+b)^{x+b}}{(x+a+b)^{2x+a+b}}$   
 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{a}{x}\right)^{x+a} \left(1 + \frac{b}{x}\right)^{x+b}}{\left(1 + \frac{a+b}{x}\right)^{2x+a+b}}$   
 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{a}{x}\right)^{\frac{x}{a}a+a} \left(1 + \frac{b}{x}\right)^{\frac{x}{b}b+b}}{\left(1 + \frac{a+b}{x}\right)^{\frac{x}{a+b}[2(a+b)]+(a+b)}}$   
 $= \frac{e^a \cdot e^b}{e^{2(a+b)}} = e^{-(a+b)}.$

552.  $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt[n]{x} - 1) \quad (x > 0).$

$$\text{解} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt[n]{x} - 1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}} = \ln x.$$

\* ) 利用 541 题的结果.

$$553. \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (\sqrt[n]{x} - \sqrt[n+1]{x}) \quad (x > 0).$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (\sqrt[n]{x} - \sqrt[n+1]{x}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{\frac{1}{n}} - x^{\frac{1}{n+1}}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{\frac{1}{n+1}}(x^{\frac{1}{n(n+1)}} - 1)}{\frac{1}{n(n+1)} + \left( \frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^2+n} \right)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{\frac{1}{n(n+1)}} - 1}{\frac{1}{n(n+1)}} \cdot \\ &\quad \frac{x^{\frac{1}{n+1}} \cdot \frac{1}{n(n+1)}}{\frac{1}{n(n+1)} + \left( \frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^2+n} \right)} = \ln x. \end{aligned}$$

$$554. \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{a - 1 + \sqrt[n]{b}}{a} \right)^n \quad (a > 0, b > 0).$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{a - 1 + \sqrt[n]{b}}{a} \right)^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{\frac{a}{b^{\frac{1}{n}} - 1}} \right)^{\frac{a}{b^{\frac{1}{n}} - 1} \cdot \frac{b^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}} \cdot \frac{1}{a}} = e^{\frac{1}{a} \ln b} \\ &= \sqrt[a]{b}. \end{aligned}$$

$$555. \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n \quad (a > 0, b > 0).$$

$$\text{解} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} - 1 \right)^{\left( \frac{1}{\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} - 1} \right) \left( \frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} - 1 \right)} n \\ = e^{\frac{1}{2}(\ln a + \ln b)} = \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

\* ) 利用 541 题的结果.

$$556. \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}} \quad (a > 0, b > 0, c > 0).$$

解 利用 555 题的方法:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \left( 1 + \frac{a^x + b^x + c^x}{3} - 1 \right)^{\frac{1}{\frac{a^x + b^x + c^x}{3} - 1} \cdot \frac{a^x - 1 + b^x - 1 + c^x - 1}{3x}} \\ = \sqrt[3]{abc}.$$

$$557. \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{a^{x+1} + b^{x+1} + c^{x+1}}{a + b + c} \right)^{\frac{1}{x}} \quad (a > 0, b > 0, c > 0).$$

解 利用 541 题的结果, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^{x+1} + b^{x+1} + c^{x+1} - a - b - c}{x(a + b + c)} \\ = \frac{1}{a + b + c} \lim_{x \rightarrow 0} \left( a \cdot \frac{a^x - 1}{x} + b \cdot \frac{b^x - 1}{x} + c \cdot \frac{c^x - 1}{x} \right) \\ = \ln(a^a b^b c^c)^{\frac{1}{a+b+c}},$$

因而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{a^{x+1} + b^{x+1} + c^{x+1}}{a + b + c} \right)^{\frac{1}{x}} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \left( 1 + \frac{a^{x+1} + b^{x+1} + c^{x+1}}{a + b + c} - 1 \right)^{\left( \frac{1}{\frac{a^{x+1} + b^{x+1} + c^{x+1}}{a + b + c} - 1} \right) \cdot \frac{a^{x+1} + b^{x+1} + c^{x+1} - a - b - c}{x}} \\ = (a^a b^b c^c)^{\frac{1}{a+b+c}}.$$

$$558. \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{a^{x^2} - b^{x^2}}{a^x + b^x} \right)^{\frac{1}{x}} \quad (a > 0, b > 0).$$

$$\begin{aligned}
 & \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{a^{x^2} - b^{x^2}}{a^x + b^x} \right|^{\frac{1}{x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left( 1 + \frac{1}{\frac{a^x + b^x}{a^{x^2} + b^{x^2} - a^x - b^x}} \right)^{\frac{a^x + b^x}{a^{x^2} + b^{x^2} - a^x - b^x}} \\
 &\quad \cdot (x \left( \frac{a^{x^2}-1}{x^2} + \frac{b^{x^2}-1}{x^2} \right) - \frac{a^x-1}{x} - \frac{b^x-1}{x}) \cdot \frac{1}{a^x + b^x} \\
 &= e^{-\frac{1}{2}(\ln a - \ln b)} = \frac{1}{\sqrt{ab}}.
 \end{aligned}$$

$$559. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^{x^2} - b^{x^2}}{(a^x - b^x)^2} \quad (a > 0, b > 0).$$

$$\begin{aligned}
 & \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^{x^2} - b^{x^2}}{(a^x - b^x)^2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{a^{x^2} - 1}{x^2} - \frac{b^{x^2} - 1}{x^2} \right) \cdot \frac{1}{\left( \frac{a^x - 1}{x} - \frac{b^x - 1}{x} \right)^2} \\
 &= (\ln a - \ln b) \cdot \frac{1}{(\ln a - \ln b)^2} = \frac{1}{\ln a - \ln b} \\
 &= \left( \ln \frac{a}{b} \right)^{-1}.
 \end{aligned}$$

$$560. \lim_{x \rightarrow a} \frac{a^{x^a} - a^{x^a}}{a^x - x^a} \quad (a > 0).$$

$$\text{解} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{a^{x^a} - a^{x^a}}{a^x - x^a} = \lim_{x \rightarrow a} a^{x^a} \cdot \frac{a^{x^a - x^a} - 1}{a^x - x^a} = a^{x^a} \ln a.$$

$$561. \text{(a)} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1 + 3^x)}{\ln(1 + 2^x)}, \quad \text{(b)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + 3^x)}{\ln(1 + 2^x)}.$$

$$\begin{aligned}
 & \text{解} \quad \text{(a)} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1 + 3^x)}{\ln(1 + 2^x)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1 + 3^x)}{3^x} \cdot \frac{2^x}{\ln(1 + 2^x)} \cdot \left( \frac{2}{3} \right)^{-x}
 \end{aligned}$$

$$= 1 \cdot 1 \cdot 0^* = 0.$$

\* ) 利用 529 题的结果.

$$\begin{aligned} (6) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+3^x)}{\ln(1+2^x)} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln 3 + \ln(1+3^{-x})}{x \ln 2 + \ln(1+2^{-x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln 3 + \frac{1}{x} \cdot \ln(1+3^{-x})}{\ln 2 + \frac{1}{x} \cdot \ln(1+2^{-x})} = \frac{\ln 3}{\ln 2}. \end{aligned}$$

$$562. \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1+2^x) \ln \left( 1 + \frac{3}{x} \right).$$

$$\begin{aligned} \text{解 } \quad &\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1+2^x) \ln \left( 1 + \frac{3}{x} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left( 1 + \frac{3}{x} \right)}{\frac{3}{x}} \cdot \frac{x \ln 2 + \ln(2^{-x} + 1)}{\frac{x}{3}} \\ &= 3 \ln 2 = \ln 8. \end{aligned}$$

$$563. \lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \lg_x 2. \quad *$$

$$\begin{aligned} \text{解 } \quad &\lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \lg_x 2 = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{\ln x} \cdot \ln 2 \\ &= -\ln 2 \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\ln(1+(x-1))} = -\ln 2. \quad * \end{aligned}$$

\* ) 利用 529 题的结果.

564. 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{a^x} = 0 \quad (a > 1, n > 0).$$

证 当  $x \geq 1$  时, 存在唯一的正整数  $k$ , 使

$$k \leq x < k+1.$$

于是当  $n > 0$  时, 我们有

$$\frac{x^n}{a^x} < \frac{(k+1)^n}{a^k}$$

及

$$\frac{x^n}{a^x} > \frac{k^n}{a^{k+1}} = \frac{k^n}{a^k} \cdot \frac{1}{a}.$$

因为当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $k \rightarrow +\infty$ , 所以有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(k+1)^n}{a^k} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(k+1)^n}{a^{k+1}} \cdot a = 0 \cdot a^{(*)} = 0$$

及

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{k^n}{a^{k+1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{k^n}{a^k} \cdot \frac{1}{a} = 0 \cdot \frac{1}{a}^{(**)} = 0.$$

于是,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{a^x} = 0.$$

\* ) 利用 60 题的结果.

565. 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a x}{x^\epsilon} = 0 \quad (a > 1, \epsilon > 0).$$

证 设  $\log_a x = y$ , 则  $x = a^y$ , 且当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $y \rightarrow +\infty$ . 于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a x}{x^\epsilon} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y}{(a^y)^\epsilon} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left( \frac{y^{\frac{1}{\epsilon}}}{a^y} \right)^\epsilon = 0^{**},$$

即

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a x}{x^\epsilon} = 0.$$

\* ) 利用 564 题的结果.

求下列的极限:

566. (a)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2 + e^x)}{\ln(x^4 + e^{2x})}$ ; (b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + e^x)}{\ln(x^4 + e^{2x})}$ .

解 (a)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2 + e^x)}{\ln(x^4 + e^{2x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \ln(1 + x^2 e^{-x})}{2x + \ln(1 + x^4 e^{-2x})}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{\ln(1+x^2e^{-x})}{x^2e^{-x}} \cdot xe^{-x}}{2 + \frac{\ln(1+x^4e^{-2x})}{x^4e^{-2x}} \cdot x^3e^{-2x}} = \frac{1}{2},$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + e^x)}{\ln(x^4 + e^{2x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{\ln(1+x^2e^{-x})}{x^2e^{-x}}}{2 + \frac{\ln(1+x^4e^{-2x})}{x^4e^{-2x}}} = \frac{1}{2},$$

其中利用了结果

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n a^{-x} = 0 (n > 0, a > 1),$$

因而

$$x^2 e^{-x} \rightarrow 0 \text{ 及 } x^4 e^{-2x} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty).$$

$$567. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+xe^x)}{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}.$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+xe^x)}{\ln(x + \sqrt{1+x^2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\ln(1+xe^x)}{xe^x} \cdot xe^x}{\frac{1}{2}\ln(1+x^2) + \frac{\ln\left(1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)}{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}} \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^x \sqrt{1+x^2} = 1. \end{aligned}$$

$$568. \lim_{x \rightarrow \infty} [(x+2)\ln(x+2) - 2(x+1)\ln(x+1) + x\ln x].$$

$$\text{解} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} [(x+2)\ln(x+2) - 2(x+1)\ln(x+1) + x\ln x]$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \frac{(x+2)^{x+2} \cdot x^x}{(x+1)^{2x+2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \frac{\left(1 + \frac{2}{x}\right)^{\frac{x}{2} \cdot 2+2}}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2x+2}} \\
&= \ln \frac{e^2}{e^2} = 0.
\end{aligned}$$

569.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \ln(x \ln a) + \ln \left( \frac{\ln ax}{\ln \frac{x}{a}} \right) \right] \quad (a > 1).$

$$\begin{aligned}
&\text{解} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \ln(x \ln a) + \ln \left( \frac{\ln ax}{\ln \frac{x}{a}} \right) \right] \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left( \frac{\ln a + \ln x}{\ln x - \ln a} \right)^{\ln x + \ln(\ln a)} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left( 1 + \frac{2 \ln a}{\ln x - \ln a} \right)^{\frac{\ln x - \ln a}{2 \ln a} \cdot 2 \ln x \cdot \frac{\ln x + \ln(\ln a)}{\ln x - \ln a}} \\
&= \ln e^{\ln a^2} = \ln a^2.
\end{aligned}$$

570.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \ln \frac{x + \sqrt{x^2 + 1}}{x + \sqrt{x^2 - 1}} + \ln^2 \frac{x + 1}{x - 1} \right].$

$$\begin{aligned}
&\text{解} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \ln \frac{x + \sqrt{x^2 + 1}}{x + \sqrt{x^2 - 1}} + \ln^2 \frac{x + 1}{x - 1} \right] \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left( 1 + \frac{\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 1}}{x + \sqrt{x^2 - 1}} \right)}{\ln^2 \left( 1 + \frac{2}{x - 1} \right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{(x + \sqrt{x^2 - 1}) \cdot}{\sqrt{2}}}{\ln^2 \left( \left( 1 + \frac{2}{x - 1} \right)^{\frac{x-1}{2}} \right)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{\left\{ \frac{\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2-1}}{\sqrt{2}} \right\} \cdot \frac{2}{(x+\sqrt{x^2-1})(\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2-1})}}{\left( \frac{2}{x-1} \right)^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x-1)^2}{2(x+\sqrt{x^2-1})(\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2-1})} \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left( 1 - \frac{1}{x} \right)^2}{2 \left[ 1 + \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} \right] \left[ \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} \right]} \\
&= \frac{1}{8}.
\end{aligned}$$

571.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x\sin x} - 1}{e^{x^2} - 1}$

$$\begin{aligned}
&\text{解 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x\sin x} - 1}{e^{x^2} - 1} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x\sin x}{(e^{x^2} - 1)(\sqrt{1+x\sin x} + 1)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x}}{\frac{e^{x^2} - 1}{x^2}(1 + \sqrt{1+x\sin x})} = \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

572.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(xe^x) - \cos(xe^{-x})}{x^3}$ .

$$\begin{aligned}
&\text{解 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(xe^x) - \cos(xe^{-x})}{x^3} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2\sin \frac{x(e^x + e^{-x})}{2} \sin \frac{x(e^x - e^{-x})}{2}}{x^3}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -2 \lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{\sin \frac{x(e^x + e^{-x})}{2}}{\frac{x(e^x + e^{-x})}{2}} \cdot \frac{\sin \frac{x(e^x - e^{-x})}{2}}{\frac{x(e^x - e^{-x})}{2}} \cdot \frac{x^2(e^{4x} - 1)}{4x^3 e^{2x}} \right] \\
&= -2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{4x} - 1}{4x} \cdot \frac{1}{e^{2x}} = -2.
\end{aligned}$$

573.  $\lim_{x \rightarrow 0} (2e^{\frac{x}{x+1}} - 1)^{\frac{x^2+1}{x}}$

$$\begin{aligned}
&\text{解 } \lim_{x \rightarrow 0} (2e^{\frac{x}{x+1}} - 1)^{\frac{x^2+1}{x}} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ [1 + 2(e^{\frac{x}{x+1}} - 1)] 2e^{\frac{1}{x+1}-1} \right\}^{\frac{2(x^2+1)}{x+1} \cdot \frac{e^{\frac{x}{x+1}}-1}{\frac{x}{x+1}}} \\
&= e^2
\end{aligned}$$

574.  $\lim_{x \rightarrow 1} (2-x)^{\sec \frac{\pi x}{2}}$ .

$$\begin{aligned}
&\text{解 } \lim_{x \rightarrow 1} (2-x)^{\sec \frac{\pi x}{2}} \\
&= \lim_{x \rightarrow 1} [1 + (-x+1)]^{\frac{1}{1-x} \cdot \frac{\frac{\pi(x-1)}{2}}{\sin \frac{\pi(x-1)}{2}} \cdot \frac{2}{\pi}} = e^{\frac{2}{\pi}}.
\end{aligned}$$

575.  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin^{\alpha+\beta} x}{\sqrt{(1-\sin^\alpha x)(1-\sin^\beta x)}} \quad (\alpha > 0, \beta > 0).$

$$\begin{aligned}
&\text{解 } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin^{\alpha+\beta} x}{\sqrt{(1-\sin^\alpha x)(1-\sin^\beta x)}} \\
&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - e^{(\alpha+\beta) \cdot \ln \sin x}}{\sqrt{(1 - e^{\alpha \cdot \ln \sin x})(1 - e^{\beta \cdot \ln \sin x})}} \\
&= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left( \frac{1 - e^{(\alpha+\beta) \cdot \ln \sin x}}{(\alpha+\beta) \ln \sin x} \right) \cdot \left( \frac{\alpha \cdot \ln \sin x}{1 - e^{\alpha \cdot \ln \sin x}} \right)^{\frac{1}{2}} \\
&\quad \cdot \left( \frac{\beta \cdot \ln \sin x}{1 - e^{\beta \cdot \ln \sin x}} \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left( \frac{(\alpha+\beta) \cdot \ln \sin x}{\sqrt{\alpha\beta} \cdot \ln \sin x} \right) = \frac{\alpha+\beta}{\sqrt{\alpha\beta}}.
\end{aligned}$$

注 其中,  $x$  在  $\frac{\pi}{2}$  的附近变化, 故  $\sin x > 0$ .

576.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{sh}^2 x}{\ln(\operatorname{ch} 3x)}$  (参见 340 题).

$$\begin{aligned} \text{解 } & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sh}^2 x}{\ln(\operatorname{ch} 3x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{(e^{2x}-1)^2}{4e^{2x}}}{\ln \left[ 1 + \frac{1}{2} (e^{\frac{3}{2}x} - e^{-\frac{3}{2}x})^2 \right]} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{e^{2x}-1}{2x} \right)^2 \cdot \frac{\frac{1}{2} (e^{\frac{3}{2}x} - e^{-\frac{3}{2}x})^2 \cdot e^x}{\ln \left[ 1 + \frac{1}{2} (e^{\frac{3}{2}x} - e^{-\frac{3}{2}x})^2 \right]} \\ &\quad \cdot \left( \frac{3x}{e^{3x}-1} \right)^2 \cdot \frac{2}{9} = \frac{2}{9}. \end{aligned}$$

577.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{sh} \sqrt{x^2+x} - \operatorname{sh} \sqrt{x^2-x}}{\operatorname{ch} x}$ .

$$\begin{aligned} \text{解 } & \operatorname{sh} \sqrt{x^2+x} - \operatorname{sh} \sqrt{x^2-x} \\ &= 2 \operatorname{sh} \frac{\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2-x}}{2} \cdot \operatorname{ch} \frac{\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x^2-x}}{2}, \end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2-x} &= \frac{2x}{\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x^2-x}} \\ &= \frac{2}{\sqrt{1+\frac{1}{x}} + \sqrt{1-\frac{1}{x}}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1, \end{aligned}$$

$$\frac{\operatorname{ch} \frac{1}{2} (\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x^2-x})}{\operatorname{ch} x}$$

$$= \frac{e^{\frac{\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2-x}}{2}} + e^{-\frac{\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2-x}}{2}}}{e^x + e^{-x}} \rightarrow 1,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sh} \sqrt{x^2+x} - \operatorname{sh} \sqrt{x^2-x}}{\operatorname{ch} x} = 2 \operatorname{sh} \frac{1}{2}.$$

$$578. \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln \operatorname{ch} x)$$

$$\text{解 } \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln \operatorname{ch} x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( x - \ln \frac{e^{2x} + 1}{2e^x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [2x + \ln 2 - \ln(1 + e^{2x})] \\ = \lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln 2 - \ln(e^{-2x} + 1)] = \ln 2.$$

$$579. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 2x} - e^{\sin x}}{\operatorname{th} x}.$$

$$\text{解 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 2x} - e^{\sin x}}{\operatorname{th} x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{\sin 2x} - e^{\sin x})(e^{2x} + 1)}{e^{2x} - 1} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left( \frac{e^{\sin 2x} - 1}{\sin 2x} \cdot \frac{\sin 2x}{2x} - \frac{e^{\sin x} - 1}{\sin x} \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{2} \right) (e^{2x} + 1)}{\frac{e^{2x} - 1}{2x}} \\ = \frac{\left( 1 - \frac{1}{2} \right) 2}{1} = 1.$$

$$580. \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\operatorname{ch} \frac{\pi}{n}}{\cos \frac{\pi}{n}} \right)^{\pi^2}.$$

$$\text{解 } \left( \frac{\operatorname{ch} \frac{\pi}{n}}{\cos \frac{\pi}{n}} \right)^{\pi^2} = \left[ \frac{e^{\frac{\pi}{n}} + e^{-\frac{\pi}{n}}}{2 \cos \frac{\pi}{n}} \right]^{\pi^2}$$

$$= \left[ 1 + \frac{1}{\frac{2\cos \frac{\pi}{n}}{e^{\frac{\pi}{n}} + e^{-\frac{\pi}{n}} - 2\cos \frac{\pi}{n}}} \right]^{\frac{2\cos \frac{\pi}{n}}{e^{\frac{\pi}{n}} + e^{-\frac{\pi}{n}} - 2\cos \frac{\pi}{n}}} \cdot \frac{n^2 \left( e^{\frac{\pi}{n}} + e^{-\frac{\pi}{n}} - 2\cos \frac{\pi}{n} \right)}{2\cos \frac{\pi}{n}},$$

因为

$$\begin{aligned} & n^2 \left( e^{\frac{\pi}{n}} + e^{-\frac{\pi}{n}} - 2\cos \frac{\pi}{n} \right) \\ &= n^2 \left[ \left( e^{\frac{\pi}{2n}} - e^{-\frac{\pi}{2n}} \right)^2 + 2 \left( 1 - \cos \frac{\pi}{n} \right) \right] \\ &= n^2 \left[ \left( e^{\frac{\pi}{2n}} - e^{-\frac{\pi}{2n}} \right)^2 + 4 \sin^2 \frac{\pi}{2n} \right] \\ &= \left[ \frac{e^{\frac{\pi}{2n}} - 1}{\frac{\pi}{2n}} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{e^{-\frac{\pi}{2n}} - 1}{-\frac{\pi}{2n}} \cdot \frac{\pi}{2} \right]^2 + \pi^2 \left[ \frac{\sin \frac{\pi}{2n}}{\frac{\pi}{2n}} \right]^2 \\ &\longrightarrow 2\pi^2 \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\operatorname{ch} \frac{\pi}{n}}{\cos \frac{\pi}{n}} \right)^n = e^{\pi^2}.$$

581.  $\lim_{x \rightarrow \infty} \arcsin \frac{1-x}{1+x}.$

解  $\lim_{x \rightarrow \infty} \arcsin \frac{1-x}{1+x} = \arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}.$

582.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arccos(\sqrt{x^2+x}-x).$

解  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arccos(\sqrt{x^2+x}-x)$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \arccos \frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x} = \arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}.$$

583.  $\lim_{x \rightarrow 2} \operatorname{arcctg} \frac{x-4}{(x-2)^2}.$

解  $\lim_{x \rightarrow 2} \operatorname{arcctg} \frac{x-4}{(x-2)^2} = -\frac{\pi}{2}.$

584.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arcctg} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$

解  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arcctg} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \operatorname{arcctg}(-1) = -\frac{3}{4}\pi.$

585.  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg}(x+h) - \operatorname{arctg} x}{h}.$

解  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg}(x+h) - \operatorname{arctg} x}{h}$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left[ \frac{\operatorname{arctg} \frac{h}{1+x(x+h)}}{\frac{h}{1+x(x+h)}} \cdot \frac{1}{1+x(x+h)} \right]$$

$$= \frac{1}{1+x^2}$$

\* ) 其中利用了结果:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1.$

586.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{1+x}{1-x}}{\operatorname{arctg}(1+x) - \operatorname{arctg}(1-x)}.$

解  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{1+x}{1-x}}{\operatorname{arctg}(1+x) - \operatorname{arctg}(1-x)}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{\ln \left( 1 + \frac{2x}{1-x} \right)}{\frac{2x}{1-x}} \cdot \frac{\frac{2x}{1-x}}{\operatorname{arctg} \frac{2x}{1-x}} \cdot \frac{2x}{1-x} \right] = 2.$$

587.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ n \operatorname{arcctg} \frac{1}{n(x^2+1)+x} \cdot \operatorname{tg}^n \left( \frac{\pi}{4} + \frac{x}{2n} \right) \right].$

$$\begin{aligned}
 & \text{解} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ n \operatorname{arctg} \frac{1}{n(x^2+1)+x} \cdot \operatorname{tg} \left( \frac{\pi}{4} + \frac{x}{2n} \right) \right] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{\operatorname{arctg} \frac{1}{n(x^2+1)+x}}{\frac{1}{n(x^2+1)+x}} \cdot \frac{n}{n(x^2+1)+x} \right. \\
 &\quad \left. \cdot \left( 1 + \frac{1}{\frac{1 - \operatorname{tg} \frac{x}{2n}}{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2n}}} \right)^{\frac{1 - \operatorname{tg} \frac{x}{2n}}{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2n}} \cdot \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2n}}{\frac{x}{2n}} \cdot \frac{x}{1 - \operatorname{tg} \frac{x}{2n}}} \right] = \frac{e^x}{1+x^2}.
 \end{aligned}$$

$$588. \lim_{x \rightarrow \infty} x \left( \frac{\pi}{4} - \operatorname{arctg} \frac{x}{x+1} \right).$$

$$\begin{aligned}
 & \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x \left( \frac{\pi}{4} - \operatorname{arctg} \frac{x}{x+1} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \operatorname{arctg} \frac{1}{2x+1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{arctg} \frac{1}{2x+1}}{\frac{1}{2x+1}} \cdot \frac{x}{2x+1} = \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

$$589. \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left( \frac{\pi}{2} - \operatorname{arcsin} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \right).$$

$$\begin{aligned}
 & \text{解} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left( \frac{\pi}{2} - \operatorname{arcsin} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \operatorname{arcsin} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{arcsin} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}}{\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = 1^{*).
 \end{aligned}$$

\* ) 其中利用了结果:  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arcsin} x}{x} = 1$ .

$$590. \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ 1 + \frac{(-1)^n}{n} \right]^{\csc(\pi \sqrt{1+n^2})}$$

$$\begin{aligned} & \text{解 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ 1 + \frac{(-1)^n}{n} \right]^{\csc(\pi \sqrt{1+n^2})} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ 1 + \frac{(-1)^n}{n} \right]^{\frac{n}{(-1)^n} \cdot \frac{(-1)^n}{\sin(\pi \sqrt{1+n^2})}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ 1 + \frac{(-1)^n}{n} \right]^{\frac{1}{(-1)^n} \cdot \frac{-1}{\sin(n\pi - \pi \sqrt{1+n^2})}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ 1 + \frac{(-1)^n}{n} \right]^{\frac{1}{(-1)^n} \cdot \frac{n\pi - \pi \sqrt{1+n^2}}{\sin(n\pi - \pi \sqrt{1+n^2})}} \\ &\quad \cdot \frac{1}{n(\pi \sqrt{1+n^2} - n\pi)} \\ &= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+1+n}}{n(\pi^2+1-n^2)}} \\ &= e^{\frac{2}{\pi}} \quad (n\pi - \pi \sqrt{1+n^2} \rightarrow 0). \end{aligned}$$

$$591. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{100}} e^{-\frac{1}{x^2}}.$$

解 设  $y = \frac{1}{x}$ , 则

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^{100}} e^{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{y^{100}}{e^{y^2}} = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{(y^2)^{50}}{e^{y^2}} = 0^+.$$

\* ) 利用 564 题的结果.

$$592. \lim_{x \rightarrow +0} x \ln x.$$

解 设  $y = \frac{1}{x}$ , 则

$$\lim_{x \rightarrow +0} x \ln x = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{-\ln y}{y} = 0^+.$$

\* ) 利用 565 题的结果.

$$593. (a) \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2+x} - x); \quad (b) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+x} - x).$$

解 (a)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2+x} - x) = +\infty;$

$$(b) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+x} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2+x} + x} = \frac{1}{2}.$$

$$594. (a) \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{1-x+x^2});$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{1-x+x^2}.$$

解 (a)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{1-x+x^2})$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{\sqrt{1+x+x^2} + \sqrt{1-x+x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2}{\sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + 1} + \sqrt{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} + 1}} \stackrel{*)}{=} -1 \end{aligned}$$

\* ) 当  $x \rightarrow -\infty$  时,  $x = -\sqrt{x^2}$ .

$$(b) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{1-x+x^2})$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + 1} + \sqrt{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} + 1}} \stackrel{*)}{=} 1. \end{aligned}$$

\* ) 当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $x = \sqrt{x^2}$ .

$$595. (a) \lim_{x \rightarrow 1^-} \operatorname{arctg} \frac{1}{1-x}; \quad (b) \lim_{x \rightarrow 1^+} \operatorname{arctg} \frac{1}{1-x}.$$

解 (a)  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \operatorname{arctg} \frac{1}{1-x} = \frac{\pi}{2};$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 1^+} \operatorname{arctg} \frac{1}{1-x} = -\frac{\pi}{2}.$$

$$596. (a) \lim_{x \rightarrow -0} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}}; \quad (b) \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}}.$$

解 (a)  $\lim_{x \rightarrow -0} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}} = 1;$

(b)  $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}} = 0.$

597. (a)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1+e^x)}{x};$  (b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+e^x)}{x}.$

解 (a)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1+e^x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[ \frac{\ln(1+e^x)}{e^x} \cdot \frac{e^x}{x} \right] = 0;$

(b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+e^x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ 1 + \frac{\ln(e^{-x}+1)}{x} \right] = 1.$

598. 证明:

(a) 当  $x \rightarrow -\infty$  时,  $\frac{2x}{1+x} \rightarrow 2+0;$

(b) 当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $\frac{2x}{1+x} \rightarrow 2-0.$

证 (a) 当  $x < 0$  时, 及当  $|x|$  充分大以后,

$$\frac{2x}{1+x} > 2.$$

于是

当  $x \rightarrow -\infty$  时,  $\frac{2x}{1+x} \rightarrow 2+0;$

(b) 当  $x > 0$  时,

$$0 < \frac{2x}{1+x} < 2.$$

于是,

当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $\frac{2x}{1+x} \rightarrow 2-0.$

599. 证明:

(a) 当  $x \rightarrow -0$  时,  $2^x \rightarrow 1-0;$

(b) 当  $x \rightarrow +0$  时,  $2^x \rightarrow 1+0.$

证 (a) 当  $x < 0$  时,

$$0 < 2^x < 1.$$

于是,

当  $x \rightarrow -0$  时,  $2^x \rightarrow 1 - 0$ ;

(b) 当  $x > 0$  时,

$$2^x > 1.$$

于是,

当  $x \rightarrow +0$  时,  $2^x \rightarrow 1 + 0$ .

600. 设  $f(x) = x + [x^2]$ , 求  $f(1), f(1-0), f(1+0)$ .

解  $f(1) = 2$ ;

$$f(1-0) = \lim_{x \rightarrow 1-0} (x + [x^2]) = 1 + 0 = 1;$$

$$f(1+0) = \lim_{x \rightarrow 1+0} (x + [x^2]) = 1 + 1 = 2.$$

601. 设  $f(x) = \operatorname{sgn}(\sin \pi x)$ , 求  $f(n), f(n-0), f(n+0)$  ( $n = 0, \pm 1, \dots$ ).

解  $f(n) = 0$ ;

$$f(n-0) = \lim_{x \rightarrow n-0} \operatorname{sgn}(\sin \pi x) = (-1)^{n-1};$$

$$f(n+0) = \lim_{x \rightarrow n+0} \operatorname{sgn}(\sin \pi x) = (-1)^n.$$

求:

602.  $\lim_{x \rightarrow 0} x \sqrt{\cos \frac{1}{x}}$ .

解 因为  $\sqrt{\cos \frac{1}{x}}$  为有界函数, 所以,

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sqrt{\cos \frac{1}{x}} = 0.$$

603.  $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[ \frac{1}{x} \right]$ .

解 因为

$$\frac{1}{x} - 1 < \left[ \frac{1}{x} \right] \leq \frac{1}{x} \quad (x \neq 0),$$

当  $x > 0$  时

$$1 - x < x \left[ \frac{1}{x} \right] \leq 1,$$

当  $x < 0$  时,

$$1 - x > x \left[ \frac{1}{x} \right] \geq 1,$$

于是,

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \left[ \frac{1}{x} \right] = 1.$$

604.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi \sqrt{n^2 + 1})$ .

解  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi \sqrt{n^2 + 1})$   
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \sin(\pi \sqrt{n^2 + 1} - n\pi)$   
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \sin \frac{\pi}{\pi \sqrt{n^2 + 1} + n\pi} = 0.$

605.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2 + n})$ .

解  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2 + n})$   
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} [1 - \cos(2\pi \sqrt{n^2 + n})]$   
 $= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \{1 - \cos[2\pi(\sqrt{n^2 + n} - n)]\} = 1.$

606.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sin \sin \cdots \sin}_n x$ .

解 先设  $0 \leq x \leq \pi$ , 这时,  $0 \leq \sin x \leq x$ ,

$$0 \leq \sin(\sin x) \leq \sin x,$$

依次类推. 用数学归纳法, 即可证得

$$0 \leq \underbrace{\sin \sin \cdots \sin}_{n \uparrow} x \leq \underbrace{\sin \sin \cdots \sin}_{n \rightarrow \infty} x,$$

这说明  $\underbrace{\sin \sin \cdots \sin}_{n \uparrow} x$  随着  $n$  的增大而单调减少, 于是由其有界性知极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sin \sin \cdots \sin}_{n \uparrow} x = \mu$$

存在有限, 且  $0 \leq \mu \leq 1$ , 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sin \sin \cdots \sin}_{n \uparrow} x = \sin(\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sin \sin \cdots \sin}_{n \uparrow} x)$$

即

$$\sin \mu = \mu,$$

故

$$\mu = 0.$$

同法可证, 当  $\pi < x \leq 2\pi$  时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sin \sin \cdots \sin}_{n \uparrow} x = 0.$$

再利用  $\sin x$  的周期性(周期为  $2\pi$ ), 得知对任一  $x$  值, 均有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sin \sin \cdots \sin}_{n \uparrow} x = 0.$$

607. 设  $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = A$  及  $\lim_{x \rightarrow 1} \psi(x) = B$ , 由此是否可推出

$$\lim_{x \rightarrow 2} \psi(\varphi(x)) = B?$$

研究这个例子: 当  $x = \frac{p}{q}$  (其中  $p$  和  $q$  是互质的整数) 时,  $\varphi(x) = \frac{1}{q}$ ; 当  $x$  为无理数时,  $\varphi(x) = 0$ ; 当  $x \neq 0$  时,  $\psi(x) = 1$ ; 当  $x = 0$  时,  $\psi(x) = 0$ ; 并且  $x \rightarrow 0$ .

解 不一定, 例如对于函数

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & \text{当 } x = \frac{p}{q} \text{ (其中 } p \text{ 和 } q \text{ 互质)} \text{ 时;} \\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数时.} \end{cases}$$

及

$$\psi(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \neq 0 \text{ 时;} \\ 0, & \text{当 } x = 0 \text{ 时.} \end{cases}$$

有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = 0 (= A)$$

及

$$\lim_{x \rightarrow 0} \psi(x) = 1,$$

但是, 极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \psi(\varphi(x))$$

却不存在. 事实上, 当  $x$  以一串无理数列  $x_n$  趋近于零时, 有  $\varphi(x_n) = 0$ , 因此  $\psi(\varphi(x_n)) = 0 (n=1, 2, \dots)$ ; 而当  $x$  以一串有理数列  $x'_n$  趋近于零时,  $\varphi(x'_n) \neq 0$ , 因此,  $\psi(\varphi(x'_n)) = 1 (n=1, 2, \dots)$ . 由此可知, 当  $x \rightarrow 0$  时, 极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \psi(\varphi(x))$$

不存在.

608. 证明哥西定理: 若函数  $f(x)$  定义于区间  $(a, +\infty)$  上, 且

在每一个右端点的邻域内,  $f(x)$  是单值的.

$$|f(x+1) - f(x) - A| < \frac{\epsilon}{3}.$$

现设  $x > X_0 + 1$ . 于是, 恰有一个正整数  $n$  (依赖于  $x$ ), 满足  $n \leq x - X_0 < n + 1$ . 令  $\tau = x - X_0 - n$ , 则  $0 \leq \tau < 1$ ,  $x = X_0 + \tau + n$ . 我们有

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{x} - A &= \frac{n}{x} \left[ \frac{f(x) - f(X_0 + \tau) - A}{n} \right] + \frac{f(X_0 + \tau)}{x} \\ &\quad - \frac{(X_0 + \tau)A}{x}. \end{aligned}$$

显然

$$\begin{aligned} &\left| \frac{n}{x} \left[ \frac{f(x) - f(X_0 + \tau)}{n} - A \right] \right| \\ &\leq \left| \frac{f(X_0 + \tau + n) - f(X_0 + \tau)}{n} - A \right| \\ &= \frac{1}{n} \left| \sum_{k=1}^n [f(X_0 + \tau + k) - f(X_0 + \tau + k - 1) - A] \right| \\ &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |f(X_0 + \tau + k) - f(X_0 + \tau + k - 1) - A| \\ &< \frac{1}{n} \cdot \frac{n\epsilon}{3} = \frac{\epsilon}{3}. \end{aligned}$$

由假定,  $f(x)$  在  $X_0 \leq x < X_0 + 1$  上有界, 故存在正数  $X_1$ , 使当  $x > X_1$  时, 恒有

$$\left| \frac{f(X_0 + \tau)}{x} \right| < \frac{\epsilon}{3} \quad (0 \leq \tau < 1);$$

另外, 显然存在正数  $X_2$ , 使当  $x > X_2$  时, 恒有

$$\left| \frac{(X_0 + 1)A}{x} \right| < \frac{\epsilon}{3}.$$

令  $X = \max\{X_0 + 1, X_1, X_2\}$ . 于是, 当  $x > X$  时, 必有

$$\left| \frac{f(x)}{x} - A \right| < \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon.$$

由此可知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = A.$$

故(a)获证.

(b)由假定,  $f(x) \geq c > 0$ . 记  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1)}{f(x)} = A'$ . 显然  $A' \geq 0$ . 下证  $A' > 0$ . 事实上, 若  $A' = 0$ , 则存在正数  $X_0$ , 使当  $x \geq X_0$  时, 必  $0 < \frac{f(x+1)}{f(x)} < \frac{1}{2}$ . 于是

$$0 < \frac{f(X_0+n)}{f(X_0)} = \frac{f(X_0+n)}{f(X_0+n-1)} \cdot \frac{f(X_0+n-1)}{f(X_0+n-2)} \cdots \\ \cdot \frac{f(X_0+1)}{f(X_0)} < \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

由此可知  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(X_0+n) = 0$ , 此显然与  $f(x) \geq c > 0$  矛盾, 因此, 有  $A' > 0$ .

由于  $f(x) \geq c > 0$  且  $f(x)$  在每个有穷区间  $(a, b)$  内有界, 故函数  $\ln f(x)$  在每个有穷区间  $(a, b)$  内也有界, 并且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln f(x+1) - \ln f(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{f(x+1)}{f(x)} = \\ \ln A'.$$

于是, 将(a)的结果用于函数  $\ln f(x)$ , 即知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln f(x)}{x} = \ln A'.$$

故有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)]^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [e^{\ln f(x)}]^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{\ln f(x)}{x}} \\ = e^{\ln A'} = A'.$$

证毕.

609. 证明若:(1) 函数  $f(x)$  定义于域  $x > a$  内; (2) 在每一个有

限的域  $a < x < b$  内是有界的；(3)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)] = +\infty$  (或  $-\infty$ )，<sup>\*</sup>则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty \text{ (或 } -\infty).$$

证 只要证明  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)] = +\infty$  的情形，这时要证  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$  (对于  $-\infty$  的情形，只要考虑函数  $-f(x)$  即可归结为  $+\infty$  的情形). 任给  $G > 0$ . 必存在正数  $X_0 > a$ ，使当  $x \geq X_0$  时，恒有

$$f(x+1) - f(x) > 4G.$$

现设  $x > 2(X_0 + 1)$ . 仿 608 题(a)之证，恰有一个正整数  $n$  (依赖于  $x$ )，满足  $n \leq x - X_0 < n + 1$ . 令  $\tau = x - X_0 - n$ . 则  $0 \leq \tau < 1$ ,  $x = X_0 + \tau + n$ . 由于  $n + 1 > x - X_0 > X_0 + 2$ , 故  $n > X_0 + 1 > X_0 + \tau$ . 从而  $2n > x$ , 即

$$\frac{n}{x} > \frac{1}{2}.$$

又，我们有

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{n}{x} + \frac{f(x) - f(X_0 + \tau)}{n} + \frac{f(X_0 + \tau)}{x};$$

显然

$$\begin{aligned} & \frac{f(x) - f(X_0 + \tau)}{n} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n [f(X_0 + \tau + k) - f(X_0 + \tau + k - 1)] \\ &> \frac{1}{n} \cdot 4nG = 4G, \end{aligned}$$

故

$$\frac{n}{x} + \frac{f(x) - f(X_0 + \tau)}{n} > 2G.$$

由假定,  $f(x)$  在  $X_0 \leq x < X_0 + 1$  上有界, 故存在正数  $X_1$ , 使当  $x > X_1$  时, 恒有

$$\left| \frac{f(X_0 + \tau)}{\tau} \right| < G.$$

令  $X = \max\{2(X_0 + 1), X_1\}$ , 则当  $x > X$  时, 恒有

$$\frac{f(x)}{x} > G.$$

由此可知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty.$$

证毕.

\* ) 原题条件(3)误写为  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)] = \infty$ ,

结论误写为  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \infty$ . 例如, 按下式定义  $[0, +\infty)$  上的函数  $f(x)$ :

$$f(x) = \begin{cases} 2n, & \text{当 } 2n \leq x < 2n+1 \text{ 时}; \\ 0, & \text{当 } 2n+1 \leq x < 2n+2 \text{ 时}. \end{cases} \quad (=0, 1, 2, \dots).$$

则显然  $f(x)$  满足原题的条件(1)和(2)(这时  $a=0$ ), 并且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)] = \infty$ ; 但显然  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \neq \infty$ (实际  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$  不存在,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$ ).

610. 证明, 若:(1) 函数  $f(x)$  定义于域  $x > a$  内; (2) 在每一个有限的域  $a < x < b$  内是有界的; (3) 存在着有限的或无穷的(带确定符号的无穷, 即  $+\infty$  和  $-\infty$ )<sup>\*\*</sup> 极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1) - f(x)}{x^a} = l,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^{a+1}} = \frac{l}{a+1}.$$

证 先证一条一般性的定理(Stolz 定理在函数情形的推广):若(1)函数  $f(x)$  与  $g(x)$  都定义于域  $x > a$  内;(2)  $f(x)$  与  $g(x)$  在每一个有限域  $a < x < b$  内有界,并且  $g(x)$  当  $x \geq a$  时满足  $g(x+1) > g(x)$  且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ ; (3) 存在极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1) - f(x)}{g(x+1) - g(x)} = l$$

$(l$  为有限数或为  $+\infty$  或为  $-\infty$ );

则必

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l.$$

证如下:

先设  $l$  为有限数. 任给  $\epsilon > 0$ , 存在正数  $X_0 > a$ , 使当  $x \geq X_0$  时, 恒有

$$\left| \frac{f(x+1) - f(x)}{g(x+1) - g(x)} - l \right| < \frac{\epsilon}{2}.$$

现设  $x > X_0 + 1$ . 于是, 恰有一个正整数  $n$  (依赖于  $x$ ), 使  $n \leq x - X_0 \leq n + 1$ . 令  $\tau = x - X_0 - n$ , 则  $0 \leq \tau < 1$ ,  $x = X_0 + \tau + n$ . 我们有

$$\begin{aligned} & \frac{f(x) - f(X_0 + \tau)}{g(x) - g(X_0 + \tau)} - l \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{g(X_0 + \tau + k) - g(X_0 + \tau + k - 1)}{g(x) - g(X_0 + \tau)} \\ & \quad \cdot \left[ \frac{f(X_0 + \tau + k) - f(X_0 + \tau + k - 1)}{g(X_0 + \tau + k) - g(X_0 + \tau + k - 1)} - l \right], \end{aligned}$$

而  $\left| \frac{f(X_0 + \tau + k) - f(X_0 + \tau + k - 1)}{g(X_0 + \tau + k) - g(X_0 + \tau + k - 1)} - l \right| < \frac{\epsilon}{2}$

( $k=1, 2, \dots, n$ ),

又由于

$$\begin{aligned} g(x) &= g(X_0 + \tau + n) > g(X_0 + \tau + n - 1) \\ &> g(X_0 + \tau + n - 2) > \cdots > g(X_0 + \tau), \end{aligned}$$

从而

$$\frac{g(X_0 + \tau + k) - g(X_0 + \tau + k - 1)}{g(x) - g(X_0 + \tau)} > 0$$
$$(k=1, 2, \dots, n);$$

由此可知

$$\begin{aligned} &\left| \frac{f(x) - f(X_0 + \tau)}{g(x) - g(X_0 + \tau)} - l \right| \\ &< \frac{\epsilon}{2} \sum_{k=1}^n \frac{g(X_0 + \tau + k) - g(X_0 + \tau + k - 1)}{g(x) - g(X_0 + \tau)} = \frac{\epsilon}{2}. \end{aligned}$$

容易直接验证等式

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{g(x)} - l &= \left[ 1 - \frac{g(X_0 + \tau)}{g(x)} \right] \cdot \left[ \frac{f(x) - f(X_0 + \tau)}{g(x) - g(X_0 + \tau)} - l \right] \\ &\quad + \frac{f(X_0 + \tau) - lg(X_0 + \tau)}{g(x)}. \end{aligned}$$

由于  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ , 并且  $f(x)$  与  $g(x)$  都在  $X_0 \leq x < X_0 + 1$  上有界, 故必有正数  $X_1 > a$  存在, 使当  $x > X_1$  时, 恒有

$$\left| \frac{g(X_0 + \tau)}{g(x)} \right| < \frac{1}{2}, \quad \left| \frac{f(X_0 + \tau) - lg(X_0 + \tau)}{g(x)} \right| > \frac{\epsilon}{4}.$$

令  $X = \max\{X_0 + 1, X_1\}$ . 于是, 当  $x > X$  时, 恒有

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - l \right| < \frac{3}{2} \cdot \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{4} = \epsilon.$$

由此可知  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l$ .  $l$  为有限数时获证.

下设  $t=+\infty$  (若  $t=-\infty$ , 则考虑函数  $-f(x)$  即可化为  $t=+\infty$  的情形). 任给  $G>0$ . 存在正数  $X_0>a$ , 使当  $x\geqslant X_0$  时, 恒有

$$\frac{f(x+1)-f(x)}{g(x+1)-g(x)}>4G.$$

当  $x>X_0+1$  时, 仿前一段之证, 有

$$\begin{aligned} \frac{f(x)-f(X_0+\tau)}{g(x)-g(X_0+\tau)} &= \sum_{k=1}^n \frac{g(X_0+\tau+k)-g(X_0+\tau+k-1)}{g(x)-g(X_0+\tau)} \\ &\cdot \frac{f(X_0+\tau+k)-f(X_0+\tau+k-1)}{g(X_0+\tau+k)-g(X_0+\tau+k-1)} \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} &\frac{f(x)-f(X_0+\tau)}{g(x)-g(X_0+\tau)} \\ &> 4G \sum_{k=1}^n \frac{g(X_0+\tau+k)-g(X_0+\tau+k-1)}{g(x)-g(X_0+\tau)} \\ &= 4G. \end{aligned}$$

易知

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{g(x)} &= \left[ 1 - \frac{g(X_0+\tau)}{g(x)} \right] \cdot \frac{f(x)-f(X_0+\tau)}{g(x)-g(X_0+\tau)} \\ &+ \frac{f(X_0+\tau)}{g(x)}. \end{aligned}$$

根据  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$  以及  $f(x), g(x)$  在  $X_0 \leqslant x < X_0+1$  上的有界性, 可取正数  $X_1>a$ , 使当  $x>X_1$  时, 恒有

$$\left| \frac{g(X_0+\tau)}{g(x)} \right| < \frac{1}{2}, \quad \left| \frac{f(X_0+\tau)}{g(x)} \right| < G.$$

令  $X=\max\{X_0+1, X_1\}$ . 于是, 当  $x>X$  时, 恒有

$$\frac{f(x)}{g(x)} > \frac{1}{2} \cdot 4G - G = G.$$

由此可知  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$ . 所述一般性定理获证.

现在我们应用此一般定理来证明本题, 在一般性定理中取  $g(x) = x^{n+1}$ . 显然此  $g(x)$  满足一般性定理的条件, 并且

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1) - f(x)}{g(x+1) - g(x)} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1) - f(x)}{(x+1)^{n+1} - x^{n+1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1) - f(x)}{(n+1)x^n + \frac{1}{2}(n+1)nx^{n-1} + \dots + (n+1)x + 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1) - f(x)}{x^n} \\ &\cdot \frac{1}{(x+1) + \frac{1}{2}(n+1)nx^{-1} + \dots + (n+1)x^{-n+1} + x^{-n}} \\ &= \frac{l}{n+1}. \end{aligned}$$

由此, 根据此一般性定理, 即得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^{n+1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{l}{n+1}.$$

证毕.

\* ) 原题所说的无穷, 必须是带确定符号的无穷, 即  $+\infty$  或  $-\infty$ ; 参看 609 题末尾加的注.

注. 608 题的(a)和 609 题可直接从上述一般性定理推出. 实际上, 只需令  $g(x) = x$ , 由

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1) - f(x)}{g(x+1) - g(x)} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1) - f(x)}{(x+1) - x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)] \end{aligned}$$

即知。

611. 证明：(a)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$ ；

(b)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}\right) = e^x$ .

证 (a) 当  $x=0$  时是显然的；当  $x \neq 0$  时，令  $y_n = \frac{n}{x}$ ，由 71 题的结果，得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{y_n}\right)^{y_n \cdot x} = e^x;$$

(b) 当  $x=0$  时是显然的，我们先讨论  $x > 0$  的情形。  
由牛顿二项式定理知

$$\begin{aligned} & \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \cdots + \frac{x^n}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right) \\ &\leq 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}. \end{aligned}$$

另一方面，当  $m > n$  时有

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{x}{m}\right)^m &> 1 + x + \frac{x^2}{2!} \left(1 - \frac{1}{m}\right) + \cdots \\ &\quad + \frac{x^n}{n!} \left(1 - \frac{1}{m}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{m}\right), \end{aligned}$$

令  $m \rightarrow \infty$  ( $n$  保持不变)，得

$$e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}.$$

由此可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}\right) = e^x \quad (x > 0).$$

由于

$$\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}\right) \left(1 - x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^n}{n!}\right)$$

$$= 1 + (-1)^n \left( \frac{x^n}{n!} \right)^2,$$

而由 61 题知, 对固定的  $x$  有  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$ . 于是, 对于  $x < 0$ , 仍然有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \right) = e^x \quad (x < 0).$$

612. 证明:  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi en!) = 2\pi$ .

证 由 72 题

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{k!} + \frac{\theta_k}{k!} \quad (k \geq 1),$$

其中  $0 < \theta_k < 1$ , 因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi en!)$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \left[ 2\pi n! \left( 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{(n+1)!} \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \frac{\theta_{n+1}}{(n+1)!} \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \left[ 2\pi \left( \frac{1}{n+1} + \frac{\theta_{n+1}}{(n+1)^2} \right) \right]}{2\pi \left( \frac{1}{n+1} + \frac{\theta_{n+1}}{(n+1)^2} \right)} \cdot 2\pi n \left( \frac{1}{n+1} + \frac{\theta_{n+1}}{(n+1)^2} \right) \\ &= 2\pi. \end{aligned}$$

作下列函数的图形:

613. (a)  $y = 1 - x^{100}$ ;

(b)  $y = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - x^{2^n}) \quad (-1 \leq x \leq 1)$ .

解 (a) 如图 1.238 所示. 它关于  $y$  轴对称.

(b)  $y = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - x^{2^n}) = \begin{cases} 1, & \text{若 } |x| < 1; \\ 0, & \text{若 } |x| = 1. \end{cases}$  如图 1.239 所示




图 1.238




图 1.239

$$614. (a) y = \frac{x^{100}}{1+x^{100}} \quad (x \geq 0);$$

$$(b) y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{1+x^n} \quad (x \geq 0).$$

解 (a)如图 1.240 所示.




图 1.240




图 1.241

$$(b) y = \begin{cases} 0, & \text{若 } 0 \leq x < 1; \\ \frac{1}{2}, & \text{若 } x = 1; \\ 1, & \text{若 } 1 < x < +\infty. \end{cases}$$

如图 1.241 所示.

$$615. y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n - x^{-n}}{x^n + x^{-n}} \quad (x \neq 0).$$

解 因为  $y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n}-1}{x^{2n}+1}$ , 所以,

$$y = \begin{cases} -1, & \text{若 } |x| < 1, x \neq 0; \\ 0, & \text{若 } |x| = 1; \\ 1, & \text{若 } |x| > 1. \end{cases}$$

如图 1.242 所示.




图 1.242




图 1.243

$$616. y = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^2 + \frac{1}{n^2}}.$$

解  $y = \sqrt{x^2} = |x|$ .

如图 1.243 所示.

$$617. y = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+x^n} \quad (x \geq 0).$$

解  $y = \begin{cases} 1, & \text{若 } 0 \leq x \leq 1; \\ x, & \text{若 } x > 1. \end{cases}$

如图 1.244 所示.




图 1.244




图 1.245

$$618. y = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+x^n + \left(\frac{x^2}{2}\right)^n} \quad (x \geq 0).$$

解  $y = \begin{cases} 1, & \text{若 } 0 \leq x \leq 1; \\ x, & \text{若 } 1 < x < 2; \\ \frac{x^2}{2}, & \text{若 } 2 \leq x < +\infty. \end{cases}$

如图 1.245 所示.

$$619. y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+2}}{\sqrt{2^{2n} + x^{2n}}} \quad (x \geq 0).$$

解

$$y = \begin{cases} 0, & \text{若 } 0 \leq x < 2; \\ 2\sqrt{2}, & \text{若 } x = 2; \\ x^2, & \text{若 } x > 2. \end{cases}$$

如图 1.246 所示.

$$620. (a) y = \sin^{1000} x;$$




图 1.246

$$(6) y = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^{2n} x.$$

解 (a) 如图 1.247 所示. 其图形始终在  $Ox$  轴上方.




图 1.247

如图 1.248 所示




图 1.248




图 1.249

$$621. y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(2^n + x^n)}{n} \quad (x \geq 0).$$

$$\text{解 } y = \begin{cases} \ln 2, & \text{若 } 0 \leq x \leq 2; \\ \ln x, & \text{若 } 2 < x < +\infty. \end{cases}$$

如图 1.249 所示.

$$622. y = \lim_{n \rightarrow \infty} (x-1) \arctan x^n.$$

解  $y = \begin{cases} 0, & \text{若 } |x| \leq 1; \\ \frac{\pi}{2}(x-1), & \text{若 } x > 1. \end{cases}$

如图 1.250 所示。




图 1.250

$$623. y = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+e^{n(x+1)}}.$$

解

$$y = \begin{cases} 1, & \text{若 } x \leq -1; \\ e^{x+1}, & \text{若 } x > -1. \end{cases}$$

如图 1.251 所示。




图 1.251

$$624. y = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{x+e^{tx}}{1+e^{tx}}.$$

解

$$y = \begin{cases} x, & \text{若 } x < 0; \\ \frac{1}{2}, & \text{若 } x = 0; \\ 1, & \text{若 } x > 0. \end{cases}$$

如图 1.252 所示。




图 1.252

$$625. y = \lim_{t \rightarrow x} \frac{1}{t-x} \ln \frac{t}{x}$$

$(x > 0)$ .

解

$$y = \lim_{t \rightarrow x} \frac{\ln\left(1 + \frac{t-x}{x}\right)}{\frac{t-x}{x}}$$

$$\cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x}.$$

如图 1.253 所示.

626. 若有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (kx + b)] = 0,$$

则直线  $y = kx + b$  称为曲线  $y = f(x)$  的(斜)渐近线. 利用这方程式推出渐近线存在的必要而且充分的条件.

解 先讨论渐近线从右边伸向无穷远的情形:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (kx + b)] = 0. \quad (1)$$

而在  $x > 0$  时,

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{f(x) - (kx + b)}{x} + k + \frac{b}{x},$$

可见

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = k. \quad (2)$$

又由(1)式得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - kx] = b, \quad (3)$$

即常数  $k, b$  可由(2)、(3)式确定. 反之, 若极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$  存在, 且为有限数  $k$ , 极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - kx]$  存在且有限, 等于  $b$ , 则(1)式成立, 即

$$y = kx + b$$




图 1.253

是一条渐近线。用完全类似的方法可以讨论  $x \rightarrow -\infty$  的情形。

627. 求下列曲线的渐近线并作其图形：

$$(a) y = \frac{x^2}{x^2 + x - 2}; \quad (b) y > \sqrt{x^2 + x};$$

$$(c) y = \sqrt[3]{x^2 - x^3}; \quad (d) y = \frac{xe^x}{e^x - 1};$$

$$(e) y = \ln(1 + e^x); \quad (f) y = x + \arccos \frac{1}{x};$$

$$(g) y = \frac{x^{1+x}}{(1+x)^x}.$$

解 (a) 因为  $\lim_{x \rightarrow 1} y = \infty$  及  $\lim_{x \rightarrow -2} y = \infty$ , 所以, 直线  $x=1$  及  $x=-2$  为曲线的垂直渐近线。其次, 因为

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x(x^2 + x - 2)} = 0,$$




图 1.254

而

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2 + x - 2} = 1,$$

所以,  $y=1$  为曲线的水平渐近线.

曲线通过原点.

当  $-2 < x < 1$  时,  $y < 0$ , 故曲线在  $Ox$  轴的下方;

当  $x > 1$  或  $x < -2$  时,  $y > 0$ , 故曲线在  $Ox$  轴的上方.

适当描若干点;

$$A(2,1), B(-\sqrt{2}, -\sqrt{2}), C\left(4, \frac{8}{9}\right), D(-3, \frac{9}{4}), \dots,$$

并用光滑曲线联接, 即得图形(图 1.254).

$$(6) k_1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2+x}}{x} = 1,$$

$$b_1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+x} - x) = \frac{1}{2},$$

$$k_2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+x}}{x} = -1,$$

$$b_2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2+x} - x) = -\frac{1}{2},$$

于是, 直线  $y = x + \frac{1}{2}$  及  $y = -x - \frac{1}{2}$  为曲线的(斜)渐近线.

曲线  $y = \sqrt{x^2+x}$  为双曲线

$$\frac{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2}{\frac{1}{4}} - \frac{y^2}{\frac{1}{4}} = 1,$$

在  $Ox$  轴上方的部分.

如图 1.255 所示.

$$(a) k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{x^2-x^3}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[3]{\frac{1}{x}-1} = -1,$$

$$\begin{aligned}
 b &= \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{x^2 - x^3} + x) \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + x^2 - x^3}{\sqrt[3]{(x^2 - x^3)^2} - x \sqrt[3]{x^2 - x^3} + x^2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[3]{\left(\frac{1}{x} - 1\right)^2} - \sqrt[3]{\frac{1}{x}} - 1 + 1} = \frac{1}{3}.
 \end{aligned}$$

斜渐近线为

$$y = -x + \frac{1}{3}.$$




图 1.255




图 1.256

曲线通过原点及点  $A(1, 0)$ .

当  $-\infty < x < 1$  时,  $y > 0$ ; 而当  $x > 1$  时,  $y < 0$ .

如图 1.256 所示.

(r) 当  $x > 0$  时,

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xe^x}{x(e^x - 1)} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \frac{xe^x}{e^x - 1} - x \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x - 1} = 0,$$

故渐近线为

$$y=x;$$

当  $x < 0$  时,

$$k = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{xe^x}{x(e^x - 1)} = 0,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{xe^x}{e^x - 1} = 0,$$

故另一渐近线为

$$y=0.$$

曲线在  $x=0$  处无定义(以后可以说明它是“可去的间断”).

因为  $y > 0$ , 故图形始终在  $Ox$  轴的上方.

如图 1.257 所示.




图 1.257




图 1.258

(d) 当  $x > 0$  时,

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+e^x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \frac{x + \ln(e^{-x} + 1)}{x} \right] = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(1+e^x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(e^{-x} + 1) = 0,$$

故渐近线为

$$y=x$$

同法可求,当  $x < 0$  时的渐近线为

$$y=0.$$

曲线通过点  $A(0, \ln 2)$ .

如图 1.258 所示.

$$(e) k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \arccos \frac{1}{x}}{x} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [(x + \arccos \frac{1}{x}) - x] = \frac{\pi}{2},$$

故渐近线为

$$y = x + \frac{\pi}{2}.$$

将函数  $y=x$  及  $y=\arccos \frac{1}{x}$  (见 316 题) 的图形按相加法即得, 如图 1.259 所示.




图 1.259




图 1.260

$$(k) k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^x}{(1+x)^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x} = \frac{1}{e},$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[ \frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} - \frac{x}{e} \right] = \frac{1}{2e},$$

故渐近线为

$$y = \frac{x}{e} + \frac{1}{2e}.$$

曲线通过原点.

如图 1.260 所示.

求下列极限:

$$628. \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} + \frac{x^{n+2}}{(n+2)!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} \right).$$

解 由于

$$\begin{aligned} \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} \right| &\leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} + \cdots + \frac{|x|^{2n}}{(2n)!} \\ &\leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} (1 + |x| + \cdots + |x|^{n-1}). \end{aligned}$$

当  $|x| = 1$  时, 上式右端为  $\frac{n}{(n+1)!} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ ;

$$\begin{aligned} \text{当 } |x| \neq 1 \text{ 时, 此式为} & \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{1 - |x|^n}{1 - |x|} \\ &= \frac{1}{1 - |x|} \cdot \left( \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} - \frac{|x|}{n+1} \cdot \frac{(|x|^2)^n}{n!} \right). \end{aligned}$$

由 61 题的结果知:  $\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0, \frac{(|x|^2)^n}{n!} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ ,  
故当  $n \rightarrow \infty$  时有  $\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{1 - |x|^n}{1 - |x|} \rightarrow 0$ .

于是, 对于任意实数  $x$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} + \frac{x^{n+2}}{(n+2)!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} \right) = 0.$$

$$629. \lim_{n \rightarrow \infty} [(1+x)(1+x^2)(1+x^4)\cdots(1+x^{2^n})], \text{若 } |x| < 1.$$

解 因为

$$1+x = \frac{1-x^2}{1-x},$$

$$1+x^2 = \frac{1-x^4}{1-x^2},$$

.....

$$1+x^2 = \frac{1-x^{2^{n+1}}}{1-x^{2^n}}.$$

所以,

$$(1+x)(1+x^2)(1+x^4)\cdots(1+x^{2^n}) = \frac{1-x^{2^{n+1}}}{1-x}.$$

又因  $|x| < 1$ , 故当  $n \rightarrow \infty$  时,  $x^{2^{n+1}} \rightarrow 0$ .

最后, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [(1+x)(1+x^2)(1+x^4)\cdots(1+x^{2^n})] = \frac{1}{1-x}.$$

630.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \right).$

解 因为

$$\begin{aligned} \sin x &= 2 \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2} = 2^2 \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \sin \frac{x}{4} \\ &= \cdots = 2^n \cos \frac{x}{2} \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \sin \frac{x}{2^n}, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\sin x}{2^n} \cdot \frac{1}{\sin \frac{x}{2^n}} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\frac{x}{2^n}}{\sin \frac{x}{2^n}} \cdot \frac{\sin x}{x} \right) = \frac{\sin x}{x} (x \neq 0). \end{aligned}$$

631. 令  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = 1$ ,

其中  $\psi(x) > 0$  且当  $n \rightarrow \infty$  时  $a_m = 0 (m = 1, 2, \dots, n)$ , 换言之, 当  $m = 1, 2, \dots, n$  且  $n > N(\epsilon)$  时  $|a_m| < \epsilon$ . 再假定

$\alpha_{mn} \neq 0$ . \*)

证明：

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} [\varphi(\alpha_{1n}) + \varphi(\alpha_{2n}) + \cdots + \varphi(\alpha_{nn})] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [\psi(\alpha_{1n}) + \psi(\alpha_{2n}) + \cdots + \psi(\alpha_{nn})], \end{aligned} \quad (1)$$

此处假定等式(1)右端的极限存在.

证 任给  $\epsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使当  $0 < |x| < \delta$  时, 恒有

$$\left| \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} - 1 \right| < \epsilon,$$

从而(注意到  $\psi(x) > 0$ ),

$$(1 - \epsilon)\psi(x) < \varphi(x) < (1 + \epsilon)\psi(x). \quad (2)$$

由  $\alpha_{mn} \neq 0$  以及  $\alpha_{mn} \Rightarrow 0 (m = 1, 2, \dots, n)$  知, 必有正整数  $N = N(\epsilon)$  存在, 使当  $n > N$  时, 恒有

$$0 < |\alpha_{mn}| < \delta \quad (m = 1, 2, \dots, n).$$

于是

$$\begin{aligned} (1 - \epsilon)\psi(\alpha_{mn}) &< \varphi(\alpha_{mn}) < (1 + \epsilon)\psi(\alpha_{mn}) \\ (n > N, m = 1, 2, \dots, n). \end{aligned}$$

将这  $n$  个不等式相加, 得

$$\begin{aligned} (1 - \epsilon) \sum_{m=1}^n \psi(\alpha_{mn}) &< \sum_{m=1}^n \varphi(\alpha_{mn}) < (1 + \epsilon) \sum_{m=1}^n \psi(\alpha_{mn}) \\ (n > N). \end{aligned}$$

即

$$1 - \epsilon < \frac{\sum_{m=1}^n \varphi(\alpha_{mn})}{\sum_{m=1}^n \psi(\alpha_{mn})} < 1 + \epsilon \quad (n > N).$$

由此可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{m=1}^n \varphi(\alpha_{mn})}{\sum_{m=1}^n \psi(\alpha_{mn})} = 1.$$

由假定, 极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n \psi(\alpha_{mn})$  存在, 故

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n \varphi(\alpha_{mn}) &= \left[ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{m=1}^n \varphi(\alpha_{mn})}{\sum_{m=1}^n \psi(\alpha_{mn})} \right] \cdot \left( \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n \psi(\alpha_{mn}) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n \varphi(\alpha_{mn}).\end{aligned}$$

证毕.

\* ) 编者注: 此题应加上条件  $a_{mn} \neq 0$  (原书没有), 因为  $\varphi(x)$  或  $\psi(x)$  都可能在  $x = 0$  处无定义. 另外,  $m = 1, 2, \dots, n$ .

利用上边的定理, 求

$$632. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left[ \sqrt[3]{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right].$$

解 设  $x = \frac{k}{n^2}$ , 我们将首先说明它满足 631 题的条件.

首先,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1}{\frac{x}{3}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{1+x} + 1}{\frac{x}{3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{1+x} + 1} = 1.\end{aligned}$$

其次,  $\frac{k}{n^2} \rightarrow 0$ . ( $n \rightarrow \infty; k = 1, 2, \dots, n$ ).

最后,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{3n^2} = \frac{1}{6} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{n^2} = \frac{1}{6}.$$

所以,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left( \sqrt[3]{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right) = \frac{1}{6}.$$

$$633. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left( \sin \frac{ka}{n^2} \right).$$

解 因为  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ , 而且当  $n \rightarrow \infty$  时,  $\frac{ka}{n^2} \rightarrow 0$  ( $k = 1, 2, \dots, n$ ).

$$\text{又因 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{ka}{n^2} = \frac{a}{2},$$

故利用 631 题的结果, 即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left( \sin \frac{ka}{n^2} \right) = \frac{a}{2}.$$

$$634. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left( a^{\frac{k}{n^2}} - 1 \right) \quad (a > 0).$$

解 我们有  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{a^x - 1}{x} \cdot \frac{1}{\ln a} \right) = 1$ , 当  $n \rightarrow \infty$  时,  $\frac{k}{n^2} \rightarrow 0$  ( $k = 1, 2, \dots, n$ ) 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln a = \frac{1}{2} \ln a$ ;

因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left( a^{\frac{k}{n^2}} - 1 \right) = \frac{1}{2} \ln a.$$

$$635. \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left( 1 + \frac{k}{n^2} \right).$$

解 设  $y = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$ ,  $\ln y = \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$ .

我们考虑下列极限,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2}\right).$$

因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1,$$

又  $\frac{k}{n^2} \neq 0$  ( $n \rightarrow \infty$  时,  $k = 1, 2, \dots, n$ ), 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} = \frac{1}{2},$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln y = \frac{1}{2},$$

即  $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2}\right) = e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e}.$

636.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \cos \frac{ka}{n \sqrt{n}},$

解 设  $y = \prod_{k=1}^n \cos \frac{ka}{n \sqrt{n}}$ , 当  $n$  充分大时,  $\cos \frac{ka}{n \sqrt{n}} > 0$ , 此时,

$$\begin{aligned} \ln y &= \sum_{k=1}^n \ln \cos \frac{ka}{n \sqrt{n}} \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \tan^2 \frac{ka}{n \sqrt{n}}\right). \end{aligned}$$

因  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\tan^2 x)}{x^2} = 1$ , 又  $\frac{ka}{n \sqrt{n}} \neq 0$  ( $n \rightarrow \infty$  时,  $k = 1, 2, \dots, n$ ), 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^2 a^2}{n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)(2n+1)a^2}{6n^3} = \frac{a^2}{3},$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln y = -\frac{a^2}{6},$$

$$\text{即 } \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \cos \frac{ka}{n \sqrt{n}} = e^{-\frac{a^2}{6}}.$$

637. 叙列  $x_n$  由以下的等式所给定：

$$x_1 = \sqrt{a}, x_2 = \sqrt{a + \sqrt{a}}, x_3 = \sqrt{a + \sqrt{a + \sqrt{a}}}, \\ \dots (a > 0).$$

求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ .

解 首先, 我们注意到此叙列显然是单调上升的. 其次,

$$\text{由 } x_n = \sqrt{a + x_{n-1}}, \text{ 得 } x_n^2 = a + x_{n-1},$$

即

$$x_n = \frac{a}{x_{n-1}} + \frac{x_{n-1}}{x_n}. \quad (1)$$

因为  $0 < x_{n-1} < x_n$ , 即在(1)式右端第二项小于1, 所以,

$$x_n < \frac{a}{x_{n-1}} + 1. \quad (2)$$

$$\text{又显然有 } x_n > \sqrt{a} \quad (n = 2, 3, \dots). \quad (3)$$

将(3)式代入(2)式右端, 即得

$$x_n < \sqrt{a} + 1,$$

故叙列  $\{x_n\}$  是有界的.

根据极限存在的准则可知, 叙列  $\{x_n\}$  的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在, 设其值为  $l$ .

利用等式  $x_n^2 = a + x_{n-1}$ , 两端取极限, 得

$$l^2 = a + l,$$

解之, 得

$$l = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 4a}}{2} \quad (a > 0),$$

负根不适合(因为  $x_n > 0$ ), 只取其正根, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1 + \sqrt{1 + 4a}}{2}.$$

### 638. 函数叙列

$$y_n = y_n(x) \quad (0 \leq x \leq 1)$$

用以下的方法来确定:

$$y_1 = \frac{x}{2}, y_n = \frac{x}{2} - \frac{y_{n-1}^2}{2} \quad (n = 2, 3, \dots).$$

求  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ .

解 当  $x = 0$  时,  $y_n = 0, n = 1, 2, \dots$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0.$$

当  $0 < x \leq 1$  时, 用归纳法可证  $y_n > 0, n = 1, 2, \dots$ :

$y_1 > 0$ . 若  $y_k > 0$ , 由  $x > y_{k-1}^2$ , 可得

$$y_{k+1} = \frac{x}{2} - \frac{y_k^2}{2} = \frac{4x - (x - y_{k-1}^2)^2}{8} \geq \frac{3x}{8} > 0.$$

因而有

$$y_1 - y_3 = \frac{y_2^2}{2} > 0,$$

$$y_2 - y_4 = \frac{y_3^2 - y_1^2}{2} < 0,$$

.....

用归纳法可证

$$y_{2n} - y_{2n+2} < 0,$$

$$y_{2n-1} - y_{2n+1} > 0 \quad (n = 1, 2, \dots).$$

即  $\frac{x}{2} = y_1 > y_2 > \dots > 0,$

$0 < y_2 < y_3 < \dots < \frac{x}{2}.$

可见叙列  $y_1, y_2, \dots$  及叙列  $y_2, y_3, \dots$  都是收敛的. 设极限分别为  $A_1, A_2$ , 由

$$y_{2n} = \frac{x}{2} - \frac{y_{2n-1}^2}{2}$$

及  $y_{2n+1} = \frac{x}{2} - \frac{y_{2n}^2}{2},$

求极限得  $A_2 = \frac{x}{2} + \frac{A_1^2}{2}, A_1 = \frac{x}{2} - \frac{A_2^2}{2}$ , 相减得

$$A_1 - A_2 = (A_1 - A_2) \frac{(A_1 + A_2)}{2}.$$

而  $0 \leq A_1 \leq \frac{x}{2} \leq \frac{1}{2}, 0 \leq A_2 \leq \frac{x}{2} \leq \frac{1}{2}$ , 故

$$A_1 = A_2 = A.$$

用极限定义直接可以证明: 若  $\{y_n\}$  的两个子叙列  $\{y_{2n}\}$  及  $\{y_{2n-1}\}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 收敛于同一个极限, 则  $\{y_n\}$  也收敛于这个极限, 由

$$A = \frac{x}{2} - \frac{A^2}{2}$$

解得

$$A = \sqrt{1+x} - 1,$$

即  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \sqrt{1+x} - 1.$

### 639. 函数叙列

$$y_n = y_n(x) \quad (0 \leq x \leq 1)$$

用下面的方法来确定:

$$y_1 = \frac{x}{2}, y_n = \frac{x}{2} + \frac{y_{n-1}^2}{2} \quad (n = 2, 3, \dots).$$

求  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ .

解 显然,  $y_2 \geq y_1$ . 假设  $y_n \geq y_{n-1}$ , 则由

$$y_{n+1} - y_n = \frac{y_n^2 - y_{n-1}^2}{2}$$

便可推出  $y_{n+1} \geq y_n$ .

由数学归纳法便得知叙列  $\{y_n\}$  单调上升.

现在我们证明这个叙列有界. 显然

$$0 \leq y_1 < 1.$$

设  $0 \leq y_k < 1$ , 则  $0 \leq y_k^2 < 1$ , 且  $0 \leq y_{k+1} < 1$ .

由数学归纳法便得知叙列  $\{y_n\}$  有界.

这样, 我们就证明了此叙列的极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$$

存在. 设其值为  $l$  (显然  $0 \leq l \leq 1$ ), 即得

$$l = \frac{x}{2} + \frac{l^2}{2},$$

解之, 得  $l = 1 \pm \sqrt{1-x}$ . 由于  $0 \leq l \leq 1$ , 故必

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = l = 1 - \sqrt{1-x}.$$

#### 640. 为了求克卜勒方程式 (Уравнение Кеплера)

$$x - \epsilon \sin x = m \quad (0 < \epsilon < 1) \quad (1)$$

的近似解, 假设

$x_0 = m, x_1 = m + \epsilon \sin x_0, \dots, x_n = m + \epsilon \sin x_{n-1}, \dots$  (逐次逼近法).

证明有  $\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ , 且数  $\xi$  为方程式 (1) 的唯一的根.

证 首先考虑  $|x_n - x_{n-1}|$ . 由于

$$x_2 - x_1 = \epsilon (\sin x_1 - \sin x_0) = 2\epsilon \sin \frac{x_1 - x_0}{2} \cos \frac{x_1 + x_0}{2},$$

所以

$$\begin{aligned}|x_2 - x_1| &\leq 2\epsilon \left| \sin \frac{x_1 - x_0}{2} \right| \leq 2\epsilon \cdot \frac{|x_1 - x_0|}{2} \\&= \epsilon |x_1 - x_0|.\end{aligned}$$

同理可证

$$|x_3 - x_2| \leq \epsilon^2 |x_1 - x_0|.$$

设

$$|x_n - x_{n-1}| \leq \epsilon^{n-1} |x_1 - x_0|,$$

则有

$$\begin{aligned}|x_{n+1} - x_n| &= 2\epsilon \left| \sin \frac{x_n - x_{n-1}}{2} \right| \cdot \left| \cos \frac{x_n + x_{n-1}}{2} \right| \\&\leq \epsilon |x_n - x_{n-1}| \leq \epsilon^n |x_1 - x_0|.\end{aligned}$$

由数学归纳法得知对于任意的自然数  $n$ , 均有  $|x_n - x_{n-1}| \leq \epsilon^{n-1} |x_1 - x_0|$ . 于是, 当  $m > n$  时, 有

$$\begin{aligned}|x_m - x_n| &\leq |x_m - x_{m-1}| + |x_{m-1} - x_{m-2}| + \dots \\&\quad + |x_{n+1} - x_n| \\&\leq (\epsilon^{m-1} + \epsilon^{m-2} + \dots + \epsilon^n) |x_1 - x_0| \\&= \epsilon^n \cdot \frac{1 - \epsilon^{m-n}}{1 - \epsilon} \cdot |x_1 - x_0|,\end{aligned}$$

而

$$|x_1 - x_0| = \epsilon |\sin x_0| \leq \epsilon,$$

所以,

$$|x_m - x_n| \leq \epsilon^{n+1} \cdot \frac{1 - \epsilon^{m-n}}{1 - \epsilon} < \frac{\epsilon^{n+1}}{1 - \epsilon}.$$

由此知

$$|x_m - x_n| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

按哥西判别法得知极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$$

存在. 设其值为  $\xi$ , 由等式

$$x_n = m + \varepsilon \sin x_{n-1}$$

取极限即得

$$\xi = m + \varepsilon \sin \xi.$$

这就是说, 变量  $x_n$  的极限  $\xi$  是方程(1) 的根.

最后, 证明此根的唯一性. 设  $\xi_1$  是另一根, 则

$$\xi_1 - \xi = \varepsilon (\sin \xi_1 - \sin \xi),$$

由此得

$$|\xi_1 - \xi| \leq \varepsilon |\xi_1 - \xi|.$$

因为  $0 < \varepsilon < 1$ , 故  $\xi_1 = \xi$ .

于是, 我们就证明了  $\xi$  是方程(1) 的唯一的根.

641. 若  $\omega_k(f)$  为函数  $f(x)$  在区间  $|x - \xi| \leq k$  ( $k > 0$ ) 上的振幅, 则数

$$\omega_0(f) = \lim_{k \rightarrow 0} \omega_k(f)$$

称为函数  $f(x)$  在  $\xi$  点的振幅.

求下列函数  $f(x)$  在点  $x = 0$  的振幅:

(a)  $f(x) = \sin \frac{1}{x};$  (b)  $f(x) = \frac{1}{x^2} \cos^2 \frac{1}{x};$

(c)  $f(x) = x \left( 2 + \sin \frac{1}{x} \right);$  (d)  $f(x) = \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{1}{x};$

(e)  $f(x) = \frac{|\sin x|}{x};$  (f)  $f(x) = \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{x}}};$

(g)  $f(x) = (1 + |x|)^{\frac{1}{x}}.$

解 (a)  $\omega_k(f) = 2, \omega_0(f) = 2;$

(b)  $\omega_k(f) = +\infty, \omega_0(f) = +\infty;$

(c)  $\omega_k(f) = 3k - k = 2k, \omega_0(f) = 0;$

$$(r) \omega_k(f) = \frac{1}{\pi} \left[ \operatorname{arctg} \frac{1}{k} - \operatorname{arctg} \frac{1}{(-k)} \right] \\ = \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{1}{k},$$

$$\omega_0(f) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = 1;$$

$$(d) \omega_k(f) = 2, \omega_0(f) = 2;$$

$$(e) \omega_k(f) = \left| \frac{1}{1+e^{\frac{1}{k}}} - \frac{1}{1+e^{-\frac{1}{k}}} \right|, \omega_0(f) = 1;$$

$$(ж) \omega_k(f) = (1+k)^{\frac{1}{k}} - (1+k)^{-\frac{1}{k}}, \omega_0(f)$$

$$= e - e^{-1} = 2\sinh 1.$$

642. 命

$$f(x) = \sin \frac{1}{x}.$$

证明：对于满足条件  $-1 \leq a \leq 1$  的任何数  $a$ ，可以选出数列  $x_n \rightarrow 0$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a.$$

证 对于确定的  $a$ ,  $|a| \leq 1$ , 总存在  $x_0 \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ , 使

$$\sin x_0 = a.$$

令  $x_n = \frac{1}{2n\pi + x_0}$ , 则显然有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

又因  $f(x_n) = \sin \frac{1}{x_n} = \sin(2n\pi + x_0) = a$ ,

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = a.$$

643. 设: (a)  $f(x) = \sin^2 \frac{1}{x} + \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$ ;

(b)  $f(x) = (2 - x^2) \cos \frac{1}{x}$ ;

(c)  $f(x) = \left(1 + \cos^2 \frac{1}{x}\right)^{\sec^2 \frac{1}{x}}$ .

求

$l = \underline{\lim}_{x \rightarrow 0} f(x)$  和  $L = \overline{\lim}_{x \rightarrow 0} f(x)$ .

解 由  $l$  及  $L$  的定义, 容易求得

(a)  $l = -1, L = 2$ ;

(b)  $l = -2, L = 2$ ;

(c)  $l = 2, L = e$ .

644. 设:

(a)  $f(x) = \sin x$ ; (b)  $f(x) = x^2 \cos^2 x$ ;

(c)  $f(x) = 2^{\sin x^2}$ ;

(d)  $f(x) = \frac{x}{1 + x^2 \sin^2 x} (x \geq 0)$ .

求

$l = \underline{\lim}_{x \rightarrow \infty} f(x)$  和  $L = \overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} f(x)$ .

解 由  $l$  及  $L$  的定义, 容易求得

(a)  $l = -1, L = 1$ ;

(b)  $l = 0, L = +\infty$ ;

(c)  $l = \frac{1}{2}, L = 2$ ;

(d)  $l = 0, L = +\infty$ .

## § 6. 函数无穷小和无穷大的阶

1° 符号

$$\varphi(x) = O^+(\psi(x))$$

表示函数  $\varphi(x)$  和  $\psi(x)$  在  $x \rightarrow a$  的已知过程中是狭义地同阶的无穷小或无穷大, 就是说

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = k \quad (0 < |k| < +\infty).$$

特别是, 若当  $x \rightarrow 0$  时, 有

$$\varphi(x) = O^+(x^n) \quad (n > 0),$$

则称  $\varphi(x)$  为对于无穷小  $x$  是  $n$  阶无穷小.

仿此, 若当  $x \rightarrow \infty$  时, 有

$$\varphi(x) = O^+(x^n) \quad (n > 0),$$

则称  $\varphi(x)$  为对于无穷大  $x$  是  $n$  阶无穷大.

2° 符号

$$\varphi(x) = o(\psi(x))$$

表示当  $x \rightarrow a$  时, 函数  $\varphi(x)$  比函数  $\psi(x)$  是较高阶的无穷小, 或函数  $\varphi(x)$  比函数  $\psi(x)$  是较低阶的无穷大, 就是说

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = 0.$$

3° 若当  $x \rightarrow a$  时, 无穷小函数  $\varphi(x)$  的阶(在广义的意义上)不低于某一正的函数  $\psi(x)$  无穷小的阶(或无穷大函数  $\varphi(x)$  的阶不高于函数  $\psi(x)$  无穷大的阶), 即

$$\limsup_{x \rightarrow a} \frac{|\varphi(x)|}{\psi(x)} = k \quad (0 \leq k < +\infty),$$

则约定写为:

$$\varphi(x) = O(\psi(x)).$$

4° 若

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} = 1,$$

则称函数  $\varphi(x)$  和  $\psi(x)$  当  $x \rightarrow a$  时为等价的 [ $\varphi(x) \sim \psi(x)$ ].

例如,当  $x \rightarrow 0$  时,有:

$$\sin x \sim x; \quad \operatorname{tg} x \sim x;$$

$$a^x - 1 \sim x \ln a (a > 0);$$

$$\sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{x}{n}; \quad \ln(1+x) \sim x.$$

一般地说来,  $\varphi(x) + o(\varphi(x)) \sim \varphi(x)$ .

当求两个函数比的极限时,已知函数可用其等价的函数来代换.

### 645.

把圆心角  $AOB = x$  (图

1. 261) 当作 1 阶无穷小, 求

下列各量无穷小的阶:

(a) 弦  $AB$ ;

(b) 矢  $CD$ ;

(c) 扇形  $AOB$  的面积;

(d) 三角形  $ABC$  的面积;

(e) 梯形  $ABB_1A_1$  的面积;

(f) 弓形  $ABC$  的面积.

解 (a)  $AB = 2R \sin \frac{x}{2}$ , 式中  $R$  为圆的半径.

因为  $\frac{AB}{x} = \frac{2R \sin \frac{x}{2}}{x} \rightarrow R (x \rightarrow 0)$ , 故弦  $AB$  是关于  $x$  的一阶无穷小.

$$(b) CD = R - R \cos \frac{x}{2} = 2R \sin^2 \frac{x}{4}.$$

因为  $\frac{CD}{x^2} \rightarrow \frac{R}{8}$ , 所以, 矢  $CD$  是关于  $x$  的二阶无穷小.




图 1.261

(b) 扇形  $AOB$  的面积  $S = \frac{1}{2}R^2x$ .

因为  $\frac{S}{x} = \frac{1}{2}R^2$ , 所以,  $S$  是关于  $x$  的一阶无穷小.

$$(c) \Delta ABC = \frac{1}{2}|AB| \cdot |CD| = 2R^2 \sin \frac{x}{2} \sin^2 \frac{x}{4}.$$

因为  $\frac{\Delta ABC}{x^3} \rightarrow \frac{R^2}{16}$ , 所以,  $\Delta ABC$  的面积是关于  $x$  的三阶无穷小.

$$(d) A_1C = R \operatorname{tg} \frac{x}{2}.$$

于是, 梯形  $ABB_1A_1$  的面积

$$\begin{aligned} A_0 &= \frac{1}{2} \cdot 2R \sin^2 \frac{x}{2} \left( 2R \sin \frac{x}{2} + 2R \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right) \\ &= 2R^2 \sin^3 \frac{x}{2} + 2R^2 \sin^2 \frac{x}{2} \operatorname{tg} \frac{x}{2}. \end{aligned}$$

因为  $\frac{A_0}{x^3} \rightarrow \frac{R^2}{4} + \frac{R^2}{4} = \frac{R^2}{2}$ , 所以, 面积  $A_0$  是关于  $x$  的三阶无穷小.

(e) 弓形  $ABC$  的面积

$$\begin{aligned} p &= \frac{1}{2}R^2x - \frac{1}{2} \cdot 2R \sin \frac{x}{2} \cdot R \cos \frac{x}{2} \\ &= \frac{R^2}{2}(x - \sin x). \end{aligned}$$

由于  $x - \sin x$  是奇函数, 故只需考虑  $x \rightarrow +0$  时的情形.

当  $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$  时, 有

$$\begin{aligned} x - \sin x &\leq \operatorname{tg} x - \sin x = \frac{\sin x}{\cos x} (1 - \cos x) \\ &= \frac{\sin x \cdot 2 \sin^2 \frac{x}{2}}{\cos x} = O^*(x^3); \end{aligned}$$

而由  $x \geq 2\sin \frac{x}{2}$ , 又有

$$\begin{aligned}x - \sin x &\geq 2\sin \frac{x}{2} - \sin x = 2\sin \frac{x}{2} \left(1 - \cos \frac{x}{2}\right) \\&= 4\sin \frac{x}{2} \sin^2 \frac{x}{4} = O^*(x^3).\end{aligned}$$

于是, 当  $x$  大于 0 而充分小时, 存在两常数  $A > 0, B > 0$ , 使

$$Ax^3 \leq x - \sin x \leq Bx^3,$$

即弓形面积  $p$  基本上是关于  $x$  的三阶无穷小. 实际上, 尔后将会看到, 有  $x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3$  (但要用到导数的概念).

646. 命  $o(f(x))$  为当  $x \rightarrow a$  时比函数  $f(x)$  有较低阶的任意无穷大函数, 且  $O(f(x))$  为  $x \rightarrow a$  时与函数  $f(x)$  同阶(在广义的意义上) 的任意无穷大函数, 其中  $f(x) > 0$ .

证明: (a)  $o(o[f(x)]) = o[f(x)]$ ;

$$(b) O(o[f(x)]) = o[f(x)];$$

$$(c) O(O[f(x)]) = O[f(x)];$$

$$(d) O[f(x)] + o[f(x)] = O[f(x)];$$

$$(e) O[f(x)] \cdot O[g(x)] = O[f(x)g(x)].$$

证 (a) 因为

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{o(o[f(x)])}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{o(o[f(x)])}{o(f(x))} \cdot \frac{o(f(x))}{f(x)} = 0,$$

故  $o(o[f(x)]) = o[f(x)]$ .

(b) 由 133 题(6) 的结果, 有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} \frac{|O(o[f(x)])|}{f(x)} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{|O(o[f(x)])|}{o(f(x))} \\&\cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{o(f(x))}{f(x)} = 0,\end{aligned}$$

故  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{O\{o[f(x)]\}}{f(x)}$  存在且等于 0. 因此

$$O\{o[f(x)]\} = o[f(x)].$$

(b) 仍由 133 题(6) 的结果, 有

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow a} \left| \frac{o(O[f(x)])}{f(x)} \right| = \lim_{x \rightarrow a} \left| \frac{o\{O[f(x)]\}}{O[f(x)]} \right|$$

$$\cdot \overline{\lim}_{x \rightarrow a} \left| \frac{O[f(x)]}{f(x)} \right| = 0,$$

故  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{o(O[f(x)])}{f(x)} = 0$ , 即

$$o\{O[f(x)]\} = o[f(x)].$$

(c) 由 132 题(6) 的结果, 有

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow a} \left| \frac{O(O[f(x)])}{f(x)} \right| \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow a} \left| \frac{O\{O[f(x)]\}}{O[f(x)]} \right|$$

$$\cdot \overline{\lim}_{x \rightarrow a} \left| \frac{O[f(x)]}{f(x)} \right| < +\infty,$$

故  $O\{O[f(x)]\} = O[f(x)].$

(d) 由 131 题(6), 有

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow a} \left| \frac{O[f(x)] + o[f(x)]}{f(x)} \right| \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow a} \left| \frac{O[f(x)]}{f(x)} \right|$$

$$+ \overline{\lim}_{x \rightarrow a} \left| \frac{o[f(x)]}{f(x)} \right| = \overline{\lim}_{x \rightarrow a} \left| \frac{O[f(x)]}{f(x)} \right| < +\infty,$$

故  $O[f(x)] + o[f(x)] = O[f(x)].$

(e) 由 132 题(6), 有

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow a} \left| \frac{O(f(x))O(g(x))}{f(x)g(x)} \right| \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow a} \left| \frac{O(f(x))}{f(x)} \right|$$

$$\cdot \overline{\lim}_{x \rightarrow a} \left| \frac{O(g(x))}{g(x)} \right| < +\infty,$$

故

$$O(f(x))O(g(x)) = O(f(x)g(x)).$$

647. 设  $x \rightarrow +0$  和  $n > 0$ . 证明

(a)  $CO(x^*) = O(x^*)$  ( $C$  为常数);

(b)  $O(x^*) + O(x^m) = O(x^*)$  ( $n < m$ );

(c)  $O(x^*)O(x^m) = O(x^{*+m})$ .

证 (a) 由

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{|CO(x^*)|}{x^n} = |C| \lim_{x \rightarrow +0} \frac{|O(x^*)|}{x^n} < +\infty,$$

故

$$CO(x^*) = O(x^*).$$

(b) 由

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +0} \frac{|O(x^*) + O(x^m)|}{x^n} &\leq \lim_{x \rightarrow +0} \frac{|O(x^*)|}{x^n} \\ &+ \lim_{x \rightarrow +0} \left( \frac{|O(x^m)|}{x^n} \cdot x^{n-m} \right) = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{|O(x^*)|}{x^n} < +\infty, \end{aligned}$$

故

$$O(x^*) + O(x^m) = O(x^*) \quad (n < m).$$

(c) 由

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +0} \frac{|O(x^*)O(x^m)|}{x^{*+m}} &\leq \lim_{x \rightarrow +0} \frac{|O(x^*)|}{x^*} \\ &\cdot \lim_{x \rightarrow +0} \frac{|O(x^m)|}{x^m} < +\infty, \end{aligned}$$

得知

$$O(x^*)O(x^m) = O(x^{*+m}).$$

648. 设  $x \rightarrow +\infty$  和  $n > 0$ . 证明

(a)  $CO(x^*) = O(x^*)$ ;

(b)  $O(x^*) + O(x^m) = O(x^*) \quad (n > m)$ .

(c)  $O(x^*)O(x^m) = O(x^{*+m})$ .

证 (a) 与 (b) 同 647 题 (a) 与 (b) 之证 (只要将  $x \rightarrow +0$  换为  $x \rightarrow +\infty$ ). 下证 (c): 由于

$$\begin{aligned}
& \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|O(x^n) + O(x^m)|}{x^n} \\
& \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|O(x^n)|}{x^n} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{|O(x^m)|}{x^n} \cdot \frac{1}{x^{n-m}} \right) \\
& = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|O(x^n)|}{x^n} < +\infty,
\end{aligned}$$

故

$$O(x^n) + O(x^m) = O(x^n) \quad (n > m).$$

649. 证明符号  $\sim$  具有下列性质:(1) 反射性:  $\varphi(x) \sim \varphi(x)$ ;  
 (2) 对称性: 若  $\varphi(x) \sim \psi(x)$ , 则  $\psi(x) \sim \varphi(x)$ ;(3) 传递性: 若  $\varphi(x) \sim \psi(x)$  及  $\psi(x) \sim \chi(x)$ , 则  $\varphi(x) \sim \chi(x)$ .

证 (1) 因为  $\frac{\varphi(x)}{\varphi(x)} = 1 \rightarrow 1$ , 所以,  $\varphi(x) \sim \varphi(x)$ .

(2) 因为  $\frac{\varphi(x)}{\psi(x)} \rightarrow 1$ , 所以,  $\frac{\psi(x)}{\varphi(x)} \rightarrow 1$ .

即: 若  $\varphi(x) \sim \psi(x)$ , 则  $\psi(x) \sim \varphi(x)$ .

(3) 因为  $\frac{\varphi(x)}{\psi(x)} \rightarrow 1$ ,  $\frac{\psi(x)}{\chi(x)} \rightarrow 1$ , 所以,

$$\frac{\varphi(x)}{\chi(x)} = \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} \cdot \frac{\psi(x)}{\chi(x)} \rightarrow 1,$$

即,  $\varphi(x) \sim \chi(x)$ .

650. 设  $x \rightarrow +0$ . 证明下列等式:

$$(a) 2x - x^2 = O^*(x); \quad (b) x \sin \sqrt{x} = O^*(x^{\frac{3}{2}});$$

$$(c) x \sin \frac{1}{x} = O(|x|); \quad (d) \ln x = o\left(\frac{1}{x^\epsilon}\right) \quad (\epsilon > 0);$$

$$(e) \sqrt{x} + \sqrt{x + \sqrt{x}} \sim \sqrt[4]{x};$$

$$(f) \operatorname{arctg} \frac{1}{x} = O(1); \quad (g) (1+x)^n = 1 + nx + o(x).$$

证 由题设  $x \rightarrow +0$ , 于是

(a) 因为  $\frac{2x - x^2}{x} \rightarrow 2$ , 所以,  $2x - x^2 = O^*(x)$ .

(b) 因为  $\frac{x \sin \sqrt{x}}{x \sqrt{x}} \rightarrow 1$ , 所以,  $x \sin \sqrt{x} = O^*(x^{\frac{1}{2}})$ .

(c) 因为  $\left| x \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x| (x \neq 0)$ , 所以,

$$x \sin \frac{1}{x} = O(|x|).$$

(d) 因为  $\frac{\ln x}{\frac{1}{x^4}} = x^4 \ln x \rightarrow 0$ , 所以,  $\ln x = o\left(\frac{1}{x^4}\right)$ .

(e) 因为  $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{\sqrt{x} + \sqrt{x + \sqrt{x}}}{x^{\frac{1}{8}}} =$

$$= \lim_{x \rightarrow +0} \sqrt{x^{\frac{3}{4}} + \sqrt{x^{\frac{1}{2}} + 1}} = 1,$$

故  $\sqrt{x} + \sqrt{x + \sqrt{x}} \sim x^{\frac{1}{8}}$ .

(f) 因为  $\left| \operatorname{arctg} \frac{1}{x} \right| \leq \frac{\pi}{2} (x \neq 0)$ , 所以,  $\operatorname{arctg} \frac{1}{x} = O(1)$ .

(g) 因为  $\frac{(1+x)^n - 1 - nx}{x} = \frac{1}{2}n(n-1)x + \dots \rightarrow 0$ ,

所以  $(1+x)^n - 1 - nx = o(x)$ , 即

$$(1+x)^n = 1 + nx + o(x).$$

651. 设  $x \rightarrow +\infty$ . 证明下列等式:

(a)  $2x^3 - 3x^2 + 1 = O^*(x^3)$ ;

(b)  $\frac{x+1}{x^2+1} = O^*\left(\frac{1}{x}\right)$ ;

$$(b) x + x^2 \sin x = O(x^2);$$

$$(c) \frac{\arctg x}{1+x^2} = O^*\left(\frac{1}{x^2}\right);$$

$$(d) \ln x = o(x^\epsilon) \quad (\epsilon > 0);$$

$$(e) x^p e^{-x} = o\left(\frac{1}{x^2}\right);$$

$$(j) \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} \sim \sqrt{x};$$

$$(s) x^2 + x \ln^{100} x \sim x^2;$$

证 由题设  $x \rightarrow +\infty$ , 于是

$$(a) \text{因为 } \frac{2x^3 - 3x^2 + 1}{x^3} \rightarrow 2, \text{ 所以}$$

$$2x^3 - 3x^2 + 1 = O^*(x^3).$$

$$(b) \text{因为 } \frac{\frac{x+1}{x^2+1}}{\frac{1}{x}} = \frac{x(x+1)}{x^2+1} \rightarrow 1, \text{ 所以,}$$

$$\frac{x+1}{x^2+1} = O^*\left(\frac{1}{x}\right).$$

$$(c) \text{因为 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|x + x^2 \sin x|}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{x} + \sin x \right| \\ = 1 < +\infty, \text{ 所以, } x + x^2 \sin x = O(x^2).$$

$$(d) \text{因为 } \frac{\frac{\arctg x}{1+x^2}}{\frac{1}{x^2}} = \frac{x^2 \arctg x}{1+x^2} \rightarrow \frac{\pi}{2}, \text{ 所以,}$$

$$\frac{\arctg x}{1+x^2} = O^*\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

$$(e) \text{因为 } \frac{\ln x}{x^\epsilon} \rightarrow 0, \text{ 所以,}$$

$$\ln x = o(x^\epsilon).$$

(e) 因为  $\frac{x^p e^{-x}}{\frac{1}{x^2}} = \frac{x^{p+2}}{e^x} \rightarrow 0$ , 所以,

$$x^p e^{-x} = o\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

(x) 因为  $\frac{\sqrt{x} + \sqrt{x + \sqrt{x}}}{\sqrt{x}}$

$$= \sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x}} + \sqrt{\frac{1}{x^3}}} \rightarrow 1, \text{ 所以, } \sqrt{x} + \sqrt{x + \sqrt{x}} \sim \sqrt{x}.$$

(3) 因为  $\frac{x^2 + x \ln^{100} x}{x^3} = 1 + \frac{\ln^{100} x}{x} \rightarrow 1$ , 所以  
 $x^2 + x \ln^{100} x \sim x^2$ .

652. 证明当  $x$  充分大时, 下边的不等式成立:

(a)  $x^2 + 10x + 100 < 0.001x^3$ ;

(b)  $\ln^{1000} x < \sqrt{x}$ ; (c)  $x^{10} e^x < e^{2x}$ .

证 (a) 因为当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $\frac{x^2 + 10x + 100}{0.001x^3} \rightarrow 0$ ,

所以, 当  $x$  充分大以后, 有  $\frac{x^2 + 10x + 100}{0.001x^3} < 1$ , 即

$$x^2 + 10x + 100 < 0.001x^3.$$

(b) 因为当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $\frac{\ln^{1000} x}{\sqrt{x}} \rightarrow 0$ , 所以, 当  $x$  充分

大以后, 有  $\frac{\ln^{1000} x}{\sqrt{x}} < 1$ , 即

$$\ln^{1000} x < \sqrt{x}.$$

(c) 因为当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $\frac{x^{10} e^x}{e^{2x}} = \frac{x^{10}}{e^x} \rightarrow 0$ , 所以, 当  $x$

充分大后, 有  $\frac{x^{10}e^x}{e^{2x}} < 1$ , 即

$$x^{10}e^x < e^{2x}.$$

653. 设  $x \rightarrow 0$ . 选出下列函数的形如  $Cx^n$  ( $C$  为常数) 的主部, 并求其对于无穷小变数  $x$  的阶:

$$(a) 2x - 3x^3 + x^5; \quad (b) \sqrt{1+x} - \sqrt{1-x};$$

$$(c) \sqrt[3]{1-2x} - \sqrt[3]{1-3x}; \quad (d) \operatorname{tg}x - \sin x.$$

解 所谓函数  $f(x)$  的主部  $g(x)$ , 即满足

$$\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 1 \text{ 或 } f(x) = g(x) + o(x) \quad (x \rightarrow 0).$$

$$(a) \text{因为 } \frac{2x - 3x^3 + x^5}{2x} \rightarrow 1 \quad (x \rightarrow 0),$$

故其主部为  $2x$ , 它对于无穷小  $x$  是一阶的.

$$(b) \text{因为 } \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} \rightarrow 1 \quad (x \rightarrow 0),$$

故其主部为  $x$ , 它对于  $x$  是一阶的.

$$(c) \text{因为 } \sqrt{1-2x} - \sqrt[3]{1-3x}$$

$$= \frac{3x^2 - 8x^3}{\sqrt[6]{(1-2x)^{16}} + \sqrt[6]{(1-2x)^{12}(1-3x)^2} + \cdots + \sqrt[6]{(1-3x)^{10}}}.$$

$$\text{于是, } \frac{\sqrt{1-2x} - \sqrt[3]{1-3x}}{\frac{x^2}{2}} \rightarrow 1 \quad (x \rightarrow 0), \text{ 故其主部为}$$

$\frac{x^2}{2}$ , 它对于  $x$  是二阶的.

$$(d) \text{因为 } \operatorname{tg}x - \sin x = \frac{2}{\cos x} \sin x \sin^2 \frac{x}{2}, \text{ 于是,}$$

$$\frac{\operatorname{tg}x - \sin x}{\frac{x^3}{2}} \rightarrow 1 \quad (x \rightarrow 0), \text{ 故其主部为 } \frac{x^3}{2}, \text{ 它对于 } x \text{ 是三阶}$$

的.

654. 设  $x \rightarrow +0$ , 证明无穷小

(a)  $f(x) = \frac{1}{\ln x}$ ; (b)  $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$ ,

无论对任何的  $n$ , 也不能与无穷小  $x^n (n > 0)$  相比较.

即: 对于如此的  $n$ , 不能有等式  $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{f(x)}{x^n} = k$ , 式中  $k$  为异于零的有限量.

证 (a) 因为  $\lim_{x \rightarrow +0} x^n \ln x = 0^{**} (n > 0)$ , 于是,

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{\frac{1}{\ln x}}{x^n} = \infty,$$

即  $\frac{1}{\ln x}$  不能与无穷小  $x^n$  相比较 ( $x \rightarrow +0$ ).

(b) 因为  $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^n} = 0^{***} (n > 0)$ , 所以,  $e^{-\frac{1}{x^2}}$  不能与无穷小  $x^n$  相比较 ( $x \rightarrow 0$ ).

\* ) 参看 592 题.

\*\* ) 参看 591 题.

655. 设  $x \rightarrow 1$ . 选出下列函数的形如  $C(x - 1)^n$  的主部, 并求其对于无穷小  $(x - 1)$  的阶:

(a)  $x^3 - 3x + 2$ ; (b)  $\sqrt[3]{1 + \sqrt{x}}$ ; (c)  $\ln x$ ;

(d)  $e^x - e$ ; (e)  $x^x - 1$ .

解 (a) 因为  $x^3 - 3x + 2 = (x - 1)^2(x + 2)$ , 又

$$\frac{x^3 - 3x + 2}{3(x - 1)^2} \rightarrow 1 (x \rightarrow 1),$$

故其主部为  $3(x - 1)^2$ , 对于  $(x - 1)$  是二阶无穷小

(6) 因为  $\sqrt[3]{1 - \sqrt{x}} = -\frac{\sqrt[3]{x-1}}{\sqrt[3]{1+\sqrt{x}}}$ , 又

$$\frac{\sqrt[3]{1-\sqrt{x}}}{-\frac{\sqrt[3]{x-1}}{\sqrt[3]{2}}} \rightarrow 1(x \rightarrow 1),$$

故其主部为  $\frac{\sqrt[3]{1-x}}{\sqrt[3]{2}}$ , 对于  $(x-1)$  是  $\frac{1}{3}$  阶无穷小.

(b) 因为  $\frac{\ln x}{x-1} = \frac{\ln(1+(x-1))}{x-1} \rightarrow 1(x \rightarrow 1)$ ,

故其主部为  $x-1$ , 对于  $(x-1)$  是一阶无穷小.

(c) 因为  $e^x - e = e(e^{x-1} - 1)$ , 又

$$\frac{e^{x-1}-1}{x-1} \rightarrow 1(x \rightarrow 1).$$

故其主部为  $e(x-1)$ , 对于  $(x-1)$  是一阶无穷小.

(d) 因  $x^x - 1 = e^{x \ln x} - 1$ , 又

$$\frac{e^{x \ln x} - 1}{x-1} = \frac{e^{x \ln x} - 1}{x \ln x} \cdot \frac{x \ln(1+(x-1))}{x-1} \rightarrow 1(x \rightarrow 1),$$

故其主部为  $x-1$ , 对于  $(x-1)$  是一阶无穷小.

656. 设  $x \rightarrow +\infty$ . 选出下列函数的形如  $Cx^n$  的主部, 并求其对于无穷大  $x$  的阶:

(a)  $x^2 + 100x + 10000$ ; (b)  $\frac{2x^5}{x^3 - 3x + 1}$ ;

(c)  $\sqrt[3]{x^2 - x} + \sqrt{x}$ ; (d)  $\sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{x}}}$ .

解 (a) 因为  $x^2 + 100x + 10000 \sim x^2 (x \rightarrow +\infty)$ , 故主部为  $x^2$ , 它对于无穷大  $x$  是二阶的.

(b) 因为  $\frac{2x^5}{x^3 - 3x + 1} = \frac{2x^5}{2x^3 - 6x^3 + 2x^2}$ ,

$$\rightarrow 1(x \rightarrow +\infty)$$

故主部  $2x^{\frac{2}{3}}$ , 它对于无穷大  $x$  是二阶的.

$$(b) \sqrt[3]{x^2 - x} + \sqrt{x} = x^{\frac{2}{3}} \left( \sqrt[3]{1 - \frac{1}{x}} + \sqrt[6]{\frac{1}{x}} \right),$$

于是,

$$\frac{\sqrt[3]{x^2 - x} + \sqrt{x}}{x^{\frac{2}{3}}} = \sqrt[3]{1 - \frac{1}{x}} + \sqrt[6]{\frac{1}{x}} \rightarrow 1(x \rightarrow +\infty),$$

故主部为  $x^{\frac{2}{3}}$ , 它对于无穷大  $x$  是  $\frac{2}{3}$  阶的.

$$(r) \text{ 因为 } \frac{\sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{x}}}}{\sqrt[8]{x}} \rightarrow 1(x \rightarrow +\infty),$$

故主部为  $\sqrt[8]{x}$ , 它对于无穷大  $x$  是  $\frac{1}{8}$  阶的.

657. 设  $x \rightarrow +\infty$ , 选出下列函数的形如  $C\left(\frac{1}{x}\right)^n$  的主部, 并求其对于无穷小  $\frac{1}{x}$  的阶:

$$(a) \frac{x+1}{x^4+1}; \quad (b) \sqrt{x+1} - \sqrt{x};$$

$$(c) \sqrt{x+2} - 2\sqrt{x+1} + \sqrt{x}; \quad (r) \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}.$$

$$\text{解} \quad (a) \text{ 因为 } \frac{\frac{x+1}{x^4+1}}{\left(\frac{1}{x}\right)^3} = \frac{x^3(x+1)}{x^4} \rightarrow 1(x \rightarrow +\infty),$$

故主部为  $\left(\frac{1}{x}\right)^3$ , 它对于无穷小  $\frac{1}{x}$  是 3 阶的.

$$(6) \text{ 因为 } \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} \rightarrow 1(x \rightarrow +\infty),$$

故主部为  $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{2}}$ , 它对于无穷小  $\frac{1}{x}$  是  $\frac{1}{2}$  阶的.

$$\begin{aligned} & (\text{b}) \sqrt{x+2} - 2\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \\ &= \frac{2\sqrt{x}(x+2) - 2(x+1)}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x} + 2\sqrt{x+1}} \\ &= \frac{-2}{(\sqrt{x+2} + \sqrt{x} + 2\sqrt{x+1})(\sqrt{x(x+2)} + x+1)}. \end{aligned}$$

于是, 由此得

$$\begin{aligned} & \frac{\sqrt{x+2} - 2\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{-\frac{1}{4}x^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{8}{\left(\sqrt{1+\frac{2}{x}} + 1 + 2\sqrt{1+\frac{1}{x}}\right)\left(\sqrt{1+\frac{2}{x}} + 1 + \frac{1}{x}\right)} \\ &\rightarrow 1(x \rightarrow +\infty), \end{aligned}$$

故主部为  $-\frac{1}{4}x^{\frac{3}{2}}$ , 它对于无穷小  $\frac{1}{x}$  是  $\frac{3}{2}$  阶的.

$$(\text{r}) \text{ 因为 } \frac{\frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}} = \frac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} \rightarrow 1(x \rightarrow +\infty),$$

$$(a) \frac{x^2}{x^2 - 1}; (b) \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}; (c) \frac{x}{\sqrt[3]{1-x^3}};$$

$$(d) \frac{1}{\sin \pi x}; (e) \frac{\ln x}{(1-x)^2};$$

解 (a)  $\frac{x^2}{x^2 - 1} = \frac{x^2}{(x-1)(x+1)}$ , 于是,

$$\frac{\frac{x^2}{x^2-1}}{\frac{1}{2(x-1)}} = \frac{2x^2}{x+1} \rightarrow 1 (x \rightarrow 1),$$

故主部为  $\frac{1}{2(x-1)}$ , 它对于无穷大  $\frac{1}{x-1}$  是一阶的.

$$(b) \text{因为 } \frac{\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}}{\sqrt{2} \frac{1}{\sqrt{1-x}}} = \frac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{2}}$$

$$\rightarrow 1 (x \rightarrow 1),$$

故主部为  $\sqrt{2} \left( \frac{1}{1-x} \right)^{\frac{1}{2}}$ , 它对于无穷大  $\frac{1}{1-x}$  是  $\frac{1}{2}$  阶的.

(c) 因为  $\frac{x}{\sqrt[3]{1-x^3}} = \frac{x}{\sqrt[3]{1-x}} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{1+x+x^2}}$ , 于  
是,

$$\frac{\frac{x}{\sqrt[3]{1-x^3}}}{\frac{1}{\sqrt[3]{3} \sqrt[3]{1-x}}} \rightarrow (x \rightarrow 1),$$

故主部为  $\frac{1}{\sqrt[3]{3}} \left( \frac{1}{1-x} \right)^{\frac{1}{3}}$ , 它对于无穷大  $\frac{1}{x-1}$  是  $\frac{1}{3}$  阶的.

(r) 因为  $\frac{\frac{1}{\sin \pi x}}{\frac{1}{\pi(1-x)}} = \frac{\pi(1-x)}{\sin \pi(1-x)} \rightarrow 1(x \rightarrow 1)$ ,

故主部为  $\frac{1}{\pi} \left( \frac{1}{1-x} \right)$ , 它对于无穷大  $\frac{1}{x-1}$  是一阶的.

(d) 因为  $\frac{\frac{\ln x}{(1-x)^2}}{\frac{1}{x-1}} = \frac{\ln(1+(x-1))}{x-1}$   
 $\rightarrow 1(x \rightarrow 1)$ ,

故主部为  $\frac{1}{x-1}$ , 它对于无穷大  $\frac{1}{x-1}$  是一阶的.

659. 设  $x \rightarrow +\infty$  和  $f_n(x) = x^n (n = 1, 2, \dots)$ . 证明:

(1)  $f_n(x)$  中的每一个函数都比其前面的一个函数  $f_{n-1}(x)$  增加较快;

(2) 函数  $e^x$  比函数  $f_n(x) (n = 1, 2, \dots)$  中的每一个都增加得较快.

证 (1) 因为  $\frac{f_n(x)}{f_{n-1}(x)} = x \rightarrow +\infty$ , 所以,  $f_n(x)$  比  $f_{n-1}(x)$  增加较快.

(2) 因为  $\frac{e^x}{x^n} \rightarrow +\infty (x \rightarrow +\infty, n \text{ 为任一固定的自然数})$ , 所以  $e^x$  比  $f_n(x)$  中的每一个都增加得较快.

660. 设  $x \rightarrow +\infty$  和  $f_n(x) = \sqrt[n]{x} (n = 1, 2, \dots)$ . 证明:

(1) 函数  $f_n(x)$  中的每一个都比其前面的一个函数  $f_{n-1}(x)$  增加得较慢;

(2) 函数  $f(x) = \ln x$  比函数  $f_n(x) (n = 1, 2, \dots)$  中的每一个都增加得较慢.

证 (1) 因为  $\frac{f_n(x)}{f_{n-1}(x)} = x^{-\frac{1}{n(n-1)}}$   
 $\rightarrow 0 (x \rightarrow +\infty)$ ,

所以,  $f_n(x)$  比  $f_{n-1}(x)$  增加得较慢.

(2) 因为  $\frac{\ln x}{\sqrt[n]{x}} \rightarrow 0^+ (x \rightarrow +\infty)$ ,

所以,  $\ln x$  比  $f_n(x)$  中的每一个增加得较慢.

\* ) 利用 565 题的结果.

### 661. 证明对于任意的函数叙列

$f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x), \dots (x_0 < x < +\infty)$ .

可举出一函数  $f(x)$ , 当  $x \rightarrow +\infty$  时它比函数  $f_n(x) (n = 1, 2, \dots)$  中的每一个都增加得较快.

证 取正整数  $N > x_0$ . 定义  $x_0 < x < +\infty$  上的函数  $f(x)$  如下:

$$f(x) = \begin{cases} n \left( \sum_{k=1}^n |f_k(x)| + 1 \right), & \text{当 } n \leq x < n+1 \text{ 时,} \\ & (n = N, N+1, \dots); \\ 0, & \text{当 } x_0 < x < N \text{ 时.} \end{cases}$$

于是, 对任何正整数  $n$ , 当  $x > \max\{N, n\}$  时, 有

$$\left| \frac{f_n(x)}{f(x)} \right| = \frac{|f_n(x)|}{[x] \left( \sum_{k=1}^{[x]} |f_k(x)| + 1 \right)} < \frac{1}{[x]},$$

其中  $[x]$  表  $x$  的整数部分. 由此可知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_n(x)}{f(x)} = 0 \quad (n = 1, 2, \dots),$$

故当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $f(x)$  比  $f_n(x) (n = 1, 2, \dots)$  中的每一个都增加得较快.

## § 7. 函数的连续性

1° 函数的连续性 设

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0), \quad (1)$$

即, 若对于每一个  $\epsilon > 0$ , 都有  $\delta = \delta(\epsilon, x_0) > 0$ , 使当  $|x - x_0| < \delta$  时, 对于  $f(x)$  的有意义的一切值, 不等式

$$|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$$

都成立, 则称函数  $f(x)$  当  $x = x_0$  时(或在点  $x_0$ ) 是连续的.

若函数  $f(x)$  在集合  $X$  上的每一点都是连续的, 则称函数  $f(x)$  在已知集合  $X = \{x\}$ (区间, 线段等等) 上是连续的.

若某值  $x = x_0$  属于函数  $f(x)$  的定义域  $X = \{x\}$  或为此集合的聚点, 而当  $x = x_0$  时, 等式(1)不成立(即, (a) 数  $f(x_0)$  不存在, 换言之, 函数在点  $x = x_0$  没有定义; 或(b)  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  不存在; 或(c) 公式(1)的两端虽有意义, 但它们不相等), 则称  $x_0$  为函数  $f(x)$  的不连续点.

分为: (1) 第一类的不连续点  $x_0$ , 对于这些点存在有单侧有限的极限:

$$f(x_0 - 0) = \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) \text{ 和 } f(x_0 + 0) = \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x).$$

(2) 第二类的不连续点 —— 其余的一切不连续点.

差

$$f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0)$$

称为函数在点  $x_0$  的跳跃.

若等式

$$f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0)$$

成立, 则不连续点  $x_0$  称为无变化的. 若极限  $f(x_0 - 0)$  或  $f(x_0 + 0)$  中至少有一个等于符号  $\infty$ , 则称  $x_0$  为无穷型不连续点.

若等式

$$f(x_0 - 0) = f(x_0) \text{ [或 } f(x_0 + 0) = f(x_0)]$$

成立，则称函数  $f(x)$  在点  $x_0$  是左侧（或右侧）连续。函数  $f(x)$  在点  $x_0$  连续的充分而且必要的条件为下面三个数相等：

$$f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0) = f(x_0).$$

2° 初等函数的连续性 若函数  $f(x)$  和  $g(x)$  在  $x = x_0$  连续，则函数

(a)  $f(x) \pm g(x)$ ; (b)  $f(x)g(x)$ ;

(c)  $\frac{f(x)}{g(x)}$  [ $g(x_0) \neq 0$ ]

也在  $x = x_0$  连续。

特殊情形：(a) 有理整函数

$$P(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

对任何的  $x$  值都是连续的；(b) 有理分式函数

$$R(x) = \frac{a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n}{b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m}$$

对所有不使其分母为零的  $x$  值，都是连续的。

一般地说，基本初等函数： $x^a, \sin x, \cos x, \operatorname{tg} x, a^x, \log x, \operatorname{arc} \sin x, \operatorname{arc} \cos x, \operatorname{arc} \operatorname{tg} x, \dots$  在一切使它们有意义的点都连续。

较普遍的结果如下：若函数  $f(x)$  当  $x = x_0$  时连续，及函数  $g(y)$  当  $y = f(x_0)$  时连续，则函数  $g(f(x))$  当  $x = x_0$  时连续。

3° 关于连续函数的基本定理 若函数  $f(x)$  在有限的闭区间  $[a, b]$  内连续，则：(1) 函数  $f(x)$  在此闭区间内是有界的；(2) 达到其下确界  $m$  和上确界  $M$ （外尔什特拉斯定理）；(3) 在每一个区间  $(\alpha, \beta) \subset [a, b]$  中，函数具有介于  $f(\alpha)$  和  $f(\beta)$  间的一切中介值（哥西定理）。特例，若  $f(a) \cdot f(\beta) < 0$ ，则可找到一个数值  $\gamma$  ( $a < \gamma < \beta$ )，使得  $f(\gamma) = 0$ 。

662. 已给连续函数  $y = f(x)$  的图形。对于给定点  $a$  与给定数  $\epsilon > 0$ ，用几何方法表示出这样的数  $\delta > 0$ ，使当  $|x - a|$

$< \delta$  时,  $|f(x) - f(a)| < \epsilon.$

解 如图 1.262

所示, 如果  $\delta_1 < \delta_2$ ,

我们只要取

$$\delta = \min(\delta_1, \delta_2),$$

即有

$$\delta = \delta_1.$$

于是, 当  $|x - a| < \delta$  时,

$$|f(x) - f(a)| < \epsilon.$$

663. 要做一个金属的边长  $x_0 =$

图 1.262

10 厘米的正方形薄片. 若要其面积  $y = x^2$  与预计的  $y_0 = 100$  平方厘米的差不超过 (a)  $\pm 1$  平方厘米; (b)  $\pm 0.1$  平方厘米; (c)  $\pm 0.01$  平方厘米; (d)  $\pm \epsilon$  平方厘米, 问其边  $x$  可以在什么范围内变更?

解 (a) 要  $|x^2 - 100| < 1$ , 只要

$$99 < x^2 < 101.$$

解之, 得

$$9.95 < x < 10.05.$$

(b) 要  $|x^2 - 100| < 0.1$ , 只要

$$\sqrt{100 - 0.1} < x < \sqrt{100 + 0.1}.$$


解之, 得

$$9.995 < x < 10.005.$$

(c) 要  $|x^2 - 100| < 0.01$ , 只要

$$\sqrt{100 - 0.01} < x < \sqrt{100 + 0.01}.$$

解之, 得



$$9.9995 < x < 10.0005.$$

(r) 要  $|x^2 - 100| < \epsilon$ , 只要

$$\sqrt{100 - \epsilon} < x < \sqrt{100 + \epsilon}. *)$$

\*) 本来,  $x$  处应记成  $|x|$ , 在此仅考虑点  $x = 10$  处, 故在其近傍  $x$  值恒为正, 因此, 不必取绝对值了。

664. 立方体的边是在 2 米和 3 米之间, 为了使计算这立方体的体积时发生的绝对误差不超过  $\epsilon$  立方米, 设(a)  $\epsilon = 0.1$  立方米; (b)  $\epsilon = 0.01$  立方米; (c)  $\epsilon = 0.001$  立方米, 问测量此立方体的边  $x$  时可允许有怎样的绝对误差  $\Delta$ ?

解 要  $|x_1^3 - x_2^3| < \epsilon$ , 只要

$$|x_1 - x_2|(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2) < \epsilon,$$

即只要

$$|x_1 - x_2| < \frac{\epsilon}{3 \times 3^2} = \frac{\epsilon}{27},$$

故有

$$(a) \Delta < \frac{0.1}{27}(\text{米}) = 3.7(\text{毫米});$$

$$(b) \Delta < \frac{0.01}{27}(\text{米}) = 0.37(\text{毫米});$$

$$(c) \Delta < \frac{0.001}{27}(\text{米}) = 0.037(\text{毫米}).$$

665. 问在  $x_0 = 100$  的尽可能多大邻域内, 函数  $y = \sqrt{x}$  图形的纵坐标与  $y_0 = 10$  之差小于  $\epsilon = 10^{-n}$  ( $n \geq 0$ )? 求当  $n = 0, 1, 2, 3$  时这个邻域的大小.

解 要  $|\sqrt{x} - 10| < 10^{-n}$ , 只要

$$10[1 - 10^{-(n+1)}] < \sqrt{x} < 10[1 + 10^{-(n+1)}],$$

即只要

$$100[1 - 10^{-(n+1)}]^2 < x < 100[1 + 10^{-(n+1)}]^2,$$

故得

- (a) 当  $n = 0$  时,  $81 < x < 121$ ;
- (b) 当  $n = 1$  时,  $98.01 < x < 102.01$ ;
- (c) 当  $n = 2$  时,  $98.8001 < x < 100.2001$ ;
- (d) 当  $n = 3$  时,  $99.980001 < x < 100.020001$ .

666. 利用《 $\epsilon - \delta$ 》论证法, 证明函数  $f(x) = x^2$  当  $x = 5$  时连续.

填下表:

$\epsilon$	1	0.1	0.01	0.001	...
$\delta$					

证 任给  $\epsilon > 0$ ,

$$\text{要 } |x^2 - 25| < \epsilon, \text{ 即 } |x - 5||x + 5| < \epsilon, \quad (1)$$

不妨只就  $x = 5$  的某一邻域来考虑. 例如, 取

$$|x - 5| < 1 \text{ 或 } 4 < x < 6,$$

从而有

$$0 < x + 5 < 11.$$

于是, 只要

$$|x - 5| < \frac{\epsilon}{11}.$$

取  $\delta = \min\left(\frac{\epsilon}{11}, 1\right)$ , 则当  $|x - 5| < \delta$  时, 恒有

$$|x^2 - 25| < \epsilon,$$

所以, 函数  $y = x^2$  在  $x = 5$  处连续.

填下表:

$\epsilon$	1	0.1	0.01	0.001	$\epsilon$	...
$\delta$	0.09	0.009	0.0009	0.00009	$\min\left(\frac{\epsilon}{11}, \frac{1}{1}\right)$	...

667. 设  $f(x) = \frac{1}{x}$  和  $\epsilon = 0.001$ . 对于数值  $x_0 = 0.1; 0.01; 0.001; \dots$  求出充分大的正数  $\delta = \delta(\epsilon, x_0)$  使得可从不等式  $|x - x_0| < \delta$  推出不等式

$$|f(x) - f(x_0)| < \epsilon.$$

可否对于已知的  $\epsilon = 0.001$  选出  $\delta > 0$  来, 使它对于区间  $(0, 1)$  中的一切  $x_0$  值都适用, 换句话说, 对于任意的值  $x_0 \in (0, 1)$ , 若  $|x - x_0| < \delta$ , 则  $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$ ?

解  $|f(x) - f(x_0)| = \frac{|x - x_0|}{|x||x_0|}.$  (1)

由于  $|x_0| - |x| \leq |x - x_0|$  或  $|x| \geq |x_0| - |x - x_0|$ , 故有

$$|f(x) - f(x_0)| \leq \frac{|x - x_0|}{|x_0|^2 - |x_0||x - x_0|}.$$

(在此, 我们已假设了  $|x - x_0| \leq |x_0|$ , 这一点是可以办到的).

于是要  $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$ , 只要

$$\frac{|x - x_0|}{|x_0|^2 - |x_0||x - x_0|} < \epsilon,$$

即只要

$$|x - x_0| < \frac{\epsilon x_0^2}{1 + \epsilon |x_0|}.$$

取  $\delta = \frac{\epsilon x_0^2}{1 + \epsilon |x_0|} > 0$ , 则当  $|x - x_0| < \delta$  时, 恒有

$$|f(x) - f(x_0)| < \epsilon.$$

我们取近似值,  $\delta = 0.001x_0^2$  ( $\epsilon = 0.001$ ).

当  $x_0 = 0.1$  时,  $\delta = 10^{-5}$ ;

当  $x_0 = 0.01$  时,  $\delta = 10^{-7}$ ;

当  $x_0 = 0.001$  时,  $\delta = 10^{-9}$ .

由表达式(1)可知, 对于不论怎样小的正数  $\delta$  (固定), 则当  $|x - x_0| < \delta$  及  $x_0 \rightarrow 0$  时,  $|f(x) - f(x_0)|$  可任意地大. 因此, 无法选出一个公共的正数  $\delta$  来.

668. 简明的用《 $\epsilon - \delta$ 》的说法在肯定的意义上来表达下面的论断: 函数  $f(x)$  在点  $x_0$  有定义, 而在这一点不连续.

解 存在一个  $\epsilon_0 > 0$ , 对于无论怎样小的  $\delta > 0$ , 都有某  $x$  满足  $|x - x_0| < \delta$ , 但

$$|f(x) - f(x_0)| \geq \epsilon_0.$$

669. 设对于某些数  $\epsilon > 0$ , 可找到对应的数  $\delta = \delta(\epsilon, x_0) > 0$ , 使得, 只要  $|x - x_0| < \delta$ , 则

$$|f(x) - f(x_0)| < \epsilon.$$

设: (a) 诸数  $\epsilon$  形成一有穷的集合; (b) 数  $\epsilon$  形成分数  $\epsilon = \frac{1}{2^n}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 的无穷集合. 可否断定函数  $f(x)$  在点  $x_0$  连续?

解 (a) 不能. 因为  $\epsilon$  不能任意地小.

(b) 可以. 事实上, 对于任给的  $\epsilon > 0$ , 总可以取充分大的  $n$ , 使  $\frac{1}{2^n} < \epsilon$ . 于是, 存在  $\delta > 0$ , 使当  $|x - x_0| < \delta$  时, 恒有

$$|f(x) - f(x_0)| < \frac{1}{2^n} < \epsilon.$$

### 670. 设已知函数

$$f(x) = x + 0.001[\lfloor x \rfloor].$$

证明对于每一个  $\epsilon > 0.001$ , 便可选出  $\delta = \delta(\epsilon, x) > 0$ , 使得: 只要  $|x' - x| < \delta$ , 则  $|f(x') - f(x)| < \epsilon$ . 而对于  $0 < \epsilon \leq 0.001$ , 这件事对于一切的值  $x$  都不行.

在怎样的点这个函数失去了连续性?

证 当  $\epsilon > 0.001$ , 且  $|x' - x| < 1$  时,

$$\begin{aligned} |f(x') - f(x)| &= |x - x' + 0.001(\lfloor x \rfloor - \lfloor x' \rfloor)| \\ &\leq |x - x'| + 0.001 \end{aligned}$$

此时只要取  $\delta = \min\{\epsilon - 0.001, 1\}$ , 则当  $|x - x'| < \delta$  时恒有  $|f(x) - f(x')| < \epsilon$ .

当  $0 < \epsilon \leq 0.001$ , 且  $x_0$  不为整数时, 有整数  $n$ , 使得  $n < x_0 < n + 1$ . 只要取

$$\delta = \min(x_0 - n, n + 1 - x_0, \epsilon) > 0,$$

则当  $|x - x_0| < \delta$  时, 有  $\lfloor x \rfloor = \lfloor x_0 \rfloor$ , 从而

$$|f(x) - f(x_0)| = |x - x_0| < \delta \leq \epsilon.$$

而当  $x_0 = n$  为整数时, 则对于无论怎样选取正数  $\delta$ , 总有  $x$  满足

$$x < x_0 \text{ 及 } x_0 - x < \delta,$$

此时

$$|f(x) - f(x_0)| = (x_0 - x) + 0.001 > \epsilon.$$

于是, 函数  $f(x)$  在  $x = n$ (整数) 的点失去了连续性.

671. 设对于每一个充分小的数  $\delta > 0$ , 都有  $\epsilon = \epsilon(\delta, x_0) > 0$ , 使得: 只要  $|x - x_0| < \delta$ , 则不等式  $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$  成立. 从这里是否可得出函数  $f(x)$  在  $x = x_0$  连续?

由已知的不等式说明了函数  $f(x)$  的什么性质?

解 不能. 因为  $\epsilon$  是由  $\delta$  而确定的, 它不能任意小. 因此, 只能说明函数  $f(x)$  在点  $x_0$  的近傍有界. 事实上,  $|f(x)| < |f(x_0)| + \epsilon$ .

672. 设对于每一个数  $\epsilon > 0$ , 都有数  $\delta = \delta(\epsilon, x_0) > 0$ , 使得: 若  $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$ , 则  $|x - x_0| < \delta$ .

从这里是否可得出函数  $f(x)$  在  $x = x_0$  连续? 由这些不等式说明了函数的什么性质?

解 不对, 若函数  $f(x)$  在有穷的区间  $(a, b)$  内有定义, 则只要取  $\delta = 2(b - a)$ , 不等式  $|x - x_0| < \delta$  恒成立. 若  $(a, b)$  为无穷区间, 例如, 设  $b = +\infty$ , 则必然

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| = +\infty.$$

事实上, 若不然, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| = c < +\infty.$$

于是, 存在叙列  $x_n > a$  ( $n = 1, 2, \dots$ ),  $x_n \rightarrow +\infty$  使  $f(x_n) \rightarrow c$ . 由此可知数列  $f(x_n)$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 有界, 令

$$\epsilon_0 = \sup \{ |f(x_n)| + |f(x_0)| + 1 \} > 0.$$

显然

$$|f(x_n) - f(x_0)| < \epsilon_0 (n = 1, 2, \dots),$$

但

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |x_n - x_0| = +\infty,$$

故对此  $\epsilon_0 > 0$ , 不存在对应的  $\delta = \delta(\epsilon_0, x_0) > 0$ , 此与假定矛盾. 由此可知, 必有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| = +\infty.$$

673. 设对于每一个数  $\delta > 0$  及每一个  $x = x_0$ , 都有数  $\epsilon = \epsilon(\delta)$ ,

$x_0 > 0$ , 使得: 若  $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$ , 则  $|x - x_0| < \delta$ .  
从这里是否应得函数  $f(x)$  在  $x = x_0$  连续? 由已知的不等式说明了函数的什么性质?

解 不能. 它只说明了反函数的连续性和单值性.

674. 利用《 $\epsilon - \delta$ 》论证法证明下列函数的连续性: (a)  $ax + b$ ;  
(б)  $x^2$ ; (в)  $x^3$ ; (г)  $\sqrt{x}$ ; (д)  $\sqrt[3]{x}$ ; (е)  $\sin x$ ; (ж)  $\cos x$ ;  
(з)  $\arctan x$ .

证 (а) 设  $x_0 \in (-\infty, +\infty)$ .

任给  $\epsilon > 0$ , 要  $|ax + b - (ax_0 + b)| < \epsilon$ , 只要

$$|x - x_0| < \frac{\epsilon}{|a|} \quad (a \neq 0).$$

取  $\delta = \frac{\epsilon}{|a|}$ , 则当  $|x - x_0| < \delta$  时, 恒有

$$|(ax + b) - (ax_0 + b)| < \epsilon.$$

由于  $x_0$  的任意性, 所以,  $f(x) = ax + b$  在  $(-\infty, +\infty)$  内点点连续.

$$(б) |x^2 - x_0^2| = |x - x_0| \cdot |x + x_0| \leq |x - x_0| \cdot (|x - x_0| + 2|x_0|).$$

任给  $\epsilon > 0$ , 要  $|x^2 - x_0^2| < \epsilon$ , 只要

$$|x - x_0|^2 + 2|x_0||x - x_0| - \epsilon < 0,$$

即只要  $|x - x_0| < \sqrt{x_0^2 + \epsilon} - |x_0|$ .

取  $\delta = \sqrt{x_0^2 + \epsilon} - |x_0| > 0$ , 则当  $|x - x_0| < \delta$  时,  
恒有

$$|x^2 - x_0^2| < \epsilon.$$

这就证明了  $f(x) = x^2$  在  $(-\infty, +\infty)$  内的连续性.

$$(b) \text{ 由于 } |x^3 - x_0^3| = |x - x_0| |x^2 + x_0 x + x_0^2| \\ \leq |x - x_0| (|x^2| + |x| |x_0| + |x_0|^2),$$

不妨设  $|x - x_0| < 1$ , 则有  $|x| < 1 + |x_0|$  及

$$|x^3 - x_0^3| < |x - x_0| (1 + 3|x_0| + 3x_0^2).$$

任给  $\epsilon > 0$ , 取  $\delta = \min\left(1, \frac{\epsilon}{1 + 3|x_0| + 3x_0^2}\right)$ , 则

当  $|x - x_0| < \delta$  时, 恒有

$$|x^3 - x_0^3| < \epsilon.$$

由于  $x_0$  的任意性, 这就证明了  $x^3$  在  $(-\infty, +\infty)$  内的连续性.

$$(c) \text{ 由于 } |\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \\ < \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x_0}} \quad (x_0 > 0).$$

任给  $\epsilon > 0$ , 取  $\delta = \epsilon \sqrt{x_0}$ , 即可得证.

若  $x_0 = 0$ , 则取  $\delta = \epsilon^2$ .

(d) 由于

$$|\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{x_0}| = \frac{|x - x_0|}{|x^{\frac{2}{3}} + (xx_0)^{\frac{1}{3}} + x_0^{\frac{2}{3}}|} \\ < \frac{|x - x_0|}{|\sqrt[3]{x_0^2}|} \quad (x_0 \neq 0, xx_0 > 0),$$

取  $\delta = \min\{|x_0|, \epsilon \sqrt[3]{x_0^2}\}$  即可得证.

若  $x_0 = 0$ , 则取  $\delta = \epsilon^3$ .

(e) 由于

$$|\sin x - \sin x_0| = 2 \left| \sin \frac{x - x_0}{2} \right| \left| \cos \frac{x + x_0}{2} \right|$$

$$\leq |x - x_0|,$$

取  $\delta = \epsilon$ , 即可得证.

(\*) 由于

$$\begin{aligned} |\cos x - \cos x_0| &= 2 \left| \sin \frac{x - x_0}{2} \right| \left| \sin \frac{x + x_0}{2} \right| \\ &\leq |x - x_0| \end{aligned}$$

取  $\epsilon = \delta$ , 即可得证.

(3) 由  $|\operatorname{arc} \operatorname{tg} x - \operatorname{arc} \operatorname{tg} x_0| = \left| \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{x - x_0}{1 + xx_0} \right|$ ,

又因  $|y| < \frac{\pi}{2}$  时,  $|y| \leq |\operatorname{tg} y|$ ,

故有

$$|\operatorname{arc} \operatorname{tg} x - \operatorname{arc} \operatorname{tg} x_0| \leq \left| \frac{x - x_0}{1 + xx_0} \right|.$$

当  $x_0 > 0$  时, 不妨就  $|x - x_0| < |x_0| = x_0$  进行讨论, 此时

$$|1 + xx_0| > 1, \text{ 则}$$

$$|\operatorname{arc} \operatorname{tg} x - \operatorname{arc} \operatorname{tg} x_0| \leq |x - x_0|.$$

当  $x_0 < 0$  时可同样讨论.

所以, 取  $\delta = \min(\epsilon, |x_0|)$  ( $x_0 = 0$  时, 取  $\delta = \epsilon$ ),

则当  $|x - x_0| < \delta$  时, 恒有

$$|\operatorname{arc} \operatorname{tg} x - \operatorname{arc} \operatorname{tg} x_0| < \epsilon.$$

由于  $x_0$  的任意性, 所以  $\operatorname{arc} \operatorname{tg} x$  在  $(-\infty, +\infty)$  内连续.

研究下列函数的连续性并绘出其图形:

675.  $f(x) = |x|.$

解  $||x| - |x_0|| \leq |x - x_0|$ ,

取  $\delta = \epsilon$ , 即可证得在任一点的连续性, 如图 1.263 所示.




图 1.263




图 1.264

$$676. f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2}, & \text{若 } x \neq 2; \\ A, & \text{若 } x = 2. \end{cases}$$

**解**  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$   
 $= \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4.$

因此, 当  $A = 4$  时,  $f(x)$  在点  $x = 2$  处连续; 而当  $A \neq 4$  时,  $f(x)$  在点  $x = 2$  处不连续. 至于在点  $x \neq 2$  处显然是连续的, 并且  $f(x) = x + 2 (x \neq 2)$ .

如图 1.264 所示.

677. 若  $x \neq -1$ ,  $f(x)$

$$= \frac{1}{(1+x)^2}, \text{ 而 } f(-1)$$

是任意的.

**解** 因为

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty,$$

故函数  $f(x)$  在点

$x = -1$  处不连续.

在点  $x \neq -1$  处函数  $f(x)$  显然是连续的.




图 1.265

如图 1.265 所示.

678. (a) 若  $x \neq 0$ ,

$$f_1(x) = \left| \frac{\sin x}{x} \right|, \text{ 而 } f_1(0) = 1;$$

(b) 若  $x \neq 0$ ,

$$f_2(x) = \frac{\sin x}{|x|}, \text{ 而 } f_2(0) = 1.$$

解 (a) 因为  $\lim_{x \rightarrow 0} f_1(x) = 1 = f_1(0)$ , 故  $f_1(x)$  点点连续.

(b) 因  $\lim_{x \rightarrow +0} f_2(x) = 1, \lim_{x \rightarrow -0} f_2(x) = -1$ , 故  $\lim_{x \rightarrow 0} f_2(x)$  不存在, 因此  $f_2(x)$  在点  $x = 0$  处不连续, 其余各点均连续.




图 1.266

其中(a)的图形关于  $Oy$  轴对称(图 1.266), 而(b)的图形关于原点对称(图 1.267).




图 1.267

679. 若  $x \neq 0$ ,  $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ , 而  $f(0)$  是任意的.

**解** 在  $x \neq 0$  的点  $f(x)$  均为连续, 而在  $x = 0$  不连续 (因为  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  不存在). 图形关于原点对称, 图 1.268 仅为  $x > 0$  的一部分.




图 1.268

680. 若  $x \neq 0$ ,  $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ , 而  $f(0) = 0$ .

解  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) =$

$f(0)$ , 点点连续.

图形关于  $Oy$  轴对称, 如图 1.

269 所示.

当  $x \rightarrow \infty$  时,  
 $y \rightarrow 1$ , 且当  $|x| >$   
 $\frac{2}{\pi}$  时  $0 < y < 1$ .




图 1.269

681. 若  $x \neq 0$ ,  $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$ , 而  $f(0) = 0$ .

解  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$ , 点点连续.

图形关于  $Oy$  轴对称, 如图 1.270 所示.




图 1.270

当  $x \rightarrow \infty$  时,  $y \rightarrow 1$ , 且  $0 < y < 1$ .

682. 若  $x \neq 1$ ,  $f(x) = \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{x-1}}}$ , 而  $f(1)$  是任意的.

解  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0$ ,

除点  $x = 1$  外其余点点连续.

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{1}{2}$ . 如图 1.271 所示.




图 1.271




图 1.272

683. 若  $x \neq 0$ ,  $f(x) = x \ln x^2$ , 而  $f(0) = a$ .

解  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \ln x^2 = 0$

当  $a = 0$  时, 点点连续; 而当  $a \neq 0$  时, 除点  $x = 0$  处不连续, 其余点点连续. 图形关于原点对称, 如图 1.272 所示.

684.  $f(x) = \operatorname{sgn} x$ .

解 当  $x < 0$  时,  $f(x) = -1$ ;

当  $x > 0$  时,  $f(x) = 1$ ;

当  $x = 0$  时,  $f(x) = 0$ .

除点 0 外, 点点连续.

如图 1.273 所示.




图 1.273

685.  $f(x) = [x]$ .

解 除当  $x = k$  ( $k$  为整数) 外, 其余点点连续.

如图 1.274 所示.

$$686. f(x) = \sqrt{x} - [\sqrt{x}].$$

解 当  $x = k^2$  ( $k = 1, 2, \dots$ ) 时不连续. 当  $k^2 \leq x < (k+1)^2$  时,

$$f(x) = \sqrt{x} - k, f[(k+1)^2] = 0.$$

如图 1.275 所示.




图 1.274




图 1.275

求出下列函数的不连续点, 并研究这些点的性质:

$$687. y = \frac{x}{(1+x)^2}.$$

解  $x = -1$  为无穷型不连续点.

$$688. y = \frac{1+x}{1+x^3}.$$

解 因  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1+x}{1+x^3} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{x^2 - x + 1} = \frac{1}{3}$ ,

故  $x = -1$  为“可移去”的不连续点.

$$689. y = \frac{x^2 - 1}{x^3 - 3x + 2}.$$

解  $\frac{x^2 - 1}{x^3 - 3x + 2} = \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)^2(x+2)},$

$x = 1$  及  $x = -2$  均为无穷型不连续点.

$$690. y = \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}}{\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x}}.$$

解 因为  $\lim_{x \rightarrow -1} y = \infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} y = -1$ , 及  $\lim_{x \rightarrow 1} y = 0$ ,

所以,  $x = -1$  为无穷型不连续点, 而  $x = 0$  及  $x = 1$  为“可移去”的不连续点.

$$691. y = \frac{x}{\sin x}.$$

解 因为  $\lim_{x \rightarrow 0} y = 1$  及  $\lim_{x \rightarrow k\pi} y = \infty$  ( $k$  为不等于零的整数),

所以,  $x = 0$  为“可移去”的不连续点, 而  $x = k\pi$  ( $k = \pm 1, \pm 2, \dots$ ) 为无穷型不连续点.

$$692. y = \sqrt{\frac{1 - \cos \pi x}{4 - x^2}}.$$

解  $\lim_{x \rightarrow 2} y = \lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{\frac{2\pi \sin^2 \frac{\pi}{2}(2-x)}{\frac{\pi}{2}(2-x) \cdot 2(2+x)}} = 0.$

同理,  $\lim_{x \rightarrow -2} y = 0$ ,

所以,  $x = 2$  及  $x = -2$  为“可移去”的不连续点.

$$693. y = \cos^2 \frac{1}{x}.$$

解 因  $\lim_{x \rightarrow 0} y$  不存在,<sup>\*</sup> 故  $x = 0$  为第二类不连续点.

\* ) 左右极限均不存在.

694.  $y = \operatorname{sgn} \left( \sin \frac{\pi}{x} \right).$

解  $x = 0$  为第二类不连续点.

因为  $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{k}-0} y = (-1)^k$ ,  $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{k}+0} y = (-1)^{k-1}$ , 故  $x = \frac{1}{k}$   
( $k = \pm 1, \pm 2, \dots$ )

为第一类不连续点.

695.  $y = \frac{\cos \frac{\pi}{x}}{\cos \frac{\pi}{x}}.$

解  $x = \frac{2}{2k+1}$  ( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ) 为“可移去”的不连续点.

696.  $y = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{1}{x}.$

解 因  $\lim_{x \rightarrow +0} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ ,  $\lim_{x \rightarrow -0} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}$ ,  
故  $x = 0$  为第一类不连续点.

697.  $y = \sqrt{x} \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{1}{x}.$

解  $\lim_{x \rightarrow 0} y = 0$ ,  $x = 0$  为“可移去”的不连续点.

698.  $y = e^{x+\frac{1}{x}}.$

解 因为  $\lim_{x \rightarrow +0} y = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -0} y = 0$ ,

所以,  $x = 0$  为第二类不连续点.

699.  $y = \frac{1}{\ln x}.$

解 因为  $\lim_{x \rightarrow 0} y = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1-0} y = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1+0} y = +\infty$ ,

所以,  $x = 0$  为“可移去”的不连续点, 而  $x = 1$  为无

无穷型不连续点.

$$700. y = \frac{1}{1 - e^{1-x}}$$

解 因为  $\lim_{x \rightarrow 1+0} y = 1$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1-0} y = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = -\infty$ ,  
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = +\infty$ , 所以  $x = 1$  为第一类不连续点, 而  $x = 0$ ,  
 为无穷型不连续点.

研究下列函数的连续性并绘出其大略图形.

$$701. y = \operatorname{sgn}(\sin x).$$

解  $x = k\pi (k = 0,$   
 $\pm 1, \pm 2, \dots)$ .

为第一类不连续点.

如图 1.276 所示.

$$702. y = x - [x].$$

解  $x = k (k = 0, \pm 1,$   
 $\pm 2, \dots)$

为第一类不连续点.

如图 1.277 所示.

$$703. y = x[x].$$

解  $x = k (k = \pm 1, \pm 2,$   
 $\dots)$  为第一类不连续点.

如图 1.278 所示.

$$704. y = [x] \sin \pi x.$$

解 处处连续.

当  $x = k (k = 0$   
 $, \pm 1, \pm 2, \dots)$  时  $y = 0$ .




图 1.276




图 1.277




图 1.278

如图 1.279 所示.

$$705. y = x^2 - \lfloor x^2 \rfloor.$$

解  $x = \pm \sqrt{k}$  ( $k = 1, 2, \dots$ ) 为第一类不连续点.

如图 1.280 所示.

$$706. y = \lfloor \frac{1}{x} \rfloor.$$

解  $x = 0$  为无穷

型不连续点,  $x = \frac{1}{k}$  ( $k = \pm 1, \pm 2, \dots$ ) 为第一类不连续点.

图 1.281 仅画了  $x > 0$  的部分, 并且在图形中两轴比例不一致, 即已经过“压缩”变换.

$$707. y = x \lfloor \frac{1}{x} \rfloor.$$

解  $x = 0$  为“可移去”的不连续点, 因为  $\lim_{x \rightarrow 0} y = 1$ .

$x = \frac{1}{k}$  ( $k = \pm 1, \pm 2, \dots$ ) 为第一类不连续点.

图 1.282 仅画了当  $x > 0$  的部分, 并且两轴所取的单位不一致.




图 1.279




图 1.280




图 1.281

708.  $y = \operatorname{sgn} \left( \cos \frac{1}{x} \right)$ .

解  $x = 0$  为第二类不连续点.

凡使  $\cos \frac{1}{x} = 0$  的点, 即  $x = \frac{2}{(2k-1)\pi}$  ( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ) 为第一类不连续点.

图 1.283 仅画了当  $k = 0, \pm 1, \pm 2$  时的情形, 图形关于  $Oy$  轴对称.

709.  $y = [\frac{1}{x^2}] \operatorname{sgn} \left( \sin \frac{\pi}{x} \right)$ .

解  $x = 0$  为第二类不连续点.

$x = \pm \frac{1}{k}$  及  $x = \pm \frac{1}{\sqrt{k}}$  ( $k = 1, 2, \dots$ ) 为第一类不连续点.

为第一类不连续点.

图 1.284 仅画了  $x > 0$  时的一部分. 又两轴所取的比例单位不同.

710.  $y = \operatorname{ctg} \frac{\pi}{x}$ .

解 凡使  $\sin \frac{\pi}{x} = 0$ , 即




图 1.282




图 1.283

$$x = \frac{1}{k} (k = \pm 1, \pm 2, \dots)$$

为无穷型不连续点.  $x = 0$  为第二类不连续点.




图 1.284

图形关于原点对称, 如图 1.285 所示.




图 1.285

当  $x \rightarrow -\infty$  时,  $y \rightarrow +\infty$ ;

当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $y \rightarrow +\infty$ .

$$711. y = \sec^2 \frac{1}{x}.$$

解  $x = \frac{2}{(2k+1)\pi}$  ( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ) 为无穷型不连续点.

$x = 0$  为第二类不连续点.

图形关于  $Oy$  轴对称, 当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $y \rightarrow 1$ .

如图 1.286 所示.




图 1.286

$$712. y = (-1)^{\lfloor x^2 \rfloor}.$$

解  $x = \pm \sqrt{n}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 为第一类不连续点.

图形关于  $Oy$  轴对称.

$$\lim_{x \rightarrow \sqrt{n}-0} y = (-1)^{n-1},$$

$$\lim_{x \rightarrow \sqrt{n}+0} y = (-1)^n.$$

如图 1.287 所示.




图 1.287

$$713. y = \arctg \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} \right).$$

解  $x = 0, x = 1$  和  $x = 2$  为第一类不连续点.

$$\lim_{x \rightarrow -0} y = -\frac{\pi}{2}, \lim_{x \rightarrow 1-0} y = -\frac{\pi}{2},$$

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} y = -\frac{\pi}{2}, \lim_{x \rightarrow +0} y = \frac{\pi}{2},$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} y = \frac{\pi}{2}, \lim_{x \rightarrow 2+0} y = \frac{\pi}{2},$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 0, \lim_{x \rightarrow -\infty} y = 0.$$

如图 1.288 所示.




图 1.288

$$714. y = \frac{1}{x^2 \sin^2 x}.$$

解  $x = k\pi (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$  为无穷型不连续点.

图形关于  $Oy$  轴对称, 如图 1.289 所示.




图 1.289

$$715. y = \frac{1}{\sin(x^2)},$$

解  $x = \pm \sqrt{k}\pi (k = 0, 1, 2, \dots)$  为无穷型不连续点.

图形关于  $Oy$  轴对称, 如图 1.290 所示.

图中只画了  $x > 0$  的一部分.




图 1.290

$$716. y = \ln \frac{x^2}{(x+1)(x-3)}.$$

解  $x = -1$  和  $x = 3$  为无穷型不连续点.

定义域为  $x < -1$  或  $x > 3$ .

当  $x < -\frac{3}{2}$  时,  $0 < \frac{x^2}{x^2 - 2x - 3} < 1$ , 故

$$\ln \frac{1}{(x+1)(x-3)} < 0.$$

当  $x > \frac{3}{2}$  时,

$$\frac{x^2}{x^2 - 2x - 3} > 1$$

故  $\ln \frac{1}{(x+1)(x-3)} > 0.$

当  $x \rightarrow \infty$  时,  $y \rightarrow 0.$

如图 1.291 所示.

717.  $y = e^{-\frac{1}{x}}.$

解  $x = 0$  为第二

类不连续点.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y = 1, \lim_{x \rightarrow +0} y = 0, \lim_{x \rightarrow -0} y = +\infty.$$

如图 1.292 所示.




图 1.292

718.  $y = 1 - e^{-\frac{1}{x^2}}.$

解 因  $\lim_{x \rightarrow 0} y = 1,$

故  $x = 0$  为“可移去”的不连续点.

图形关于  $Oy$  轴对称, 如图 1.293 所示.




图 1.291




图 1.293

$$719. y = \operatorname{th} \frac{2x}{1-x^2},$$

解  $x = \pm 1$  为第一类不连续点.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} y = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} y = -1.$$

图形关于原点对称,

如图 1.294 所示.

研究下列函数的连续性并作出其图形:

$$720. y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+x^n} \quad (x \geq 0).$$

$$\text{解 } y = \begin{cases} 1, & \text{当 } 0 \leq x < 1; \\ 0, & \text{当 } x > 1; \\ \frac{1}{2}, & \text{当 } x = 1. \end{cases}$$

$x=1$  为第一类不连续点.

如图 1.295 所示.




图 1.294




图 1.295




图 1.296

$$721. y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x - n^{-x}}{n^x + n^{-x}},$$

解  $y = \begin{cases} 1, & \text{当 } x > 0; \\ 0, & \text{当 } x = 0; \\ -1, & \text{当 } x < 0, \end{cases}$   
即  $y = \operatorname{sgn} x.$

$x=0$  为第一类不连续点, 如图 1.296 所示.

$$722. y = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+x^{2n}}.$$

解

$$y = \begin{cases} 1, & \text{当 } |x| \leq 1; \\ x^2, & \text{当 } |x| > 1. \end{cases}$$

处处连续, 如图 1.297  
所示.

$$723. y = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos^{2n} x.$$




图 1.297

解

$$y = \begin{cases} 1, & \text{当 } x = k\pi, \\ 0, & \text{当 } x \neq k\pi. \end{cases}$$

( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ).

$x = k\pi$  为第一类不连续  
点, 如图 1.298 所示.




图 1.298

$$724. y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{1 + (2 \sin x)^{2n}}.$$

$$\text{解 } y = \begin{cases} x, & \text{当 } |x - k\pi| < \frac{\pi}{6}; \\ \frac{x}{2}, & \text{当 } x = k\pi \pm \frac{\pi}{6}; \\ 0, & \text{当 } \frac{\pi}{6} < |x - k\pi| < \frac{5\pi}{6}. \end{cases}$$

$(k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$

$x = k\pi \pm \frac{\pi}{6}$  为第一类不连续点.

如图 1.299 所示.




图 1.299

$$725. y = \lim_{n \rightarrow \infty} [x \arctan(n \operatorname{ctg} x)].$$

$$\text{解 } y = \begin{cases} \frac{\pi}{2}x, & \text{当 } k\pi < x < k\pi + \frac{\pi}{2}; \\ -\frac{\pi}{2}x, & \text{当 } k\pi + \frac{\pi}{2} < x < k\pi + \pi; \\ 0, & \text{当 } x = k\pi + \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

$(k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$

$x = \frac{k\pi}{2} (k \neq 0)$  为第一类不连续点, 如图 1.300 所示.




图 1.300

$$726. y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x + x^2 e^{nx}}{1 + e^{nx}}$$

解  $y = \begin{cases} x, & \text{当 } x \leq 0; \\ x^2, & \text{当 } x > 0. \end{cases}$

处处连续,如图 1.301 所示.




图 1.301




图 1.302

$$727. y = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+e^x)}{\ln(1+e^t)}$$

解  $y = \begin{cases} 0, & \text{当 } x \leq 0; \\ x, & \text{当 } x > 0. \end{cases}$

处处连续,如图 1.302 所示.

$$728. y = \lim_{t \rightarrow +\infty} (1+x) \operatorname{th} t x.$$

解

$$y = \begin{cases} -(1+x), & \text{当 } x < 0; \\ 0, & \text{当 } x = 0; \\ 1+x, & \text{当 } x > 0. \end{cases}$$

$x=0$  为第一类不连续点.

如图 1.303 所示.




图 1.303




图 1.304

### 729. 函数

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & \text{若 } 0 \leq x \leq 1; \\ 2-x, & \text{若 } 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

是否为连续函数?

解  $x=1$  为第一类不连续点, 在  $[0, 2]$  上  $f(x)$  不是连续函数.

如图 1.304 所示.

### 730. 设:

$$f(x) = \begin{cases} e^x, & \text{若 } x < 0; \\ a+x, & \text{若 } x \geq 0. \end{cases}$$

当怎样选择数  $a$ , 函数  $f(x)$  方为连续的?

解 因  $\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = a$  及  $\lim_{x \rightarrow -0} f(x) = 1$ ,

而  $f(0) = a$ , 故当  $a = 1$  时,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0),$$

此即说明函数  $f(x)$  在  $x=0$  处连续;至于当  $x \neq 0$  时,  $f(x)$  显然连续.

于是,我们选择数  $a=1$ ,则函数  $f(x)$  在整个数轴上为连续的,如图 1.305 所示.




图 1.305

731. 研究下列函数的连续性并说明不连续点的性质,设:

$$(a) f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{当 } 0 \leq x \leq 1, \\ 2-x, & \text{当 } 1 < x \leq 2; \end{cases}$$

$$(b) f(x) = \begin{cases} x, & \text{当 } |x| \leq 1, \\ 1, & \text{当 } |x| > 1; \end{cases}$$

$$(c) f(x) = \begin{cases} \cos \frac{\pi x}{2}, & \text{当 } |x| \leq 1, \\ |x-1|, & \text{当 } |x| > 1; \end{cases}$$

$$(d) f(x) = \begin{cases} \operatorname{ctg}^2 \pi x, & \text{当 } x \text{ 为非整数;} \\ 0, & \text{当 } x \text{ 为整数;} \end{cases}$$

$$(e) f(x) = \begin{cases} \sin \pi x, & \text{当 } x \text{ 为有理数,} \\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

解 (a) 连续函数.

(b)  $x=-1$  为第一类不连续点.

- (b)  $x = -1$  为第一类不连续点.  
 (c)  $x = k$  ( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ) 为无穷型不连续点.  
 (d)  $x \neq k$  ( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ) 为第二类不连续点.

732. 函数  $d = d(x)$  是数轴  $Ox$  上的点  $x$  与由线  $0 \leq x \leq 1$  及  $2 \leq x \leq 3$  所构成点集间的最短距离. 求函数  $d$  的解析表示式, 作出其图形并研究其连续性.




图 1.306

解

$$d = \begin{cases} -x, & -\infty < x < 0; \\ 0, & 0 \leq x \leq 1; \\ x - 1, & 1 < x \leq \frac{3}{2}; \\ 2 - x, & \frac{3}{2} < x < 2; \\ 0, & 2 \leq x \leq 3; \\ x - 3, & 3 < x < +\infty. \end{cases}$$

处处连续, 如图 1.306 所示.

733. 图形  $E$  是由高为 1 底为 1 的等腰三角形及底为 1 高为 2 及 3 的二矩形所构成(图 1.307). 函数  $S = S(y)$  ( $0 \leq y < +\infty$ ) 是图形  $E$  介于平行线  $Y=0$  及  $Y=y$  之间的那一部分面积; 而函数  $b=b(y)$  ( $0 \leq y < +\infty$ ) 是用平行线  $Y=y$

去截图形所得截痕之长. 求函数  $S$  及  $b$  的解析表示式, 作出它们的图形并研究其连续性.

**解**

$$S = \begin{cases} 3y - \frac{y^2}{2}, & \text{当 } 0 \leq y \leq 1; \\ \frac{1}{2} + 2y, & \text{当 } 1 < y \leq 2; \\ \frac{5}{2} + y, & \text{当 } 2 < y \leq 3; \\ \frac{11}{2}, & \text{当 } 3 < y < +\infty. \end{cases}$$

处处连续, 如图 1.308 所示.




图 1.307




图 1.308

对于函数  $b=b(y)$  根据假设, 则有如下解析表示式:

$$b = \begin{cases} 3-y, & \text{当 } 0 \leq y \leq 1; \\ 2, & \text{当 } 1 < y \leq 2; \\ 1, & \text{当 } 2 < y \leq 3; \\ 0, & \text{当 } 3 < y < +\infty. \end{cases}$$

$y=2$  及  $y=3$  为第一类不连续点, 如图 1.309 所示.




图 1.309

### 734. 证明迪里黑里函数

$$\chi(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} \{ \lim_{n \rightarrow \infty} \cos^n(\pi m! x) \}$$

当  $x$  取任一值时都是不连续的.

**证** 记  $f(m, n) = \cos^n(\pi m! x)$ .

当  $x$  为有理数时, 总可认为  $m > p$ , 其中  $x = \frac{q}{p}$  ( $p, q$  为互质的整数), 于是  $f(m, n) = 1$ , 故此时

$$\chi(x) = 1,$$

当  $x$  为无理数时, 则对任一固定的  $m$  而言,

$$|\cos(\pi m! x)| < 1, \text{ 从而}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \cos^n(\pi m! x) = 0,$$

故此时  $\chi(x) = 0$ .

总之,

$$\chi(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \text{ 为有理数时;} \\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数时.} \end{cases}$$

由实数的稠密性可知, 对于  $x$  的任意值在其任一邻域内均含有无限个有理数和无理数, 因而  $\chi(x)$  的值总在

1 和 0 这两数中取一个. 这样,  $\chi(x)$  的极限就不存在. 于是, 当  $x$  取任一值时,  $\chi(x)$  都是不连续的.

### 735. 设有函数

$$f(x) = x \cdot \chi(x),$$

式中  $\chi(x)$  为迪里黑里函数(参阅上例), 研究此函数  $f(x)$  的连续性. 作出这函数的略图.

解

$$x \cdot \chi(x) = \begin{cases} x, & \text{当 } x \text{ 为有理数时;} \\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数及 } 0 \text{ 时,} \end{cases}$$

因此,

$\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \chi(x) = 0$  等于在  $x=0$  处的函数值, 故当  $x \neq 0$  时,  $x \cdot \chi(x)$  不连续, 而当  $x=0$  时,  $x \cdot \chi(x)$  连续, 如图 1.310 所示.




图 1.310

### 736. 证明黎曼函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{若 } x = \frac{m}{n}, \text{ 其中 } m \text{ 和 } n \text{ 为互质的整数,} \\ 0, & \text{若 } x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

当  $x$  取任一个有理值时是不连续的, 而当  $x$  取任一个无理值时是连续的. 作出这个函数的略图.

证 不失一般性, 我们仅就区间  $[0,1]$  讨论, 图 1.311 为  $f(x)$  在  $x \in [0,2]$  时的略图.




图 1.311

对于任意的  $x_0 \in [0,1]$  来说, 若任取  $\epsilon > 0$ , 则满足不等式  $n < \frac{1}{\epsilon}$  的自然数  $n$  至多只有有限个, 即在  $[0,1]$  中至多只有有限个有理数  $\frac{m}{n}$ , 使得  $f\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{1}{n} \geq \epsilon$ . 因而我们可以取  $\delta > 0$ , 使得  $x_0$  的邻域  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  内不含有这样的有理数(若  $x_0$  为有理数, 则可能除去  $x_0$ ). 于是, 只要  $0 < |x - x_0| < \delta$ , 不论  $x$  是否为有理数, 都成立  $|f(x)| < \epsilon$ . 即证明了对于  $[0,1]$  中任意点  $x_0$ , 都成立

$$f(x_0 + 0) = f(x_0 - 0) = 0.$$

若  $x_0$  为无理数, 则  $f(x_0) = 0$ , 可见  $f(x)$  在  $x_0$  连续; 若  $x_0$  是有理数, 则  $f(x_0) \neq 0$ , 函数  $f(x)$  在  $x_0$  点有可移间断.

737. 若  $x$  是既约有理分数  $\frac{m}{n}$  ( $n \geq 1$ ) 时,  $f(x) = \frac{nx}{n+1}$ ; 若  $x$  是无理数时,  $f(x) = |x|$ .

试研究函数  $f(x)$  的连续性并作出此函数的略图.

证 当  $x < 0$  时,  $f(x)$  显然不连续, 而对于正有理数  $\xi = \frac{m}{n}$ ,  $f(\xi) = \frac{m}{n+1}$ . 若我们取一列无理数  $x_k$  趋于  $\xi$ , 则  $\lim_{x_k \rightarrow \xi} f(x_k) = \frac{m}{n} \neq \frac{m}{n+1}$ , 故  $f(x)$  在正有理数点也不连续. 当  $\xi$  为正无理数时, 由于对任意的  $\epsilon > 0$ , 满足  $\frac{1}{q} > \epsilon$  的自然数  $q$  至多只有有限个. 与 736 题类似可证  $f(x)$  在点  $x = \xi$  连续. 如图 1.312 所示.




图 1.312

738. 函数  $f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2}$  除  $x = 0$  外, 对于自变数  $x$  的一切值都有定义. 为了使此函数当  $x = 0$  是连续的, 则在  $x = 0$  这一点应当以什么数值作为函数的值?

解 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2},$$

所以, 应取  $f(0) = \frac{1}{2}$ , 那么,  $f(x)$  当  $x = 0$  时是连续的.

739. 证明不管怎样选取数  $f(1)$ , 函数  $f(x) = \frac{1}{1-x}$  在  $x=1$  是不连续的.

证 因为  $\lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = -\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = +\infty$ , 所以, 我们无法选择  $f(1)$  使之成为连续的.

740. 当  $x=0$  时, 函数  $f(x)$  失去意义, 定义  $f(0)$  的数值, 使得  $f(x)$  在点  $x=0$  连续, 若:

$$(a) f(x) = \frac{\sqrt[3]{1+x}-1}{\sqrt[3]{1+x}-1}; \quad (b) f(x) = \frac{\operatorname{tg} 2x}{x},$$

$$(c) f(x) = \sin x \sin \frac{1}{x}; \quad (d) f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}},$$

$$(e) f(x) = \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x^2}}; \quad (f) f(x) = x^x (x > 0),$$

$$(g) f(x) = x \ln^2 x,$$

$$\begin{aligned} \text{解 } (a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x}-1}{\sqrt[3]{1+x}-1} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{1+x} + 1)}{x(\sqrt[3]{1+x} + 1)} = \frac{3}{2}, \end{aligned}$$

取  $f(0) = \frac{3}{2}$  即行.

$$(b) f(0) = 2.$$

$$(c) \text{因为} \lim_{x \rightarrow 0} \sin x \sin \frac{1}{x} = 0, \text{故取} f(0) = 0.$$

$$(d) \text{因为} \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e, \text{故取} f(0) = e.$$

$$(e) \text{因为} \lim_{x \rightarrow 0} x^x = 1, \text{故取} f(0) = 1.$$

$$(f) \text{因为} \lim_{x \rightarrow 0} x \ln^2 x = 0, \text{故取} f(0) = 0.$$

741. 设:(a) 函数  $f(x)$  当  $x=x_0$  时是连续的, 而函数  $g(x)$  当  $x=x_0$  时是不连续的; (b) 当  $x=x_0$  时函数  $f(x)$  和  $g(x)$  二者都是不连续的, 则此二函数的和  $f(x)+g(x)$  在已知点  $x_0$  是否必为不连续的? 举出适当的例子.

解 (a)  $f(x)+g(x)$  必为不连续的. 事实上,

$$\text{设 } F(x) = f(x) + g(x)$$

对于函数  $F(x) - f(x) = g(x)$ , 如果  $F(x)$  在  $x_0$  连续, 则有  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} [F(x) - f(x)]$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} F(x) - \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = F(x_0) - f(x_0) = g(x_0).$$

因此当  $g(x)$  有意义的话, 那么  $g(x_0) = F(x_0) - f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ , 这与假设是矛盾的, 故  $F(x)$  在点  $x_0$  不连续; 若  $g(x_0)$  没有意义, 那么当然它在  $x_0$  点不连续.

(b) 不. 例如,

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \geq 0, \\ -1, & \text{当 } x < 0. \end{cases} \text{ 及 } g(x) = \begin{cases} -1, & \text{当 } x \geq 0, \\ 1, & \text{当 } x < 0. \end{cases}$$

它们在点  $x=0$  处均不连续, 但其和  $f(x)+g(x) \equiv 0$  却处处连续.

742. 设:(a) 函数  $f(x)$  在点  $x_0$  连续, 而  $g(x)$  在点  $x_0$  不连续; (b) 当  $x=x_0$  时  $f(x)$  和  $g(x)$  二者都是不连续的. 则此二函数的乘积  $f(x)g(x)$  在已知点  $x_0$  是否必为不连续? 举出适当的例子.

解 (a) 不. 例如,

$$g(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \geq 0 \\ -1, & \text{当 } x < 0 \end{cases} \text{ 及 } f(x) = 0.$$

它们满足假设条件, 其中  $f(x)$  处处连续, 而  $g(x)$  在点  $x=0$  不连续, 但  $f(x)g(x) \equiv 0$  处处连续.

(6) 不. 例如,

$$f(x)=\begin{cases} 1, & \text{当 } x \geq 0 \\ -1, & \text{当 } x < 0 \end{cases}, \text{及 } g(x)=f(x).$$

它们均在点  $x=0$  处不连续, 但其乘积  $f(x)g(x)=1$  却处处连续.

743. 可否断定不连续函数平方后仍为不连续函数? 举出处处都有不连续点的函数, 而平方后是连续函数的例子.

解 不能. 例如 742 题(6)之例.

又对于函数

$$f(x)=\begin{cases} -1, & \text{当 } x \text{ 为有理数,} \\ 1, & \text{当 } x \text{ 为无理数,} \end{cases}$$

处处不连续, 但平方后所得函数  $f^2(x)=1$  却处处连续.

744. 研究函数  $f[g(x)]$  及  $g[f(x)]$  的连续性, 设:

(a)  $f(x)=\operatorname{sgn}x$  及  $g(x)=1+x^2$ ;

(b)  $f(x)=\operatorname{sgn}x$  及  $g(x)=x(1-x^2)$ ;

(c)  $f(x)=\operatorname{sgn}x$  及  $g(x)=1+x-[x]$ .

解 (a)  $f[g(x)] \equiv 1$  处处连续;

而  $g[f(x)]=\begin{cases} 2, & x \neq 0; \\ 1, & \text{当 } x=0, \end{cases}$

在  $x=0$  点不连续.

(b) 因为  $g(x)=x(1-x^2)$  当  $x<-1$  或  $0<x<1$  时为正, 而当  $-1<x<0$  或  $x>1$  时为负, 故

$$f[g(x)] = \begin{cases} 1, & \text{当 } x < -1; \\ 0, & \text{当 } x = -1; \\ -1, & \text{当 } -1 < x < 0; \\ 0, & \text{当 } x = 0; \\ 1, & \text{当 } 0 < x < 1; \\ 0, & \text{当 } x = 1; \\ -1, & \text{当 } x > 1. \end{cases}$$

在点  $x = -1, x = 0, x = 1$  处不连续.

而  $g[f(x)] \equiv 0$  却处处连续.

(b)  $f[g(x)] \equiv 1$  处处连续.

$g[f(x)] \equiv 1$  也处处连续.

745. 设

$$f(u) = \begin{cases} u, & 0 < u \leq 1; \\ 2-u, & 1 < u < 2, \end{cases}$$

$$\text{及 } \varphi(x) = \begin{cases} x, & \text{当 } x \text{ 为有理数;} \\ 2-x, & \text{当 } x \text{ 为无理数.} \end{cases} \quad (0 < x < 1)$$

研究复合函数  $y = f(u)$  的连续性, 其中  $u = \varphi(x)$ .

解 当  $x$  为有理数时,  $u = x$ , 且  $0 < u < 1$ , 故  $f(u) = x$ ;  
当  $x$  为无理数时,  $u = 2 - x$  且  $1 < u < 2$ , 故  $f(u) = 2 - u = x$ . 从而  $f[\varphi(x)] \equiv x$  处处连续.

746. 证明若  $f(x)$  为连续函数, 则下列函数也是连续的:

$$F(x) = |f(x)|.$$

证 设  $x_0$  为任一连续点, 则对于任给的  $\epsilon > 0$ , 总存在一个正数  $\delta$ , 使当  $|x - x_0| < \delta$  时, 恒有  $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$ .

由  $||f(x) - |f(x_0)|| \leq |f(x) - f(x_0)|$  知

$$||f(x)| - |f(x_0)|| < \epsilon,$$

故  $F(x)$  在点  $x_0$  也连续.

747. 证明若函数  $f(x)$  是连续的, 则函数

$$f_c(x) = \begin{cases} -c, & \text{若 } f(x) < -c, \\ f(x), & \text{若 } |f(x)| \leq c, \\ c, & \text{若 } f(x) > c, \end{cases}$$

(式中  $c$  为任意的正数) 也是连续函数.

证 易知

$$f_c(x) = \frac{1}{2}(|c+f(x)| - |c-f(x)|).$$

于是, 利用 746 题的结果, 即知  $f_c(x)$  是连续函数.

748. 证明若函数  $f(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上连续, 则函数

$$m(x) = \inf_{a \leq \xi \leq x} \{f(\xi)\} \text{ 和 } M(x) = \sup_{a \leq \xi \leq x} \{f(\xi)\}$$

在  $[a, b]$  上也是连续的.

证 只证  $m(x)$  在  $[a, b]$  连续.  $M(x)$  连续性之证完全类似. 设  $x_0 \in [a, b]$ . 先证  $m(x)$  在点  $x_0$  右连续. 任给  $\epsilon > 0$ . 由于  $f(x)$  在点  $x_0$  连续, 故存在  $\delta > 0$ , 使当  $|x - x_0| < \delta$  时, 恒有

$$|f(x) - f(x_0)| < \epsilon.$$

于是, 当  $x_0 < x < x_0 + \delta$  时, 有

$$f(x) > f(x_0) - \epsilon \geq m(x_0) - \epsilon.$$

而当  $a \leq x \leq x_0$  时,  $f(x) \geq m(x_0) > m(x_0) - \epsilon$ , 由此可知当  $x_0 < x < x_0 + \delta$  时,  $m(x) \geq m(x_0) - \epsilon$ . 又因  $m(x)$  显然是递减的, 故

$$m(x_0) \geq m(x) \geq m(x_0) - \epsilon \quad (\text{当 } x_0 < x < x_0 + \delta \text{ 时}).$$

由此可知  $\lim_{x \rightarrow x_0+0} m(x) = m(x_0)$ , 即  $m(x)$  在  $x_0$  右连续. 下

证左连续, 不妨设  $f(x)$  在  $[a, x_0]$  的最小值在点  $x = x_0$  达到, 即  $m(x_0) = f(x_0)$  (否则, 若  $m(x_0) = f(x_1)$ ,  $a \leq x_1 <$

$x_0$ . 则显然知, 当  $x_0 < x < x_0$  时  $m(x) = m(x_0)$ , 从而左连续). 任给  $\epsilon > 0$ . 仿上述, 存在  $\delta > 0$ , 使当  $x_0 - \delta < x < x_0$  时, 恒有

$$f(x) < f(x_0) + \epsilon = m(x_0) + \epsilon,$$

因此  $m(x) < m(x_0) + \epsilon$ , 从而

$$m(x_0) \leq m(x) < m(x_0) + \epsilon \quad (\text{当 } x_0 - \delta < x < x_0 \text{ 时}).$$

由此可知  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} m(x) = m(x_0)$ , 即  $m(x)$  在  $x_0$  左连续.

证毕.

749. 证明 若函数  $f(x)$  和  $g(x)$  是连续的, 则函数

$$\varphi(x) = \min[f(x), g(x)] \text{ 和 } \psi(x) = \max[f(x), g(x)]$$

也是连续的.

证 由  $\varphi(x) = \frac{1}{2}[f(x) + g(x) - |f(x) - g(x)|]$

$$\psi(x) = \frac{1}{2}[f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|]$$

利用 746 题的结果, 即知  $\varphi(x), \psi(x)$  为连续的.

750. 设函数  $f(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上有定义并有界, 证明函数

$$m(x) = \inf_{a \leq \xi \leq x} \{f(\xi)\} \text{ 和 } M(x) = \sup_{a \leq \xi \leq x} \{f(\xi)\}$$

在闭区间  $[a, b]$  是左方连续的. 而函数

$$\bar{m}(x) = \inf_{a \leq \xi \leq x} \{f(\xi)\} \text{ 和 } \bar{M}(x) = \sup_{a \leq \xi \leq x} \{f(\xi)\}$$

在闭区间  $[a, b]$  是右方连续的\*).

证 设  $x_0 \in (a, b]$ , 要证  $m(x)$  在  $x_0$  左方连续. 由于  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有界, 故  $m(x)$  恒为有限, 任给  $\epsilon > 0$ , 必存在一点  $\xi_0 \in [a, x_0)$ , 使得

$$f(\xi_0) < m(x_0) + \epsilon.$$

于是, 当  $\xi_0 < x < x_0$  时, 必有  $m(x_0) \leq m(x) \leq f(\xi_0) < m(x_0) + \epsilon$ .

$(x_0) + \varepsilon$ , 由此可知  $\lim_{x \rightarrow x_0^-} m(x) = m(x_0)$ . 故  $m(x)$  在  $x_0$  点左方连续.

同法可证  $M(x)$  在  $[a, b]$  也为左方连续.

\* )  $\bar{m}(x)$  和  $\bar{M}(x)$  在  $[a, b]$  右方连续的结论是错误的, 今举反例以明之, 例如, 对于有界函数

$$f_1(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } a \leq x \leq p; \\ 0, & \text{当 } p < x \leq b. \end{cases}$$

$$f_2(x) = \begin{cases} -1, & \text{当 } a \leq x \leq p; \\ 0, & p < x \leq b. \end{cases}$$

分别有

$$\bar{m}(x) = f_1(x), \bar{M}(x) = f_2(x),$$

显然它们在点  $p$  不是右方连续的.

若定义  $\bar{m}(x) = \inf_{x < \xi \leq b} \{f(\xi)\}$ ,  $\bar{M}(x) = \sup_{x < \xi \leq b} \{f(\xi)\}$ , 则可证明  $\bar{m}(x)$  与  $\bar{M}(x)$  在  $[a, b]$  右方连续.

751. 证明若函数  $f(x)$  于区间  $a \leq x < +\infty$  上连续, 且有有限的  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ , 则此函数在已知区间上是有界的.

证 记  $A = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ , 取  $\varepsilon = 1$ , 则存在  $X > a$ , 使当  $x > X$  时, 恒有  $|f(x)| < |A| + 1$ , 又因  $f(x)$  在  $[a, X]$  上连续, 因而有界, 即存在常数  $M_1$ , 使当  $x \in [a, X]$  时, 恒有  $|f(x)| < M_1$ , 取  $M = \max(|A| + 1, M_1)$ , 则  $x \in [a, +\infty)$  时, 恒有

$$|f(x)| < M.$$

752. 设函数  $f(x)$  在区间  $(x_0, +\infty)$  上连续并有界, 证明对于任何数  $T$ , 可求得叙列  $x_n \rightarrow +\infty$ , 使

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n + T) - f(x_n)] = 0.$$

**证** 不妨设  $T > 0$ , 记  $g(y) = f(x_0 + (y+1)T) - f(x_0 + yT)$ ,  $y \geq 1$ . 取一数列  $\{\epsilon_n\}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ), 且当  $n \rightarrow \infty$  时,  $\epsilon_n \rightarrow 0$ . 易见,  $g(y)$  是  $[1, +\infty)$  上连续且有界的函数, 今按下法取  $x_1 = x_0 + k_1 T$ , 使  $|g(k_1)| < \epsilon_1$ . [如果  $g(1), g(2)$  异号, 则由连续函数介值定理, 存在  $k_1$ , 且  $1 < k_1 < 2$ , 使得  $|g(k_1)| = 0 < \epsilon_1$ , 这时取  $x_1 = x_0 + k_1 T$ . 若  $g(1)$  与  $g(2)$  同号, 且  $g(1), g(2), g(3), g(4) \dots$  都是同号的, 不妨设它们均大于 0, 那么我们可以证明, 必存在一个自然数  $k_1 \geq 1$ , 使  $g(k_1) < \epsilon_1$ . 因为, 若对一切自然数  $n$ ,  $g(n) \geq \epsilon_1$ , 则由  $g(y)$  的定义,

$$f(x_0 + 2T) \geq \epsilon_1 + f(x_0 + T),$$

$$f(x_0 + 3T) \geq \epsilon_1 + f(x_0 + 2T),$$

$$f(x_0 + 4T) \geq \epsilon_1 + f(x_0 + 3T),$$

.....

$$f(x_0 + nT) \geq \epsilon_1 + f[x_0 + (n-1)T].$$

则  $f(x_0 + nT) \geq (n-1)\epsilon_1 + f(x_0 + T)$ , 这与  $f(x)$  在  $(x_0, +\infty)$  内有界矛盾, 故必存在自然数  $k_1$ , 使得  $|g(k_1)| < \epsilon_1$ , 取  $x_1 = x_0 + k_1 T$ . 然后, 取自然数  $p_2 > k_1 + 1$ . 通过考虑  $g(p_2), g(p_2 + 1), \dots$  的符号; 仿上, 可取  $x_2 = x_0 + k_2 T$ ,  $k_2 > k_1 + 1$ , 使  $|g(k_2)| < \epsilon_2$ . 依此类推, 我们就可得到一数列  $\{x_n\}$  适合要求.

753. 若  $\varphi(x)$  和  $\psi(x)$  为连续周期函数, 当  $-\infty < x < +\infty$  时, 有定义且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [\varphi(x) - \psi(x)] = 0$$

证明  $\varphi(x) \equiv \psi(x)$ .

证 先证明  $\varphi(x)$  和  $\psi(x)$  的周期相同, 设  $\varphi(x)$  的周期为

$p$ , 则  $\varphi(x+p)=\varphi(x)$ , 由于当  $x \rightarrow \infty$  时,  $\varphi(x+p)-\varphi(x) \rightarrow 0$  即得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [\varphi(x) - \varphi(x+p)] = 0$$

以及

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \infty} [\psi(x) - \psi(x+p)] \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} [\varphi(x) - \psi(x+p)] - \lim_{x \rightarrow \infty} [\varphi(x) - \psi(x)] = 0. \end{aligned} \quad (1)$$

我们再来证明  $\psi(x)$  的周期也是  $p$ , 若不然, 则至少存在一个  $x_0$ , 使  $\psi(x_0) \neq \psi(x_0+p)$ . 且设  $\psi(x)$  周期为  $q$ ,  $N$  为任意正整数,  $x=x_0+Nq$ , 以及  $\alpha=|\psi(x_0)-\psi(x_0+p)|>0$ , 此时恒有  $|\psi(x)-\psi(x+p)|=\alpha$ . 但由(1)式, 对充分大的  $x$ , 必成立  $|\psi(x)-\psi(x+p)|<\alpha$ , 这显然是矛盾的.

最后证明  $\varphi(x) \equiv \psi(x)$ , 若结论不成立, 则至少存在一个  $x_1$ , 使  $\varphi(x_1) \neq \psi(x_1)$ . 记  $\beta=|\varphi(x_1)-\psi(x_1)|>0$ , 则对任意  $x=x_1+Np$ , 恒有  $|\varphi(x)-\psi(x)|=\beta$ , 这与  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\varphi(x)-\psi(x)] = 0$  矛盾. 于是,  $\varphi(x) \equiv \psi(x)$ . 证毕.

754. 证明单调有界函数的一切不连续点皆为第一类的不连续点.

证 不妨设  $f(x)$  为单调增函数, 取其定义域  $A$  中的任意点  $x_0$ , 且设  $x_0$  不是  $A$  的左端点, 由于  $x < x_0$  时显然有  $f(x) \leq f(x_0)$ . 由关于单调函数的极限定理知  $f(x_0-0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \leq f(x_0)$ . 可见若  $f(x)$  在  $x_0$  点不连续, 则函数在该点只可能有跃度, 即第一类间断点.

755. 证明若函数  $f(x)$  具有下列诸性质: (1) 在闭区间  $[a, b]$  上有定义且单调, (2) 取介于  $f(a)$  和  $f(b)$  之间所有的数作

为其函数值，则此函数在  $[a, b]$  上连续。

证 用反证法，不妨设单调函数  $f(x)$  为递增的且在  $x_0$  间断 ( $x_0 \in [a, b]$ )，由 754 题知  $x_0$  只能是第一类间断点，则  $f(x_0) - f(x_0 - 0)$  及  $f(x_0 + 0) - f(x_0)$  中至少有一个大于零，例如  $f(x_0) - f(x_0 - 0) > 0$ 。于是，由函数  $f(x)$  的单调性知， $f(x)$  无法取到  $f(x_0 - 0)$  和  $f(x_0)$  之间的数值。

这与题设函数  $f(x)$  的性质(2)矛盾，从而  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续。

### 756. 证明：函数

$$f(x) = \sin \frac{1}{x-a}, \text{ 若 } x \neq a \text{ 及 } f(a) = 0,$$

在任意闭区间  $[a, b]$  上取介于  $f(a)$  和  $f(b)$  之间的一切中介值，但在  $[a, b]$  上并不连续。

证 事实上，只要  $a < b$ ，则  $f(x)$  在  $[a, b]$  上取  $[-1, 1]$  之间的一切值，当然更取  $f(a) = 0$  与  $f(b)$  ( $|f(b)| \leq 1$ ) 之间的一切值。但显然有  $f(x)$  在  $x=a$  处不连续。

### 757. 证明：若函数 $f(x)$ 在区间 $(a, b)$ 内连续，且 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为此区间中的任意值，则在它们之间可找到一个数值 $\xi$ ，使得

$$f(\xi) = \frac{1}{n} [f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)]$$

证 不妨设  $a < x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n < b$ ，此时设  $x_1 \neq x_n$ ；当  $x_1 = x_n$  结论显然成立。

由于  $f(x)$  在  $[x_1, x_n]$  上连续，于是， $f(x)$  在  $[x_1, x_n]$  上取得最大值和最小值：

$$m \leq f(x) \leq M, \quad x \in [x_1, x_n].$$

从而有

$$m \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) \leq M.$$

由连续函数的性质, 总存在  $\xi \in [x_1, x_n]$ , 使

$$f(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i).$$

758. 设函数  $f(x)$  在区间  $(a, b)$  上连续, 且

$$l = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) \text{ 及 } L = \overline{\lim}_{x \rightarrow a+0} f(x).$$

证明对于任意的数  $\lambda$ , 此处  $l \leq \lambda \leq L$ , 则有叙列  $x_n \rightarrow a+0$  ( $n=1, 2, \dots$ ), 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lambda.$$

证 当  $\lambda = l$  或  $\lambda = L$  时结论都是显然的. 因此设

$$l < \lambda < L.$$

由条件有  $\{a_n\}$  及  $\{b_n\}$ ,  $a_n \rightarrow a+0$ ,  $b_n \rightarrow a+0$ ,  
且  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = l$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) = L$ .

于是, 存在自然数  $N$ , 使当  $n > N$  时, 恒有

$$f(a_n) < \lambda \text{ 及 } f(b_n) > \lambda.$$

再由  $f(x)$  的连续性知, 在  $a_n$  及  $b_n$  之间存在  $x_n$ , 使

$$f(x_n) = \lambda (n > N).$$

这样选取的  $\{x_n\}$ , 由于  $a_n \rightarrow a+0$ ,  $b_n \rightarrow a+0$ , 故  $x_n \rightarrow a+0$ , 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lambda.$$

## § 8. 反函数. 用参数表示的函数

1° 反函数的存在及其连续性 若函数  $y=f(x)$  具有下列性质:

在区间 $(a, b)$ 上有定义并连续；(2)在严格的意义上说来，于此区间上是单调的，则有单值的反函数 $x = f^{-1}(y)$ ，此函数在区间 $(A, B)$ 上有定义并连续，而且在严格的意义上说来，是相应地单调的，其中

$$A = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) \text{ 和 } B = \lim_{x \rightarrow b-0} f(x).$$

任何一个单值连续函数 $x = g(y)$ ，它在其有定义的最大区域上适合方程 $f(g(y)) = y$ ，则被了解为已知连续函数 $y = f(x)$ 的多值反函数的一个单值连续分枝。

2°以参数表示的函数的连续性 若函数 $\varphi(t)$ 和 $\psi(t)$ 在区间 $(a, \beta)$ 上有定义并且是连续的，且函数 $\varphi(t)$ 在此区间上是严格地单调的，则方程组

$$x = \varphi(t), y = \psi(t)$$

在区间 $(a, b)$ 上把 $y$ 定义成 $x$ 的单值连续函数：

$$y = \psi[\varphi^{-1}(x)],$$

其中  $a = \lim_{t \rightarrow a+0} \varphi(t)$  及  $b = \lim_{t \rightarrow \beta-0} \varphi(t)$ .

### 759. 求线性分式函数

$$y = \frac{ax+b}{cx+d} (ad - bc \neq 0)$$

的反函数，在怎样的情形下，反函数与已知函数相同？

解 由  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  解之得反函数为

$$y = \frac{-dx+b}{cx-a} \text{ 或写成 } x = \frac{-yd+b}{yc-a}.$$

欲反函数与已知函数相同，只须

$$\frac{ax+b}{cx+d} = \frac{-xd+b}{yc-a}.$$

解之得  $a+d=0$ ，

此即所求的条件。

### 760. 设

$$y = x + [x],$$

求反函数  $x=x(y)$ .

解 若当  $k \leq x < k+1$ , 即当

$$2k \leq y < 2k+1$$

时,  $[x]=k$  ( $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ), 此时  $y=x+k$ , 即反函数为  $x=y-k$ .

761. 证明: 有唯一的连续函数  $y=y(x)$  ( $-\infty < x < +\infty$ ) 满足于克卜勒方程

$$y - \epsilon \sin y = x \quad (0 \leq \epsilon < 1).$$

证 由 640 题知叙列

$$y_0 = x,$$

$$y_1 = x + \epsilon \sin y_0,$$

$$y_2 = x + \epsilon \sin y_1,$$

.....

$$y_n = x + \epsilon \sin y_{n-1},$$

.....

的极限  $y(x)$  为克卜勒方程  $y - \epsilon \sin y = x$  的唯一的根.

现在证明  $y=y(x)$  是连续的. 我们只须证明当  $x \rightarrow x_0$  时,  $y(x) \rightarrow y(x_0)$ . 为此, 我们考虑

$$\begin{aligned} & |y_n(x) - y_n(x_0)| \\ &= |(x - x_0) + \epsilon [\sin y_{n-1}(x) - \sin y_{n-1}(x_0)]| \\ &\leq |x - x_0| + \epsilon |y_{n-1}(x) - y_{n-1}(x_0)|. \end{aligned}$$

逐次应用此不等式, 即得

$$\begin{aligned} & |y_n(x) - y_n(x_0)| \\ &\leq |x - x_0| (1 + \epsilon + \epsilon^2 + \dots + \epsilon^{n-1} + \epsilon^n) \\ &= |x - x_0| \cdot \frac{1 - \epsilon^{n+1}}{1 - \epsilon} \leq \frac{1}{1 - \epsilon} |x - x_0|. \end{aligned}$$

令  $n \rightarrow \infty$ , 便有

$$|y(x) - y(x_0)| \leq \frac{1}{1-\epsilon} |x - x_0| (0 \leq \epsilon < 1).$$

于是, 显然有  $\lim_{x \rightarrow x_0} y(x) = y(x_0)$ . 这就证明了  $y(x)$  的连续性.

### 762. 证明: 方程

$$\operatorname{ctg} x = kx$$

对于每一个实数  $k$  ( $-\infty < k < +\infty$ ) 在区间  $0 < x < \pi$  中有唯一连续的根  $x = x(k)$ .

证 令  $f(x) = \frac{\operatorname{ctg} x}{x}$ . 显然, 在  $(0, \pi)$  上  $\operatorname{ctg} x$  和  $\frac{1}{x}$  都是连续的严格减函数, 从而  $f(x)$  在  $(0, \pi)$  上也是连续的严格减函数, 并且, 很明显

$$\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x) = -\infty.$$

由此可知, 对每一实数  $k$  ( $-\infty < k < +\infty$ ), 恰有一个  $x \in (0, \pi)$ , 使  $f(x) = k$ , 即  $\operatorname{ctg} x = kx$ . 另外, 由于  $f(x) = \frac{\operatorname{ctg} x}{x}$  在  $(0, \pi)$  上是连续的严格减函数, 故  $k = f(x)$  的反函数  $x = x(k) = f^{-1}(k)$  存在而且是  $-\infty < k < +\infty$  上的连续的严格减函数. 此  $x = x(k)$  即方程  $\operatorname{ctg} x = kx$  的根.

综上述, 可知: 对任何  $-\infty < k < +\infty$ , 方程  $\operatorname{ctg} x = kx$  在  $(0, \pi)$  上具有唯一的根  $x = x(k)$ , 而且  $x(k)$  是  $k$  ( $-\infty < k < +\infty$ ) 的连续的严格减函数. 证毕.

### 763. 非单调的函数 $y = f(x)$ ( $-\infty < x < +\infty$ ) 可否有单值的反函数?

解 可以, 例如函数

$$y = \begin{cases} x, & \text{若 } x \text{ 为有理数,} \\ -x, & \text{若 } x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

在区间  $(-\infty, +\infty)$  上为单值的, 但不是单调的函数, 而其反函数仍为此函数本身.

764. 在甚么情形下, 函数  $y=f(x)$  和反函数  $x=f^{-1}(y)$  是同一的函数?

**解** 为统一坐标起见, 我们把  $y=f(x)$  的反函数记成为  $y=f^{-1}(x)$ .

按题设应有

$$f^{-1}(x) = f(x),$$

即  $x = f(f(x))$ , 这就是所求的条件.

765. 证明不连续函数

$$y = (1+x^2)\operatorname{sgn} x$$

的反函数是连续函数.

**证** 易见  $\operatorname{sgn} y = \operatorname{sgn} x$  及  $\operatorname{sgn}^2 x = \begin{cases} 1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ , 则

$y \operatorname{sgn} y = (1+x^2) \operatorname{sgn}^2 x$ . 于是反函数在  $|y| \geq 1$  及  $y=0$  有定义:

$$x = \begin{cases} \sqrt{y \operatorname{sgn} y - 1}, & \text{当 } y \geq 1 \text{ 时;} \\ -\sqrt{y \operatorname{sgn} y - 1}, & \text{当 } y \leq -1 \text{ 时;} \\ 0, & \text{当 } y = 0 \text{ 时.} \end{cases}$$

易见上述函数在其定义域内连续.

766. 证明: 若函数  $f(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上有定义并且是严格地单调的, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a) \quad (a \leq x_n \leq b),$$

则  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ .

**证** 不妨设函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  上严格单调下降. 如果结论不真, 则在  $(a, b)$  内总存在一个  $a_1$  及叙列  $\{x_n\}$  的一个子列  $\{x_{n_k}\}$ , 使

$$x_{n_k} > a_1.$$

由于  $f(x)$  严格单调下降, 故有

$$f(x_{n_k}) < f(a_1) < f(a).$$

于是,  $f(a) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) \leq f(a_1)$ , 得出矛盾,

因此, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

求下列函数的反函数的连续的单值枝:

767.  $y = x^2$ .

**解** 反函数的单值连续分枝为

$$x = \sqrt{y} \quad (0 \leq y < +\infty)$$

$$\text{及 } x = -\sqrt{y} \quad (0 \leq y < +\infty).$$

768.  $y = 2x - x^2$ .

**解** 由于  $x^2 - 2x + y = 0$ , 故

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4y}}{2} = 1 \pm \sqrt{1 - y}.$$

于是单值连续分枝为

$$x = 1 - \sqrt{1 - y} \quad \text{及} \quad x = 1 + \sqrt{1 - y} \quad (-\infty < y \leq 1).$$

769.  $y = \frac{2x}{1+x^2}$ .

**解** 由于  $x^2 y + 2x + y = 0$ , 故

$$x = \begin{cases} \frac{1 \pm \sqrt{1 - y^2}}{y}, & \text{当 } y \neq 0 \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } y = 0 \text{ 时.} \end{cases}$$

又由于

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-y^2}}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2}{y(1 + \sqrt{1-y^2})} = 0,$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 + \sqrt{1-y^2}}{y} = \infty,$$

故反函数的连续分支为

$$x = \frac{1 - \sqrt{1-y^2}}{y} \quad (-1 \leq y \leq 1)$$

$$\text{及 } x = \frac{1 + \sqrt{1-y^2}}{y} \quad (0 < |y| \leq 1).$$

770.  $y = \sin x$ .

**解** 单值连续分枝为

$$x = (-1)^k \arcsin y + k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$(|y| \leq 1).$$

771.  $y = \cos x$ .

**解** 单值连续分枝为

$$x = 2k\pi \pm \arccos y \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \quad (|y| \leq 1).$$

772.  $y = \operatorname{tg} x$ .

**解** 单值连续分枝为

$$x = \operatorname{arctg} y + k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$(-\infty < y < +\infty).$$

773. 证明连续函数  $y = 1 + \sin x$  对应于区间  $0 < x < 2\pi$  的值的集合是一线段.

**证** 显然, 当  $x \in (0, 2\pi)$  时,  $-1 \leq \sin x \leq 1$ , 从而  $0 \leq 1 + \sin x \leq 2$ . 而由于  $y|_{x=\frac{\pi}{2}} = 2$ ,  $y|_{x=\frac{3\pi}{2}} = 0$ . 而  $y = 1 + \sin x$  是  $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$  上的连续函数, 故由介值定理知当  $x$  从  $\frac{\pi}{2}$  变到  $\frac{3\pi}{2}$  时,  $y$  取 0 到 2 之间的一切数值. 由此可知当  $0 < x <$

$2\pi$  时,  $y$  的值的集合是线段  $[0, 2]$ .

### 774. 证明等式

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}.$$

证 令  $\varphi = \arcsin x$ , 则得  $\sin \varphi = x$ , 从而

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = \sin \varphi = x.$$

因为  $-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ , 故  $0 \leq \frac{\pi}{2} - \varphi \leq \pi$ ; 而在  $[0, \pi]$  内有唯一的数, 它的余弦等于  $x$ . 因此, 得

$$\frac{\pi}{2} - \varphi = \arccos x,$$

即

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}.$$

### 775. 证明等式

$$\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn} x \quad (x \neq 0).$$

证 当  $x > 0$  时, 令  $\varphi = \operatorname{arctg} x$ , 则得  $\operatorname{tg} \varphi = x$ , 且  $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$ . 又  $\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = \operatorname{tg} \varphi = x$ , 故

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = \frac{1}{x}.$$

因为  $0 < \frac{\pi}{2} - \varphi < \frac{\pi}{2}$ , 而在  $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$  内仅有唯一的数, 使其正切等于  $\frac{1}{x}$ , 故

$$\frac{\pi}{2} - \varphi = \operatorname{arctg} \frac{1}{x},$$

即当  $x > 0$  时,  $\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ .

当  $x < 0$  时, 令  $\varphi = \operatorname{arctg} x$ , 则得  $\operatorname{tg} \varphi = x$ , 且  $-\frac{\pi}{2} < \varphi <$

0. 又

$$\operatorname{ctg}\left(-\frac{\pi}{2}-\varphi\right)=\operatorname{tg}\varphi=x, \text{ 即 } \operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{2}-\varphi\right)=\frac{1}{x},$$

因为  $-\frac{\pi}{2} < -\frac{\pi}{2}-\varphi < 0$ , 而在  $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$  内有唯一的数, 使其正切等于  $\frac{1}{x}$ , 故

$$-\frac{\pi}{2}-\varphi=\operatorname{arctg}\frac{1}{x},$$

即当  $x < 0$  时,  $\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}$ .

总之, 当  $x \neq 0$  时,

$$\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn} x.$$

### 776. 证明反正切相加的定理:

$$\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} y = \operatorname{arctg} \frac{x+y}{1-xy} + \epsilon\pi,$$

式中  $\epsilon = \epsilon(x, y)$  为取值: 0, 1, -1 三者之一的函数.

当已知  $x$  的值时, 对于怎样的  $y$  值, 函数  $\epsilon$  可能不连续? 在  $Oxy$  平面上作出函数  $\epsilon$  连续的对应域, 并求此函数在所求得的域内的数值.

证 由于

$$-\frac{\pi}{2} < \operatorname{arctg} y < \frac{\pi}{2} \text{ 及 } -\frac{\pi}{2} < \operatorname{arctg} x < \frac{\pi}{2},$$

故有

$$-\pi < \operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} y < \pi.$$

若  $x$  和  $y$  的符号相反, 则

$$-\frac{\pi}{2} < \operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} y < \frac{\pi}{2}.$$

若  $x > 0$  和  $y > 0$ , 则

$$0 < \arctg x + \arctg y < \pi.$$

再看这个和是位于  $(0, \frac{\pi}{2})$  还是  $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ . 条件

$$0 < \arctg x + \arctg y < \frac{\pi}{2},$$

即

$$\arctg x < \frac{\pi}{2} - \arctg y,$$

它相当于  $x < \tg\left(\frac{\pi}{2} - \arctg y\right) = \tg(\operatorname{arcctg} y) = \frac{1}{y}$ ,

也即  $xy < 1$ .

因此, 当  $x > 0, y > 0, xy < 1$  时, 此和位于  $(0, \frac{\pi}{2})$ . 同法可证, 当  $x > 0, y > 0, xy > 1$  时, 此和位于  $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ .

仿此, 又可证得: 当  $x < 0, y < 0, xy < 1$  时, 此和位于  $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ ; 当  $x < 0, y < 0, xy > 1$  时, 此和位于  $(-\pi, -\frac{\pi}{2})$ .

总之, 若  $xy < 1$ , 则此和位于  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ; 若  $x > 0, xy > 1$ , 则此和位于  $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ ; 若  $x < 0, xy > 1$ , 则此和位于  $(-\pi, -\frac{\pi}{2})$ .

其次, 我们考虑此和的正切

$$\tg(\arctg x + \arctg y) = \frac{x+y}{1-xy}.$$

现令  $u = \arctg x + \arctg y, v = \arctg \frac{x+y}{1-xy}$ , 则得

$$\operatorname{tg} u = \operatorname{tg} v.$$

因为  $-\frac{\pi}{2} < v < \frac{\pi}{2}$ , 故当  $-\frac{\pi}{2} < u < \frac{\pi}{2}$  时,  $u = v$ ; 当  $\frac{\pi}{2} < u < \pi$  时,  $v + \pi = u$ ; 当  $-\pi < u < -\frac{\pi}{2}$  时,  $u = -\pi + v$ . 因此, 我们证得:

$$\arctg x + \arctg y = \begin{cases} \arctg \frac{x+y}{1-xy}, & \text{若 } xy < 1; \\ \pi + \arctg \frac{x+y}{1-xy}, & \text{若 } x > 0, xy > 1; \\ -\pi + \arctg \frac{x+y}{1-xy}, & \text{若 } x < 0, xy > 1; \end{cases}$$




图 1.313

当  $x$  固定时, 若  $y = \frac{1}{x}$ , 则  $\epsilon$  不连续, 因为此时(例如设  $x > 0$ ), 当  $y > \frac{1}{x}$  时  $\epsilon = 1$ , 而当  $y < \frac{1}{x}$  时  $\epsilon = 0$ .

如图 1.313 所示, 曲线  $xy=1$  为函数  $\epsilon=\epsilon(x,y)$  的不连续域.

当  $xy < 1$  时,  $\epsilon = 0$ ; 当  $x > 0, xy > 1$  时,  $\epsilon = 1$ ; 当  $x < 0, xy > 1$  时,  $\epsilon = -1$ .

777. 证明反正弦相加的定理:

$$\arcsin x + \arcsin y = (-)^{\epsilon} \arcsin(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}) + \epsilon\pi$$

$$(|x| \leq 1, |y| \leq 1),$$

式中, 若  $xy \leq 0$  或  $x^2 + y^2 \leq 1$ ,  $\epsilon = 0$ ; 若  $xy > 0$  及  $x^2 + y^2 > 1$ ,  $\epsilon = \operatorname{sgn} x$ .

证 令  $u = \arcsin x + \arcsin y$  ( $|x| \leq 1, |y| \leq 1$ ),  
即得

$$\sin u = x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}.$$

由此, 还不能断定

$$u = \arcsin(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}).$$

事实上,  $u$  及  $v = \arcsin(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2})$  可以位在不同的区间内, 其中  $v$  始终位在  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  内, 而  $u$  可有三种情形:

情形 I:  $-\frac{\pi}{2} \leq u \leq \frac{\pi}{2}$ .

若  $xy \leq 0$ , 则不是  $0 \leq x \leq 1$  及  $-1 \leq y \leq 0$  就是  $-1 \leq x \leq 0$  及  $0 \leq y \leq 1$ , 不论哪一种情况, 总有

$$0 \leq \arcsin x \leq \frac{\pi}{2} \text{ 及 } -\frac{\pi}{2} \leq \arcsin y \leq 0 \text{ (或交换)}$$

因而

$$-\frac{\pi}{2} \leq \arcsin x + \arcsin y = u \leq \frac{\pi}{2}.$$

若  $x>0, y>0$  时, 显然有  $u\geq 0$ , 条件  $u\leq \frac{\pi}{2}$

即

$$u = \arcsin x + \arcsin y \leq \frac{\pi}{2},$$

相当于

$$\arcsin x \leq \frac{\pi}{2} - \arcsin y = \arccos y.$$

由于正弦在第一象限内是增函数, 故这又相当于

$$\sin(\arcsin x) \leq \sin(\arccos y),$$

或  $x \leq \sqrt{1-y^2}$ , 即  $x^2 + y^2 \leq 1$ .

同法可证, 若  $x<0, y<0$  时, 必  $u\leq 0$ . 且条件  $-\frac{\pi}{2}\leq u$  相当于  $x^2 + y^2 \leq 1$ .

情形 I :  $\frac{\pi}{2} < u \leq \pi$ .

在  $\frac{\pi}{2} < u \leq \pi$  时, 必  $x>0, y>0$ . 条件

$$\frac{\pi}{2} < \arcsin x + \arcsin y \leq \pi,$$

即

$$\arcsin x > \frac{\pi}{2} - \arcsin y,$$

两端取正弦, 即得  $x^2 + y^2 > 1$ .

情形 II :  $-\pi \leq u < -\frac{\pi}{2}$ ,

在这种情形下必  $x<0, y<0$ . 条件

$$-\pi \leq \arcsin x + \arcsin y < -\frac{\pi}{2},$$

即

$$\frac{\pi}{2} < \arcsin(-x) + \arcsin(-y) \leq \pi,$$

因此,即  $x^2+y^2>1$ .

总之,当  $xy \leq 0$  或  $xy > 0$  但  $x^2+y^2 \leq 1$  时,必有  $-\frac{\pi}{2} \leq u \leq \frac{\pi}{2}$ ; 当  $x > 0, y > 0, x^2+y^2 > 1$  时,必  $\frac{\pi}{2} < u \leq \pi$ ; 当  $x < 0, y < 0, x^2+y^2 > 1$  时,必  $-\pi \leq u < -\frac{\pi}{2}$ .

但当  $-\frac{\pi}{2} \leq u \leq \frac{\pi}{2}$  时,  $u = v$ ; 当  $\frac{\pi}{2} < u \leq \pi$  时,  $u = \pi - v$ ; 当  $-\pi \leq u < -\frac{\pi}{2}$  时,  $u = -\pi - v$ .

因此,最后得

$$\begin{aligned} & \arcsin x + \arcsin y \\ &= \begin{cases} \arcsin(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}), \\ \text{若 } xy \leq 0 \text{ 或 } x^2+y^2 \leq 1; \\ \pi - \arcsin(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}), \\ \text{若 } x > 0, y > 0, x^2+y^2 > 1; \\ -\pi - \arcsin(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}), \\ \text{其 } x < 0, y < 0, x^2+y^2 > 1. \end{cases} \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} & \arcsin x + \arcsin y \\ &= (-1)^\epsilon \arcsin(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}) + \epsilon\pi, \\ \text{其中 } \epsilon &= \begin{cases} 0, \text{若 } xy \leq 0 \text{ 或 } x^2+y^2 \leq 1; \\ \operatorname{sgn} x, \text{若 } xy > 0 \text{ 及 } x^2+y^2 > 1, \\ \quad (|x| \leq 1, |y| \leq 1). \end{cases} \end{aligned}$$

778. 证明反余弦相加的定理:

$$\begin{aligned} & \arccos x + \arccos y \\ &= (-1)^\epsilon \arccos(xy - \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}) + 2\epsilon\pi \end{aligned}$$

$$(|x| \leq 1, |y| \leq 1),$$

其中,若  $x+y \geq 0, \epsilon=0$ ; 若  $x+y < 0, \epsilon=1$ .

证 由基本的不等式

$$0 \leq \arccos x \leq \pi \quad \text{及} \quad 0 \leq \arccos y \leq \pi,$$

有  $0 \leq \arccos x + \arccos y \leq 2\pi.$

若  $0 \leq \arccos x + \arccos y \leq \pi,$

则  $\arccos x \leq \pi - \arccos y.$

由于  $\arccos x$  及  $\pi - \arccos y$  都含在  $(0, \pi)$  内, 而在此区间内余弦是减函数, 故有

$$x \geq \cos(\pi - \arccos y) = -y,$$

即

$$x + y \geq 0$$

同法可证得, 若

$$\pi < \arccos x + \arccos y \leq 2\pi,$$

则

$$x + y < 0.$$

又由于

$$\cos(\arccos x + \arccos y) = xy - \sqrt{1-x^2} \cdot \sqrt{1-y^2},$$

故知

$$u = \arccos x + \arccos y$$

及  $v = \arccos(xy - \sqrt{1-x^2} \cdot \sqrt{1-y^2})$

有同一的余弦. 因  $v$  始终在 0 与  $\pi$  之间, 故知:

若  $0 \leq u \leq \pi$ , 则  $u = v$ ; 若  $\pi < u \leq 2\pi$ , 则  $u = 2\pi - v$ .

因此, 最后得

$$\arccos x + \arccos y$$

$$= \begin{cases} \arccos(xy - \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}), \\ \text{若 } x+y \geq 0; \\ 2\pi - \arccos(xy - \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}), \\ \text{若 } x+y < 0, \end{cases}$$

此即所欲证明的公式.

### 779. 作函数的图形:

$$(a) y = \arcsin x - \arcsin \sqrt{1-x^2};$$

$$(b) y = \arcsin 2x\sqrt{1-x^2} - 2\arcsin x.$$

解 (a) 利用 777 题的结果得知:

由于  $x^2 + (-\sqrt{1-x^2})^2 = 1$ , 故

$$\begin{aligned} y &= \arcsin x + \arcsin(-\sqrt{1-x^2}) \\ &= \arcsin(x\sqrt{1-(1-x^2)}) - \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-x^2} \\ &= \arcsin(x|x|-1+x^2). \end{aligned}$$

当  $-1 \leq x \leq 0$  时,  $y = -\frac{\pi}{2}$ ; 当  $0 < x \leq 1$  时,  $y = \arcsin(2x^2-1)$ . 可以证明,

$$\arcsin(2x^2-1) - 2\arcsin x = -\frac{\pi}{2}, \text{故有}$$

$$y = \begin{cases} -\frac{\pi}{2}, & \text{当 } -1 \leq x \leq 0 \text{ 时,} \\ 2\arcsin x - \frac{\pi}{2}, & \text{当 } 0 < x \leq 1 \text{ 时,} \end{cases}$$

如图 1·314 所示.

(b) 由于

$$2\arcsin x = \arcsin x + \arcsin x$$

$$= \begin{cases} \arcsin(2x\sqrt{1-x^2}), & \text{若 } |x| \leq \frac{1}{\sqrt{2}}; \\ \pi \operatorname{sgn} x - \arcsin(2x\sqrt{1-x^2}), & \text{若 } |x| > \frac{1}{\sqrt{2}}, \end{cases}$$

故当  $-1 \leq x < -\frac{1}{\sqrt{2}}$  时,  $y = -(\pi + 4\arcsin x)$ ;

当  $-\frac{1}{\sqrt{2}} \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$  时,  $y = 0$ ;

当  $\frac{1}{\sqrt{2}} < x \leq 1$  时,  $y = \pi - 4\arcsin x$ .

如图 1·315 所示。




图 1·314




图 1·315

780. 函数  $y = y(x)$  由下面的方程给出:

$$x = \operatorname{arc} \operatorname{tgt}, y = \operatorname{arc} \operatorname{ctg} t \quad (-\infty < t < +\infty),$$

求此函数. 在怎样的域上此函数才有定义?

解 由条件  $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ,  $0 < y < \pi$  且

$$\operatorname{tgt} x = t, \operatorname{ctg} y = t,$$

即得

$$\operatorname{ctgy} = \operatorname{tg} x = \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} - x\right),$$

从而当  $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$  时, 有

$$y = \frac{\pi}{2} - x.$$

781. 设

$$x = \operatorname{cht}, y = \operatorname{sht} \quad (-\infty < t < +\infty).$$

参数  $t$  变化的域怎样, 即可视变数  $y$  为变数  $x$  的单值函数? 求在各个域上  $y$  的表示式.

解 由于  $x = \operatorname{cht}$ ,  $y = \operatorname{sht}$ , 故

$$x^2 - y^2 = \operatorname{ch}^2 t - \operatorname{sh}^2 t = 1.$$

当  $\operatorname{sht} = \frac{e^t - e^{-t}}{2} \geq 0$  时, 即  $e^t \geq e^{-t}$  或  $e^{2t} \geq 1$  或  $t \geq 0$  时,

$$y = \sqrt{x^2 - 1};$$

当  $t \leq 0$  时,  $y = -\sqrt{x^2 - 1}$ .

不论  $t$  为何值,  $x \geq 1$ , 故  $\sqrt{x^2 - 1}$  有意义.  $t = 0$  是函数  $y = y(x)$  单值区域的分界值.

782. 要使方程组

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t)$$

把  $y$  定义为  $x$  的单值函数的必要而且充分的条件是什么?

解 其必要而且充分的条件为, 使  $\varphi(t) = x$  的一切  $t$  值, 函数  $\psi(t)$  应有同一的值. 下面加以证明. 先证必要性. 若不然, 则存在  $x^*$  及  $t_1 \neq t_2$ , 使

$$\varphi(t_1) = \varphi(t_2) = x^* \text{ 且 } \psi(t_1) \neq \psi(t_2).$$

于是, 对于这样的  $x^*$ , 一方面有  $y_1 = \psi(t_1)$  及  $y_2 = \psi(t_2)$ ,

另一方面又有  $y_1 \neq y_2$ , 这样  $y$  就不定义为  $x$  的单值函数. 因此, 使  $\varphi(t) = x$  的一切  $t$  值,  $\psi(t)$  应有同一的值.

再证充分性. 设所述条件满足, 则对于任一  $x^* \in \{\varphi(t)\}$ , 有  $t^*$  使

$$\varphi(t^*) = x^*, \quad \psi(t^*) = y^*$$

有意义, 这样定义的函数  $y = y(x)$  不因  $t^*$  的不同选取而不同, 因此它由  $x^*$  唯一确定, 从而  $y$  定义为  $x$  的单值函数.

### 783. 在怎样的条件下, 二方程组

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t) \quad (a < t < b)$$

$$\text{及 } x = \varphi(\chi(\tau)), y = \psi(\chi(\tau)) \quad (a < \tau < \beta)$$

定义出同一的函数  $y = y(x)$ ?

**解** 当  $a < \tau < \beta$  时, 函数  $\chi(\tau)$  的值的集应为区间  $(a, b)$ .

### 784. 设函数 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 在区间 $(a, b)$ 内有定义并且是连续的, 且

$$A = \inf_{a < x < b} \varphi(x), \quad B = \sup_{a < x < b} \varphi(x).$$

在怎样的条件下, 有定义在区间  $(A, B)$  上的单值函数  $f(x)$ , 使得

当  $a < x < b$  时,  $\psi(x) = f(\varphi(x))$ ?

**解** 显然, 要求对于使  $\varphi(x) = u$  的一切  $x$  值(其中  $u$  为区间  $(A, B)$  中的任一给定的数), 函数  $\psi(x)$  应取同一的值. 满足了这个条件就可以了. 这时, 对  $u \in (A, B)$  可定义

$$f(u) = \psi(x),$$

其中  $x$  为满足  $\varphi(x) = u$  ( $a < x < b$ ) 的任何数. 上述条件

保证了这样定义的  $f(u)$  是单值的.

### § 9. 函数的一致连续性

1° 一致连续性的定义 若对于每一个  $\epsilon > 0$  都存在有  $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ , 且对于使  $f(x)$  有意义的任何数值  $x' x'' \in X$ , 由不等式

$$|x' - x''| < \delta$$

可得不等式

$$|f(x') - f(x'')| < \epsilon,$$

则称函数  $f(x)$  在已知集合(区间、线段等)  $X = \{x\}$  上为一致连续的.

2° 康托尔定理 在有界的闭区间  $[a, b]$  上有定义的连续函数  $f(x)$  在此闭区间上一致连续.

785. 某工厂的车间制造正方形薄板, 其边  $x$  可取由 1 厘米到 10 厘米之间的值. 为了使不论何种边长(在上述的范围内) 的薄板的面积  $y$  与原设计的面积差皆小于  $\epsilon$ , 问可以多大的公差  $\delta$  对这些薄板的边长加工, 设(a)  $\epsilon = 1$  平方厘米; (b)  $\epsilon = 0.01$  平方厘米; (c)  $\epsilon = 0.0001$  平方厘米, 计算  $\delta$  的值.

解  $y = x^2$ . 由于,

$|x'^2 - x''^2| = |x' - x''||x' + x''| \leq 20|x' - x''|$ ,  
于是对于任给的  $\epsilon > 0$ , 要  $|x'^2 - x''^2| < \epsilon$  时, 只要  $|x' - x''| < \frac{\epsilon}{20}$  即可.

于是, 在加工薄板边长时, 只要取公差  $\delta \leq \frac{\epsilon}{20}$ , 当  $|x' - x''| < \delta$  时, 即可满足要求.

(a) 当  $\epsilon = 1$  厘米<sup>2</sup> 时,  $\delta \leq \frac{1}{20} = 0.05$  厘米 = 0.5 毫米;

(b) 当  $\epsilon = 0.01$  厘米<sup>2</sup> 时,  $\delta \leq \frac{0.01}{20} = 0.0005$  厘米  
= 0.005 毫米;

(c) 当  $\epsilon = 0.0001$  厘米<sup>2</sup> 时,  $\delta \leq \frac{0.0001}{20}$   
= 0.000005 厘米 = 0.00005 毫米.

786.<sup>+</sup> 圆柱形鞘筒之宽度为  $\epsilon$ , 长度为  $\delta$ , 将鞘筒套在曲线  $y = \sqrt[3]{x}$  上且沿此曲线滑动, 但筒之轴须保持平行于  $Ox$  轴. 为了使此筒顺利地经过此曲线上由不等式  $-10 \leq x \leq 10$  所限定的部分, 问  $\delta$  应等于甚么? 设 (a)  $\epsilon = 1$ ; (b)  $\epsilon = 0.1$ ; (c)  $\epsilon = 0.001$ ; (d)  $\epsilon$  为任意小数.

解  $y = \sqrt[3]{x}$ . 对于  $y' \neq y''$ , 由于

$$\begin{aligned}|y' - y''| &= \left| \frac{y'^3 - y''^3}{y'^2 + y'y'' + y''^2} \right| \\&= \left| \frac{y'^3 - y''^3}{\frac{3}{4}(y' + y'')^2 + \frac{1}{4}(y' - y'')^2} \right| \\&\leq \frac{|y'^3 - y''^3|}{\frac{1}{4}|y' - y''|^2}\end{aligned}$$

即

$$\frac{1}{4}|y' - y''|^3 \leq |y'^3 - y''^3| = |x' - x''| \text{ 或 } |y' - y''| \leq \sqrt[3]{4|x' - x''|}.$$
 对于任给的  $\epsilon > 0$ , 要  $|y' - y''| < \epsilon$ , 只要  $4|x' - x''| < \epsilon^3$ , 或  $|x' - x''| < \frac{\epsilon^3}{4}$  即可.

取  $0 < \delta < \frac{\epsilon^3}{4}$ , 则当  $|x' - x''| < \delta$  时, 恒有

$$|\sqrt[3]{x'} - \sqrt[3]{x''}| < \epsilon.$$

- (a) 当  $\epsilon = 1$  时,  $\delta < \frac{1}{4}$ ;  
(b) 当  $\epsilon = 0.1$  时,  $\delta < 2.5 \times 10^{-4}$ ;  
(c) 当  $\epsilon = 0.001$  时,  $\delta < 2.5 \times 10^{-10}$ ;  
(d) 当  $\epsilon$  为任意小数时,  $\delta < \frac{\epsilon^3}{4}$  ( $\epsilon \leq 1$ ).

787. 以《 $\epsilon - \delta$ 》的说法在肯定的意义上表达下面论断的意义:  
函数  $f(x)$  在某集合(区间, 线段) 上连续, 但在此集合上  
并不一致连续.

解 设集合为  $E$ , 所需论断的《 $\epsilon - \delta$ 》说明如下: 对于任  
给的  $\epsilon > 0$ , 及  $x_0 \in E$ , 总存在一个数  $\delta(\epsilon_0, x_0) > 0$ , 使当  
 $|x - x_0| < \delta(\epsilon, x_0)$  时, 恒有

$$|f(x) - f(x_0)| < \epsilon.$$

同时, 至少存在一个  $\epsilon_0 > 0$ , 使对于任意给定的  $\delta > 0$ , 都  
可找到  $x_1, x_2 \in E$ , 满足  $|x_1 - x_2| < \delta$ , 但是

$$|f(x_1) - f(x_2)| \geq \epsilon_0.$$

788. 证明: 函数

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

在区间  $(0, 1)$  上是连续的, 但在此区间上并非一致连续的.

证 连续性是显然的, 现证其不一致连续. 考虑  $(0, 1)$   
上的两串点

$$x_n = \frac{1}{n}, \quad x'_n = \frac{1}{n+1}.$$

则当  $0 < \epsilon_0 < 1$  时, 不论  $\delta > 0$  取得多小, 只要  $n$  取得充  
分大, 总可以使

$$|x_n - x_n'| = \frac{1}{n(n+1)} < \delta,$$

但是,

$$|f(x_n) - f(x_n')| = 1 > \epsilon_0.$$

因而,  $f(x) = \frac{1}{x}$  在  $(0, 1)$  上并非一致连续.

### 789. 证明: 函数

$$f(x) = \sin \frac{\pi}{x}$$

在区间  $(0, 1)$  上是连续的并且有界, 但在此区间上并非一致连续的.

证 当  $x \neq 0$  时, 由基本初等函数在其定义域的连续性可知,  $f(x)$  是连续的, 同时, 由于  $|f(x)| \leq 1$ , 因而它也是有界的.

现考虑  $(0, 1)$  上的两串点  $x_n = \frac{2}{n}, x_n' = \frac{2}{n+1}$ , 则当  $0 < \epsilon_0 < 1$  时, 不论  $\delta > 0$  取得多小, 只要  $n$  充分大, 总可以使

$$|x_n - x_n'| = \frac{2}{n(n+1)} < \delta,$$

但是

$$|f(x_n) - f(x_n')| = 1 > \epsilon_0.$$

因而,  $f(x)$  在  $(0, 1)$  上并非一致连续.

### 790. 证明: 函数

$$f(x) = \sin x^2$$

在无穷区间  $-\infty < x < +\infty$  上是连续的并且有界, 但在此区间上并非一致连续的.

证 函数  $f(x)$  的连续性及其有界性是显然的. 现证其

不一致连续性.

考慮 $(-\infty, +\infty)$ 上的两串点

$$x_n = \sqrt{\frac{n\pi}{2}}, \quad x_n' = \sqrt{\frac{(n+1)\pi}{2}}.$$

则当 $0 < \varepsilon_0 < 1$ 时, 不论 $\delta > 0$ 如何选取, 只要 $n$ 充分大, 总可以使

$$|x_n - x_n'| = \frac{\frac{\pi}{2}}{\sqrt{\frac{n\pi}{2}} + \sqrt{\frac{n+1}{2}\pi}} < \delta,$$

但是,

$$|f(x_n) - f(x_n')| = 1 > \varepsilon_0.$$

因而,  $f(x)$  在 $(-\infty, +\infty)$ 上并非一致连续.

791. 证明: 若函数 $f(x)$ 在域 $a \leq x < +\infty$ 上有定义并且是连续的, 而且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

存在, 则 $f(x)$ 在此域上是一致连续的.

证 任给 $\varepsilon > 0$ . 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 故必存在 $X > a$ , 使当 $x' > X, x'' > X$ 时, 恒有

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

由于 $f(x)$ 在 $[a, X+1]$ 连续, 故一致连续, 从而必有正数 $\delta'$ 存在, 使当 $x' \in [a, X+1], x'' \in [a, X+1], |x' - x''| < \delta'$ 时, 恒有

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon,$$

令 $\delta = \min\{\delta', 1\}$ . 现设 $x', x''$ 为满足 $a \leq x' < +\infty, a \leq x'' < +\infty, |x' - x''| < \delta$ 的任何两点. 由于 $|x' - x''| < \delta$ ,

$< \delta$ , 故  $x'$  与  $x''$  或同时属于  $[a, X+1]$ , 或同时满足  $x' > X, x'' > X$ . 因此, 恒有

$$|f(x') - f(x'')| < \epsilon,$$

故  $f(x)$  在  $a \leq x < +\infty$  上一致连续. 证毕.

### 792. 证明: 无界函数

$$f(x) = x + \sin x$$

于全轴  $-\infty < x < +\infty$  上一致连续.

证  $|f(x') - f(x'')| = |(x' - x'') + (\sin x' - \sin x'')|$

$$\leq |x' - x''| + |\sin x' - \sin x''| \leq 2|x' - x''|.$$

对于任给的  $\epsilon > 0$ , 取  $\delta = \frac{\epsilon}{2} > 0$ , 则当  $-\infty < x' < +\infty, -\infty < x'' < +\infty, |x' - x''| < \delta$  时, 恒有

$$|f(x') - f(x'')| < \epsilon,$$

故  $f(x)$  在  $-\infty < x < +\infty$  上一致连续.

### 793. 函数 $f(x) = x^2$ 在下列区间中是否为一致连续的: (a) $(-l, l)$ , 这里 $l$ 为随便多大的正数; (b) 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上?

解 当  $x_1, x_2 \in (-l, l)$  时,

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq 2l|x_1 - x_2|.$$

对于任给的  $\epsilon > 0$ , 取  $\delta = \frac{\epsilon}{2l}$ , 则当  $|x_1 - x_2| < \delta$ , 且  $x_1, x_2 \in (-l, l)$  时, 恒有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon,$$

故  $f(x)$  在  $(-l, l)$  上一致连续.

(b) 取  $\epsilon_0 = 1$ , 不论  $\delta > 0$  取得多小, 只要  $n$  充分大, 我们总可以使  $x'_n = n + \frac{1}{n}, x''_n = n$  的距离  $|x'_n - x''_n|$

$= \frac{1}{n} < \delta$ , 但是,

$$|f(x_n') - f(x_n'')| = 2 + \left(\frac{1}{n}\right)^2 > \epsilon_0.$$

可见  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上非一致连续.

研究下列函数在已知域上的一致连续性:

794.  $f(x) = \frac{x}{4-x^2}$  ( $-1 \leq x \leq 1$ ).

解  $|f(x_1) - f(x_2)| = \left| \frac{x_1}{4-x_1^2} - \frac{x_2}{4-x_2^2} \right|$   
 $= \left| \frac{4+x_1x_2}{(4-x_1^2)(4-x_2^2)} \right| |x_1 - x_2|.$

由于  $\left| \frac{4+x_1x_2}{(4-x_1^2)(4-x_2^2)} \right| < \frac{4+1}{3 \cdot 3} = \frac{5}{9} < 1$ ,

故对于任给的  $\epsilon > 0$ , 取  $\delta = \epsilon$ , 则对满足  $|x_1 - x_2| < \delta$  的  $x_1, x_2$  ( $x_1, x_2$  属于  $[-1, 1]$ ) 值, 均有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon.$$

因而  $f(x)$  在区间  $[-1, 1]$  上一致连续.

795.  $f(x) = \ln x$  ( $0 < x < 1$ ).

解 考虑  $x_n = \frac{1}{n}, x_n' = \frac{1}{2n}$ , 则当  $0 < \epsilon_0 < \ln 2$  时, 不论  $\delta$  如何选取, 只要  $n$  充分大, 我们总可以使

$$|x_n - x_n'| = \frac{1}{2n} < \delta,$$

但是,

$$|f(x_n) - f(x_n')| = \ln 2 > \epsilon.$$

因而  $f(x)$  在区间  $(0, 1)$  内并非一致连续.

796.  $f(x) = \frac{\sin x}{x}$  ( $0 < x < \pi$ ).

解 由于  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ , 我们定义函数

$$F(x) = \begin{cases} 1 & , x = 0, \\ \frac{\sin x}{x} & 0 < x < \pi; \\ 0 & x = \pi. \end{cases}$$

易见  $F(x)$  在  $[0, \pi]$  上连续, 根据康托尔定理便知,  $F(x)$  在  $[0, \pi]$  上一致连续, 从而  $f(x)$  也在  $(0, \pi)$  上一致连续.

797.  $f(x) = e^x \cos \frac{1}{x}$  ( $0 < x < 1$ ).

解 取  $\epsilon_0 = 1$ , 令  $x_n = \frac{2}{(2n+1)\pi}$ ,  $x_n' = \frac{1}{n\pi}$  ( $n$  为正整数), 显然  $x_n, x_n'$  均属于  $(0, 1)$ . 不论  $\delta > 0$  取得多么小, 只要  $n$  充分大, 总有

$$|x_n - x_n'| = \frac{1}{(2n+1)n\pi} < \delta,$$

但是,

$$|f(x_n) - f(x_n')| = e^{\frac{1}{n}} > 1 = \epsilon_0.$$

因而  $f(x) = e^x \cos \frac{1}{x}$  在  $(0, 1)$  上非一致连续.

798.  $f(x) = \arctan x$  ( $-\infty < x < +\infty$ ).

解 由于  $f(x)$  在区间  $(-\infty, 1], [0, +\infty)$  上连续, 且有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}, \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2},$$

由 791 题知  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  及  $(-\infty, 1]$  上均一致连续.

于是, 对于任给的  $\epsilon > 0$ , 存在  $\delta_1(\epsilon) > 0$ , 当  $x_1, x_2 \in (-\infty, 1]$ ,  $|x_1 - x_2| < \delta_1(\epsilon)$  时, 恒有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$$

成立.

又存在  $\delta_2(\epsilon) > 0$ , 当  $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ ,  $|x_1 - x_2| < \delta_2(\epsilon)$  时, 恒有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$$

成立.

今取  $\delta(\epsilon) = \min\{1, \delta_1(\epsilon), \delta_2(\epsilon)\}$ , 则当  $x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$ ,  $|x_1 - x_2| < \delta(\epsilon)$  时,  $x_1$  与  $x_2$  必或同时属于  $(-\infty, 1]$ , 或同时属于  $(0, +\infty)$ , 故恒有

$$|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon,$$

即  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致连续.

799.  $f(x) = \sqrt{x}$  ( $1 \leq x < +\infty$ ).

解 考虑  $[1, +\infty)$  内任意两点  $x_1, x_2$ .

$$\left| \sqrt{x_1} - \sqrt{x_2} \right| = \left| \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}} \right| \leq \frac{|x_1 - x_2|}{2}.$$

于是, 对于任给的  $\epsilon > 0$ , 取  $\delta = 2\epsilon$ , 则当  $|x_1 - x_2| < \delta$ ,  $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$  时, 恒有

$$\left| \sqrt{x_1} - \sqrt{x_2} \right| < \frac{1}{2} \cdot 2\epsilon = \epsilon.$$

因而  $f(x) = \sqrt{x}$  在区间  $[1, +\infty)$  上一致连续.

800.  $f(x) = x \sin x$  ( $0 \leq x < +\infty$ ).

解 考虑点  $x_n = 2n\pi + \frac{1}{n}$ ,  $x_n' = 2n\pi$ , 则

$$|x_n - x_n'| = \frac{1}{n}.$$

$$\begin{aligned} \text{而 } |f(x_n) - f(x_n')| &= \left( 2n\pi + \frac{1}{n} \right) \sin \frac{1}{n} \\ &= 2n\pi \sin \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \sin \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

由于

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{1}{n} = 0,$$

及  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2n\pi \sin \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( 2\pi \cdot \frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} \right) = 2\pi,$

所以，

$$|f(x_n) - f(x'_n)| \rightarrow 2\pi \quad (n \rightarrow \infty).$$

现取  $\epsilon_0 = 2\pi - 1$ . 于是, 不论  $\delta > 0$  取得多么小, 只要  $n$  充分大, 总有  $|x_n - x'_n| < \delta$ , 并且

$$|f(x_n) - f(x'_n)| > \epsilon_0 = 2\pi - 1.$$

因而  $f(x) = x \sin x$  在区间  $(0, +\infty)$  上非一致连续.

801. 证明: 函数  $f(x) = \frac{|\sin x|}{x}$  在每个区间

$$J_1 = (-1 < x < 0) \text{ 及 } J_2 = (0 < x < 1)$$

上是一致连续的, 但在它们的和

$$J_1 + J_2 = (0 < |x| < 1)$$

上并非一致连续的.

证 在  $J_1 = (-1 < x < 0)$  上  $f(x) = -\frac{\sin x}{x}$ , 在  $J_2 = (0 < x < 1)$  上  $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ , 它们的一致连续性由 796 题可知.

由于

$$\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow -0} f(x) = -\lim_{x \rightarrow -0} \frac{\sin x}{x} = -1,$$

故必存在  $\eta > 0 (\eta < 1)$ , 使当  $0 < x_1 < \eta, -\eta < x_2 < 0$

时恒有  $|f(x_1) - f(x_2)| > 1$ . 现取  $\epsilon_0 = 1$ , 则不论  $\delta > 0$  取得多么小, 都可取两点  $x_1'$  和  $x_2'$ , 使  $0 < x_1' < \min\{\eta, \frac{\delta}{2}\}$ ,  $-\min\{\eta, \frac{\delta}{2}\} < x_2' < 0$ . 于是  $|x_1' - x_2'| < \delta$ , 但是,

$$|f(x_1') - f(x_2')| > \epsilon_0 = 1.$$

由此可知  $f(x)$  在  $J_1 + J_2 = \{0 < |x| < 1\}$  上非一致连续.

802. 对于  $\epsilon > 0$ , 求使函数  $f(x)$  在已知区间上满足一致连续的条件的  $\delta = \delta(\epsilon)$  (任何的!) 设:

$$(a) f(x) = 5x - 3 \quad (-\infty < x < +\infty);$$

$$(b) f(x)x^2 - 2x - 1 \quad (-2 \leq x \leq 5);$$

$$(c) f(x) = \frac{1}{x} \quad (0.1 \leq x \leq 1);$$

$$(d) f(x) = \sqrt{x} \quad (0 \leq x < +\infty);$$

$$(e) f(x) = 2\sin x - \cos x \quad (-\infty < x < +\infty);$$

$$(f) f(x) = x \sin \frac{1}{x} \quad (x \neq 0) \text{ 及 } f(0) = 0 \quad (0 \leq x \leq \pi).$$

解 (a)  $|f(x_1) - f(x_2)| = 5|x_1 - x_2|$ .

只需取  $\delta = \frac{\epsilon}{5}$  即行.

$$(b) |f(x_1) - f(x_2)| = |x_1 - x_2| \cdot |x_1 + x_2 - 2|.$$

由于  $-2 \leq x \leq 5$ , 故  $|x_1 + x_2 - 2| \leq 8$ , 于是只需取  $\delta$

$= \frac{\epsilon}{8}$  即行.

$$(c) |f(x_1) - f(x_2)| = \frac{|x_1 - x_2|}{x_1 x_2} \leq \frac{|x_1 - x_2|}{0.01}.$$

只需取  $\delta = 0.01\epsilon$ .

(r) 对于  $a \geq 0, b \geq 0$ , 显然有不等式

$$\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

成立.

对于任给的  $\epsilon > 0$ , 取  $\delta = \epsilon^2$ , 则当  $|x_1 - x_2| < \delta$ ,  $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$  时,

$$\sqrt{x_1} < \sqrt{x_2 + \delta} \leq \sqrt{x_2} + \sqrt{\delta} = \sqrt{x_2} + \epsilon;$$

同理可有

$$\sqrt{x_2} < \sqrt{x_1 + \delta} \leq \sqrt{x_1} + \sqrt{\delta} = \sqrt{x_1} + \epsilon.$$

则恒有

$$|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| < \epsilon.$$

$$\begin{aligned} (\text{d}) |f(x_1) - f(x_2)| &\leq 2|\sin x_1 - \sin x_2| + |\cos x_1 - \cos x_2| \\ &\leq 2|x_1 - x_2| + \left| \left( \frac{\pi}{2} - x_1 \right) - \left( \frac{\pi}{2} - x_2 \right) \right| = 3|x_1 - x_2| \end{aligned}$$

只需取  $\delta = \frac{\epsilon}{3}$ .

(e) 任给  $\epsilon > 0$ . 当  $x_1, x_2 \in \left(\frac{\epsilon}{3}, \pi\right)$  时, 有

$$\begin{aligned} |f(x_1) - f(x_2)| &= \left| x_1 \sin \frac{1}{x_1} - x_2 \sin \frac{1}{x_2} \right| \\ &= \left| x_1 \sin \frac{1}{x_1} - x_1 \sin \frac{1}{x_2} + x_1 \sin \frac{1}{x_2} - x_2 \sin \frac{1}{x_2} \right| \\ &\leq |x_1| \cdot \left| \sin \frac{1}{x_1} - \sin \frac{1}{x_2} \right| + |x_1 - x_2| \cdot \left| \sin \frac{1}{x_2} \right| \\ &\leq |x_1| \cdot \left| \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \right| + |x_1 - x_2| \end{aligned}$$

$$= \left( \frac{1}{x_2} + 1 \right) \cdot |x_1 - x_2| \leq \frac{3 + \epsilon}{\epsilon} |x_1 - x_2|.$$

取  $\delta = \min\left\{\frac{\epsilon}{3}, \frac{\epsilon^2}{3 + \epsilon}\right\}$ . 现设  $x_1, x_2 \in [0, \pi]$  满足  $|x_1 - x_2| < \delta$ , 下证必有  $|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$ .

不妨设  $x_1 < x_2$ . 若  $x_1 \geq \frac{\epsilon}{3}$ , 则  $x_1, x_2$  均属于  $\left[\frac{\epsilon}{3}, \pi\right]$ , 故由上述, 知

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq \frac{3 + \epsilon}{\epsilon} \cdot |x_1 - x_2| < \frac{3 + \epsilon}{\epsilon} \cdot \frac{\epsilon_2}{3 + \epsilon} = \epsilon.$$

若  $0 \leq x_1 < \frac{\epsilon}{3}$ , 则  $x_2 = x_2 - x_1 + x_1 < \delta + \frac{\epsilon}{3} \leq \frac{2\epsilon}{3}$ .

于是

$$\begin{aligned} |f(x_1) - f(x_2)| &= \left| x_1 \sin \frac{1}{x_1} - x_2 \sin \frac{1}{x_2} \right| \\ &\leq |x_1| + |x_2| < \frac{\epsilon}{3} + \frac{2\epsilon}{3} = \epsilon \quad (\text{当 } x_1 > 0 \text{ 时}), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |f(x_1) - f(x_2)| &= \left| 0 - x_2 \sin \frac{1}{x_2} \right| \\ &\leq |x_2| < \frac{2\epsilon}{3} < \epsilon, \end{aligned}$$

(当  $x_1 = 0$  时)

总上述, 只要  $x_1, x_2 \in [0, \pi]$ ,  $|x_1 - x_2| < \delta$ , 就有  $|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$ .

803. 需要尽量地把闭区间  $[1, 10]$  划分为几个彼此相等的线段, 才能使得函数  $f(x) = x^2$  在这些线段中的每一段上的振幅是小于 0.0001?

解 设分为相等的  $n$  段, 则对于每段中的任意两点均有  $|x_1 - x_2| \leq \frac{9}{n}$ . 于是,

$$\begin{aligned}|x_1^2 - x_2^2| &= |x_1 + x_2||x_1 - x_2| \leq \frac{(10+10)9}{n} \\&= \frac{180}{n}.\end{aligned}$$

按题设, 我们只需  $\frac{180}{n} < 0.0001$ , 也即

$$n > 1800000.$$

因此, 应把  $(1, 10)$  等分成至少为 1800000 个的等长的线段, 就能满足要求.

804. 证明: 在区间  $(a, b)$  上有穷个一致连续函数的和与它们的乘积在此区间内仍是一致连续的.

证 由于有穷个函数相加或相乘可逐次分解成两个函数相加或相乘, 故我们只需考虑两个函数的情况.

设  $f(x)$  与  $g(x)$  都在有限区间  $(a, b)$  上一致连续, 要证  $f(x) + g(x)$  与  $f(x)g(x)$  也在  $(a, b)$  上一致连续. 任给  $\epsilon > 0$ . 由于  $f(x)$  在  $(a, b)$  上一致连续, 故有  $\delta_1 > 0$  存在, 使对于  $(a, b)$  中任何两点  $x'$  与  $x''$ , 只要  $|x' - x''| < \delta_1$ , 就有  $|f(x') - f(x'')| < \frac{\epsilon}{2}$ . 又由于  $g(x)$  在  $(a, b)$  上一致连续, 故又有  $\delta_2 > 0$  存在, 使对于  $(a, b)$  中任何两点  $x'$  与  $x''$ , 只要  $|x' - x''| < \delta_2$ , 就有  $|g(x') - g(x'')| < \frac{\epsilon}{2}$ . 令  $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ , 则当  $|x' - x''| < \delta$  ( $x', x''$  为  $(a, b)$  中任何两点) 时, 恒有

$$\begin{aligned}|[f(x') + g(x')] - [f(x'') + g(x'')]| &\leq |f(x') - f(x'')| + |g(x') - g(x'')| \\&< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.\end{aligned}$$

故  $f(x) + g(x)$  在  $(a, b)$  上一致连续. 下证  $f(x)g(x)$  在  $(a, b)$  上一致连续. 为此先证一个结论: 若函数  $F(x)$  在

有限区间  $(a, b)$  上一致连续, 则  $F(x)$  在  $(a, b)$  上必有界. 事实上, 对于任意给定的  $\epsilon > 0$ , 都有  $\delta > 0$  存在, 使对于  $(a, b)$  中任何两点  $x', x''$ , 只要  $|x' - x''| < \delta$ , 就有  $|F(x') - F(x'')| < \epsilon$ . 特别, 当  $a < x' < a + \delta, a < x'' < a + \delta$  时, 必有  $|F(x') - F(x'')| < \epsilon$ ; 当  $b - \delta < x' < b, b - \delta < x'' < b$  时, 也必有  $|F(x') - F(x'')| < \epsilon$ . 因此, 根据柯西收敛准则, 知  $F(a+0) = \lim_{x \rightarrow a+0} F(x)$  与  $F(b-0) = \lim_{x \rightarrow b-0} F(x)$  都存在(有限). 现在  $[a, b]$  上定义函数  $F^*(x)$ :

$$F^*(x) = \begin{cases} F(x), & \text{当 } a < x < b \text{ 时;} \\ F(a+0), & \text{当 } x = a \text{ 时;} \\ F(b-0), & \text{当 } x = b \text{ 时.} \end{cases}$$

显然,  $F^*(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上连续, 从而有界, 由此可知  $F(x)$  在  $(a, b)$  上有界.

根据刚才已证的结论, 存在常数  $L > 0$  与  $M > 0$ , 使  $|f(x)| \leq L, |g(x)| \leq M (a < x < b)$ . 任给  $\epsilon > 0$ , 根据  $f(x)$  与  $g(x)$  在  $(a, b)$  上的一致连续性, 可取  $\delta > 0$ , 使对于  $(a, b)$  中任何两点  $x'$  与  $x''$ , 只要  $|x' - x''| < \delta$ , 就有

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\epsilon}{2M}, |g(x') - g(x'')| < \frac{\epsilon}{2L}.$$

由此可知,

$$\begin{aligned} & |f(x')g(x') - f(x'')g(x'')| \\ &= |[f(x') - f(x'')] \\ &\quad g(x') + f(x'')[g(x') - g(x'')]| \\ &< \frac{\epsilon}{2M} \cdot M + \frac{\epsilon}{2L} \cdot L = \epsilon. \end{aligned}$$

故得知  $f(x)g(x)$  在  $(a, b)$  上一致连续.

注. 当  $(a, b)$  是无穷区间时,  $(a, b)$  上一致连续函数  $f(x)$  与  $g(x)$  的和  $f(x) + g(x)$  必也一致连续, 但乘积  $f(x)g(x)$  不一定一致连续. 例如, 设  $(a, b) = (-\infty, +\infty)$ , 函数  $f(x) = x$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致连续, 则函数  $[f(x)]^2 = x^2$  在  $(-\infty, +\infty)$  上不一致连续(参看 793 题(6)).

805. 证明: 若单调有界的函数  $f(x)$  在有穷或无穷的区间  $(a, b)$  上是连续的, 则此函数在区间  $(a, b)$  上是一致连续的.

证 分三种情形论之.

(i) 设  $(a, b)$  是有限区间. 由于  $f(x)$  在  $(a, b)$  上单调有界, 故极限  $f(a+0) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$  与  $f(b-0) = \lim_{x \rightarrow b-0} f(x)$  都存在(有限). 按下式定义  $[a, b]$  上的函数  $f^*(x)$ :

$$f^*(x) = \begin{cases} f(x), & \text{当 } a < x < b \text{ 时;} \\ f(a+0), & \text{当 } x = a \text{ 时;} \\ f(b-0), & \text{当 } x = b \text{ 时.} \end{cases}$$

显然  $f^*(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 从而一致连续, 当然在  $(a, b)$  上也一致连续, 故  $f(x)$  在  $(a, b)$  上一致连续.

(ii)  $a$  为有限数,  $b = +\infty$ . 此时, 令

$$f^*(x) = \begin{cases} f(x), & \text{当 } a < x < +\infty \text{ 时;} \\ f(a+0), & \text{当 } x = a \text{ 时.} \end{cases}$$

则  $f^*(x)$  在  $a \leq x < +\infty$  上连续, 且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^*(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  存在(有限), 故根据 791 题的结果知  $f^*(x)$  在  $a \leq x < +\infty$  一致连续, 从而  $f(x)$  在  $a < x < +\infty$  一致连续.

若  $a = -\infty$ ,  $b$  为有限数. 考虑函数  $g(x) = f(-x)$ ,  
 $(-b < x < +\infty)$  即化成刚才证明了的左端点是有限数  
右端点是  $+\infty$  的情形.

(iii)  $a = -\infty$ ,  $b = +\infty$ . 任给  $\epsilon > 0$ . 利用(ii) 已证的结果,  
 $f(x)$  在  $0 < x < +\infty$  上一致连续, 故存在  $\delta_1 > 0$ , 使  
当  $x'$  与  $x''$  都属于  $(0, +\infty)$  且  $|x' - x''| < \delta_1$  时, 恒有  
 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$ .

同样利用(ii) 已证的结果,  $f(x)$  在  $-\infty < x < 1$  上一致  
连续, 故对于同一个  $\epsilon$ , 存在  $\delta_2 > 0$ , 使当  $x'$  与  $x''$  都属于  
 $(-\infty, 1)$  且  $|x' - x''| < \delta_2$  时, 恒有

$$|f(x') - f(x'')| < \epsilon.$$

现令  $\delta = \min\{1, \delta_1, \delta_2\}$ , 则当  $-\infty < x' < +\infty$ ,  $-\infty < x'' < +\infty$ ,  $|x' - x''| < \delta$  时,  $x'$  与  $x''$  必或是同属于  
区间  $(0, +\infty)$ , 或是同属于区间  $(-\infty, 1)$ . 因此, 恒有

$$|f(x') - f(x'')| < \epsilon.$$

由此可知,  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致连续. 证毕.

**806. 证明:** 在有穷区间  $(a, b)$  上有定义而且是连续的函数  
 $f(x)$ , 可用连续的方法延拓到闭区间  $[a, b]$  上, 其必要且  
充分的条件是函数  $f(x)$  在区间  $(a, b)$  上是一致连续的.

**证** 必要性: 若  $f(x)$  可用连续的方法延拓到闭区间  $[a, b]$  上, 则  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 从而一致连续, 当然在  
 $(a, b)$  上也是一致连续的.

充分性: 若  $f(x)$  在  $(a, b)$  上一致连续. 根据 804 题的  
证明过程, 知  $f(a+0) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$  与  $f(b-0) =$   
 $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x)$  都存在(有限). 按下式定义  $[a, b]$  上的函数:

$$f^*(x) = \begin{cases} f(x), & \text{当 } a < x < b \text{ 时;} \\ f(a+0), & \text{当 } x = a \text{ 时;} \\ f(b-0), & \text{当 } x = b \text{ 时.} \end{cases}$$

显然,  $f^*(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  上  $f^*(x) \equiv f(x)$ . 故  $f^*(x)$  是  $f(x)$  在  $[a, b]$  上的连续延拓. 证毕.

### 807. 函数

$$\omega_f(\delta) = \sup |f(x_1) - f(x_2)|$$

(式中  $x_1$  和  $x_2$  为  $(a, b)$  中受条件  $|x_1 - x_2| \leq \delta$  限制的任意两点) 称为函数  $f(x)$  在区间  $(a, b)$  上的连续模数.

证明: 函数  $f(x)$  在区间  $(a, b)$  上是一致连续的必要且充分的条件是

$$\lim_{\delta \rightarrow +0} \omega_f(\delta) = 0.$$

证 必要性: 设  $f(x)$  在  $(a, b)$  一致连续. 任给  $\epsilon > 0$ , 存在  $\delta' > 0$ , 使  $(a, b)$  中任何两点  $x_1, x_2$ , 只要  $|x_1 - x_2| < \delta'$  就有  $|f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\epsilon}{2}$ . 现设  $0 < \delta < \delta'$ , 则当  $|x_1 - x_2| \leq \delta$  时, 必  $|f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\epsilon}{2}$ , 从而

$$\omega_f(\delta) = \sup |f(x_1) - f(x_2)| \leq \frac{\epsilon}{2} < \epsilon.$$

由此可知,  $\lim_{\delta \rightarrow +0} \omega_f(\delta) = 0$ .

充分性: 设

$$\lim_{\delta \rightarrow +0} \omega_f(\delta) = 0.$$

任给  $\epsilon > 0$ , 存在  $\delta' > 0$ , 使当  $0 < \delta < \delta'$  时, 恒有

$$\omega_f(\delta) < \epsilon.$$

现设  $x_1$  与  $x_2$  是  $(a, b)$  中满足  $|x_1 - x_2| < \delta'$  的任何两点.

若  $x_1 = x_2$ , 则显然

$$|f(x_1) - f(x_2)| = 0 < \epsilon;$$

若  $x_1 \neq x_2$ . 令  $|x_1 - x_2| = \delta'$ , 则  $0 < \delta^* < \delta'$ , 于是

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq \omega_f(\delta^*) < \epsilon.$$

由此可知,  $f(x)$  在  $(a, b)$  内一致连续. 证毕.

808. 设:

(a)  $f(x) = x^3 (0 \leq x \leq 1)$ ;

(b)  $f(x) = \sqrt{x} (0 \leq x < a)$  及  $(a < x < +\infty)$ ;

(c)  $f(x) = \sin x + \cos x (0 \leq x \leq 2\pi)$ .

对函数  $f(x)$  的连续模数  $\omega_f(\delta)$  (参阅前题) 作下形的估价

$$\omega_f(\delta) \leq C\delta^\alpha,$$

式中  $C$  和  $\alpha$  为常数.

解 (a)  $|x_1^3 - x_2^3| = |x_1 - x_2| |x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2| \leq 3\delta$ ,

于是,

$$\omega_f(\delta) \leq 3\delta.$$

(b) 当  $0 \leq x \leq a$  时 [参看 802 题(r) 的证明过程]

$$|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| \leq \sqrt{|x_1 - x_2|} \leq \sqrt{\delta},$$

于是,

$$\omega_f(\delta) \leq \sqrt{\delta},$$

当  $a < x < +\infty$  时

$$|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| = \frac{|x_1 - x_2|}{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}} \leq \frac{\delta}{2\sqrt{a}},$$

于是,

$$\omega_f(\delta) \leq \frac{\delta}{2\sqrt{a}}.$$

$$\begin{aligned}
 \text{(B)} f(x) &= \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right), \\
 \text{故 } &\left| \sqrt{2} \sin\left(x_1 + \frac{\pi}{4}\right) - \sqrt{2} \sin\left(x_2 + \frac{\pi}{4}\right) \right| \\
 &= \sqrt{2} \cdot 2 \left| \cos \frac{x_1 + x_2 + \frac{\pi}{2}}{2} \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \right| \\
 &\leq \sqrt{2} \cdot 2 \cdot \frac{|x_1 - x_2|}{2} = \sqrt{2} \delta,
 \end{aligned}$$

于是

$$\omega_f(\delta) \leq \sqrt{2} \delta.$$

## § 10. 函数方程

809. 证明: 对于  $x$  和  $y$  的一切实数值满足方程

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \quad (1)$$

的唯一的连续函数  $f(x)$  ( $-\infty < x < +\infty$ ) 是齐次线性函数:

$$f(x) = ax,$$

式中  $a = f(1)$  是任意的常数.

证 先证: 若  $f(x)$  满足(1), 则对任何有理数  $c$ , 必有

$$f(cx) = cf(x) \quad (-\infty < x < +\infty).$$

事实上, 当  $m$  与  $n$  为正整数时, 有

$$f(mx) = f(x + (m-1)x) = f(x) + f((m-1)x)$$

$$= f(x) + f(x) + f((m-2)x) = \cdots$$

$$= f(x) + f(x) + \cdots + f(x) = mf(x);$$

$$f(x) = f\left(n \cdot \frac{x}{n}\right) = nf\left(\frac{x}{n}\right), \text{ 故 } f\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{1}{n}f(x).$$

于是

$$f\left(\frac{m}{n}x\right) = mf\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{m}{n}f(x).$$

又在(1)中令 $y=0$ ,得 $f(x)=f(x)+f(0)$ ,故 $f(0)=0$ ;又在(1)中令 $y=-x$ ,并注意已证的结果 $f(0)=0$ ,得 $f(-x)=-f(x)$ .

于是

$$f\left(-\frac{m}{n}x\right) = -f\left(\frac{m}{n}x\right) = -\frac{m}{n}f(x).$$

故对任何有理数 $c$ ,有 $f(cx)=cf(x)(-\infty < x < +\infty)$ .下面,我们利用 $f(x)$ 的连续性证明对任何无理数 $c$ ,此式也成立.事实上,设 $c$ 为无理数.取一串有理数 $c_n$ ,使 $c_n \rightarrow c(n \rightarrow \infty)$ .于是

$$f(C_n x) = C_n f(x), (n = 1, 2, \dots).$$

在此式两端令 $n \rightarrow \infty$ 取极限,并注意到函数 $f$ 在点 $cx$ 连续,即得 $f(cx)=cf(x)$ .于是,对任何实数 $x$ 和 $c$ ,有 $f(cx)=cf(x)$ .由此可知,对任何实数 $x$ ,有

$$f(x) = f(x+1) = xf(1) = ax,$$

其中 $a=f(1)$ .证毕.

810. 证明:满足方程(1)的单调函数 $f(x)$ 是齐次线性的.

证 由809题之证明过程,知:对任何有理数 $c$ ,有

$$f(cx) = cf(x) \quad (-\infty < x < +\infty).$$

下面,我们利用 $f(x)$ 的单调性证明此式对任何无理数 $c$ 成立.为确定起见,设 $f(x)$ 是单调递增的,设 $c$ 是无理数,要证 $f(cx)=cf(x)(-\infty < x < +\infty)$ .只就 $x > 0$ 讨论之( $x \leq 0$ 时可类似讨论).取两串有理数 $\{c_n\}$

与  $\{c_n'\}$  使：

$$c_1 < c_2 < c_3 < \cdots < c < \cdots < c_3' < c_2' < c_1',$$

并且  $c_n \rightarrow c, c_n' \rightarrow c (n \rightarrow \infty)$ . 由于  $x > 0$ , 故

$$c_1 x < c_2 x < c_3 x < \cdots < cx < \cdots < c_3' x < c_2' x < c_1' x,$$

并且  $c_n x \rightarrow cx, c_n' x \rightarrow cx (n \rightarrow \infty)$ . 另外, 我们有

$$f(c_n x) = c_n x, f(c_n' x) = c_n' x (n = 1, 2, \dots).$$

由于  $f(x)$  是单调递增的, 故在点  $cx$  的左、右极限均存在有限, 并且满足

$$f(cx - 0) \leq f(cx) \leq f(cx + 0).$$

在前面两个等式中令  $n \rightarrow \infty$  取极限, 得

$$f(cx - 0) = cx, \quad f(cx + 0) = cx.$$

由此可知  $f(cx) = cx$ .

以下证明同 809 题, 不再重复.

811. 证明: 满足方程(1) 且在某小区间  $(-\epsilon, \epsilon)$  中为有界的函数  $f(x)$ , 是线性齐次函数.

证 由 809 题的证明过程, 知: 对任何有理数  $c$ , 有

$$f(cx) = cf(x) (-\infty < x < +\infty).$$

下面, 我们利用  $f(x)$  在  $(-\epsilon, \epsilon)$  中的有界性来证明对于任何无理数  $c$ , 此式也成立. 用反证法, 假定对于某无理数  $c_0$  以及某实数  $x_0$ , 有  $f(c_0 x_0) \neq c_0 f(x_0)$ . 令  $f(c_0 x_0) - c_0 f(x_0) = \alpha$ , 则  $\alpha \neq 0$ . 今取一串有理数  $\{c_n\}$ , 使  $c_n \rightarrow c_0 (n \rightarrow \infty)$ . 于是, 对于任何正整数  $m$ , 有

$$\begin{aligned} f[m(c_0 - c_n)x_0] &= mf[(c_0 - c_n)x_0] \\ &= m[f(c_0 x_0) - f(c_n x_0)] \\ &= m(c_0 - c_n)f(x_0) + m\alpha, \\ &\quad (n = 1, 2, 3, \dots; m = 1, 2, 3, \dots). \end{aligned}$$

任给  $G > 0$ . 先取定一个正整数  $m$ , 使  $m > \frac{2G}{|\alpha|}$ . 对此  $m$ ,  
再取定一个正整数  $n$ , 使

$$|m(c_0 - c_n)x_0| < \epsilon, |m(c_0 - c_n)f(x_0)| < G.$$

令  $\bar{x} = m(c_0 - c_n)x_0$ . 于是  $\bar{x} \in (-\epsilon, \epsilon)$ , 并且

$$|f(\bar{x})| \geq |m\alpha| - |m(c_0 - c_n)f(x_0)| > 2G - G = G.$$

由所给  $G > 0$  的任意性, 即知  $f(x)$  在  $(-\epsilon, \epsilon)$  无界, 此与假定矛盾. 于是, 对任何无理数  $c$ , 也有

$$f(cx) = cf(x).$$

以下证明同 809 题, 不再重复.

812. 证明: 对  $x$  和  $y$  的一切值满足方程

$$f(x+y) = f(x)f(y) \quad (2)$$

的唯一不恒等于零的连续函数  $f(x)$  ( $-\infty < x < +\infty$ )  
是指数函数:

$$f(x) = a^x,$$

式中  $a = f(1)$  为正的常数.

**证** 先证必  $f(x) > 0$  ( $-\infty < x < +\infty$ ). 事实上, 由  $f(x) = f\left(\frac{x}{2} + \frac{x}{2}\right) = \left[f\left(\frac{x}{2}\right)\right]^2$ , 知  $f(x) \geq 0$ . 由于  $f(x) \not\equiv 0$ , 故存在  $x_0$  使  $f(x_0) > 0$ . 在(2) 中令  $x = x_0, y = 0$ , 得  $f(x_0) = f(x_0)f(0)$ , 故  $f(0) = 1$ ; 又在(2) 中令  $y = -x$ , 得  $1 = f(0) = f(x)f(-x)$ , 故  $f(x) \neq 0$ , 由此可知  $f(x) > 0$  ( $-\infty < x < +\infty$ ).

当  $m$  与  $n$  为正整数时,

$$\begin{aligned} f(mx) &= f((m-1)x+x) = f((m-1)x) \cdot f(x) \\ &= f((m-2)x) \cdot f(x) \cdot f(x) = \cdots = [f(x)]^m; \\ f(x) &= f\left(n \cdot \frac{x}{n}\right) = \left[f\left(\frac{x}{n}\right)\right]^n, \text{ 即 } f\left(\frac{x}{n}\right) = \end{aligned}$$

$$[f(x)]^{\frac{1}{n}},$$

于是

$$f\left(\frac{m}{n}x\right) = \left(f\left(\frac{x}{n}\right)\right)^m = [f(x)]^{\frac{m}{n}}.$$

又有

$$f\left(-\frac{m}{n}x\right) = [f(-x)]^{\frac{m}{n}} = [f(x)]^{-\frac{m}{n}}.$$

由此可知, 对任何有理数  $c$ , 有

$$f(cx) = [f(x)]^c (-\infty < x < +\infty).$$

根据  $f(x)$  的连续性, 仿 809 之证易知此式对任何无理数也成立. 因此, 对于任何实数  $c$  与  $x$ , 有

$$f(cx) = [f(x)]^c,$$

从而  $f(x) = f(x+1) = [f(1)]^x = a^x$ ,  $a = f(1) > 0$ .

注. 也可利用 809 题的结果来证. 前面已证  $f(x) > 0$  ( $-\infty < x < +\infty$ ). 令  $F(x) = \log_a f(x)$ , 这里  $a = f(1) > 0$ . 于是  $F(x)$  是  $-\infty < x < +\infty$  上的连续函数, 满足(1) 式:

$$\begin{aligned} F(x+y) &= \log_a f(x+y) = \log_a f(x)f(y) \\ &= \log_a f(x) + \log_a f(y) = F(x) + F(y). \end{aligned}$$

故由 809 题的结果, 知  $F(x) = a^* x$ , 这里

$a^* = F(1) = \log_a f(1) = \log_a a = 1$ , 从而  $F(x) = x$ . 由此可知  $f(x) = a^x$ .

813. 证明: 在区间  $(0, \epsilon)$  中有界并满足方程(2)的不恒等于零的函数  $f(x)$  是指数函数.

证 由 812 的证明知:  $f(x) > 0$  ( $-\infty < x < +\infty$ ), 并且对任何有理数  $c$ , 有  $f(cx) = [f(x)]^c$ .

下证对任何无理数  $c$ , 也有

$$f(cx) = [f(x)]^c \quad (-\infty < x < +\infty).$$

用反证法. 假定对某无理数  $c_0$ , 及某实数  $x_0$ , 有  $f(c_0x_0) \neq [f(x_0)]^{c_0}$ . 显然  $x_0 \neq 0$  (因为  $f(0) = 1$ ). 不妨设  $x_0 > 0$ . 我们有  $f(c_0x_0) = \beta[f(x_0)]^{c_0}$ ,  $\beta > 0$ ,  $\beta \neq 1$ . 不妨设  $\beta > 1$ . 取一串有理数  $c_n$ , 使  $c_1 < c_2 < c_3 < \dots < c_n$ , 且  $c_n \rightarrow c_0$  ( $n \rightarrow \infty$ ). 于是, 对任何正整数  $m$ , 有

$$\begin{aligned} f[m(c_0 - c_n)x_0] &= \{f[(c_0 - c_n)x_0]\}^m \\ &= f(c_0x_0)^m \cdot f(-c_nx_0)^m = \beta^m \cdot [f(x_0)]^{m(c_0 - c_n)}. \end{aligned}$$

现任给  $G > 0$ . 先取定一个正整数  $m$ , 使  $\beta^m > 2G$ . 然后, 再取一个  $n$ , 使

$$0 < m(c_0 - c_n)x_0 < \varepsilon, [f(x_0)]^{m(c_0 - c_n)} > \frac{1}{2}.$$

于是, 令  $\bar{x} = m(c_0 - c_n)x_0$ , 则  $\bar{x} \in (0, \varepsilon)$ , 且  $f(\bar{x}) > 2G \cdot \frac{1}{2} = G$ , 故  $f(x)$  在  $(0, \varepsilon)$  无界, 此与假定矛盾. 注意, 若  $\beta < 1$ , 则需取  $c_1 > c_2 > c_3 > \dots > c_n$ ,  $c_n \rightarrow c$  并考虑  $f[-m(c_0 - c_n)x_0] = \beta^{-m}[f(x_0)]^{-m(c_0 - c_n)}$ . 由此可知, 对任何无理数  $c$ ,  $f(cx) = [f(x)]^c$  也成立.

以下证明同于 812 题, 不再重复.

814. 证明: 对于  $x$  和  $y$  的一切正值满足方程

$$f(xy) = f(x) + f(y)$$

的唯一不恒等于零的连续函数  $f(x)$  ( $0 < x < +\infty$ ) 是对数函数:

$$f(x) = \log_a x,$$

式中  $a$  为正的常数.

证 在  $f(xy) = f(x) + f(y)$  中令  $y = 1$ , 得  $f(1) = 0$ .

由于  $f(x) \not\equiv 0$ , 故存在  $x_0 > 0$  使  $f(x_0) \neq 0$ . 先设  $f(x_0) > 0$ .

由于  $f(x_0^2) = f(x_0) + f(x_0) = 2f(x_0)$ ,  $f(x_0^4) = 2f(x_0^2) = 4f(x_0)$ , ..., 利用归纳法, 易知  $f(x_0^{2^n}) = 2^n f(x_0) \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$ . 故可取某正整数  $n$ , 使  $f(x_0^{2^n}) > 1$ . 于是, 根据连续函数性质知, 在 1 与  $x_0^{2^n}$  之间必存在某  $a$  (显然  $a > 0$ ) 使  $f(a) = 1$ . 现考虑函数  $F(x) = f(a^x) (-\infty < x < +\infty)$ . 显然  $F(x)$  连续且满足(1)式:

$$\begin{aligned} F(x+y) &= f(a^{x+y}) = f(a^x \cdot a^y) = f(a^x) + f(a^y) \\ &= F(x) + F(y) \end{aligned}$$

于是, 根据 809 题的结果知  $F(x) = a^x x (-\infty < x < +\infty)$ , 其中  $a^* = F(1) = f(a) = 1$ . 于是  $F(x) = x$ , 即

$$f(a^x) = x;$$

令  $a^x = y$ , 则  $x = \log_a y$ , 于是

$$f(y) = \log_a y (0 < y < +\infty).$$

若  $f(x_0) < 0$ , 则可考虑函数  $g(x) = -f(x)$ .

于是  $g(x_0) > 0$  且  $g(x)$  也满足  $g(xy) = g(x) + g(y)$ , 故根据刚才已证的结果, 知  $g(y) = \log_a y (0 < y < +\infty)$ , 其中  $a > 0$ . 即  $-f(y) = \log_a y$ , 或  $f(y) = -\log_a y$ .

令  $a^* = \frac{1}{a}$ , 则  $a^* > 0$  且  $-\log_a y = \log_{a^*} y$ , 故

$$f(y) = \log_{a^*} y (0 < y < +\infty),$$

其中  $a^* > 0$ . 证毕.

815. 证明: 对于  $x$  和  $y$  的一切正值满足方程

$$f(xy) = f(x)f(y) \quad (3)$$

的唯一不恒等于零的连续函数  $f(x) (0 < x < +\infty)$  是

幂函数：

$$f(x) = x^a,$$

式中  $a$  为常数.

证 考察函数  $F(x) = f(e^x)$  ( $-\infty < x < +\infty$ ), 则  $F(x)$  在  $-\infty < x < +\infty$  连续不恒为零, 且满足(2)式:

$$\begin{aligned} F(x+y) &= f(e^{x+y}) = f(e^x \cdot e^y) = f(e^x)f(e^y) \\ &= F(x)F(y). \end{aligned}$$

于是, 根据 812 题的结果知

$$F(x) = b^x \quad (-\infty < x < +\infty),$$

其中  $b > 0$ , 即  $f(e^x) = b^x$  ( $-\infty < x < +\infty$ ).

令  $e^x = y$ , 则  $y > 0$ ; 显然, 存在唯一的  $a$  ( $-\infty < a < +\infty$ ), 使  $e^a = b$ . 于是

$$f(y) = b^x = e^{ax} = y^a \quad (0 < y < +\infty).$$

证毕.

816. 求对于  $x$  和  $y$  的一切实数值满足方程(3)的一切连续函数  $f(x)$  ( $-\infty < x < +\infty$ ).

证 因为  $f(xy) = f(x)f(y)$ , 所以  $f(1) = f(1)f(1)$ , 于是  $f(1) = 0$  或  $f(1) = 1$ .

当  $f(1) = 0$  时, 对于任意实数  $x$ , 均有

$$f(x) = f(1)f(x) \equiv 0.$$

当  $f(1) = 1$  时, 由于  $f(1) = f((-1) \cdot (-1)) = f(-1)f(-1) = 1$ , 所以  $f(-1) = \pm 1$ . 下面分两种情况讨论:

1° 当  $f(-1) = 1$  时, 由于

$$f(-x) = f(-1)f(x) = f(x),$$

所以在这种情形下就可把问题归结为对  $0 < x < +\infty$  中

的  $x$  进行讨论. 而对于  $x > 0$ , 我们已证得  $f(x) = x^a$ , 式中  $a$  为常数<sup>1)</sup>. 然后再利用  $f(-x) = f(x)$ , 即得

$$f(x) = |x|^a.$$

为保证  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  中连续, 需  $a \geq 0$ .

2° 当  $f(-1) = -1$  时, 同 1° 可得

$$f(x) = \operatorname{sgn} x \cdot |x|^a \quad (a \geq 0).$$

综上所述, 所求的函数为(1)  $f(x) \equiv 0$ ; 或(2)  $f(x) = |x|^a$  ( $a \geq 0$ ); 或(3)  $f(x) = \operatorname{sgn} x \cdot |x|^a$  ( $a \geq 0$ ).

\* ) 利用 815 题的结果.

### 817. 证明: 不连续函数

$$f(x) = \operatorname{sgn} x$$

满足方程(3).

证 由  $f(x) = \operatorname{sgn} x$  知,  $f(xy) = \operatorname{sgn}(xy)$ .

分三种情况讨论:

1° 当  $xy > 0$  时,  $x$  与  $y$  同号, 此时

$$\operatorname{sgn}(xy) = \operatorname{sgn} x \cdot \operatorname{sgn} y = 1;$$

2° 当  $xy < 0$  时,  $x$  与  $y$  异号, 此时

$$\operatorname{sgn}(xy) = \operatorname{sgn} x \cdot \operatorname{sgn} y = -1;$$

3° 当  $xy = 0$  时, 在实数域内,  $x$  与  $y$  中至少有一个为 0, 于是

$$\operatorname{sgn}(xy) = \operatorname{sgn} x \cdot \operatorname{sgn} y = 0.$$

总之, 不论哪一种情形, 均有

$$\operatorname{sgn}(xy) = \operatorname{sgn} x \cdot \operatorname{sgn} y,$$

也即函数  $f(x) = \operatorname{sgn} x$  满足方程

$$f(xy) = f(x)f(y).$$

### 818. 求对于 $x$ 和 $y$ 的一切实数值满足方程

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y)$$

的一切连续函数  $f(x)$  ( $-\infty < x < +\infty$ ).

解 显见函数

$$f(x) = \cos ax \text{ 或 } f(x) = \cosh ax$$

满足所给方程. 下面我们将指出满足所给方程的函数具有上述形式. 为此, 在方程中令  $y = 0$ , 得

$$2f(x) = 2f(x)f(0),$$

则当  $f(x) \neq 0$  时  $f(0) = 1$ . 又令  $x = 0$  得

$$f(y) + f(-y) = 2f(y),$$

所以

$$f(-y) = f(y).$$

由  $f(x)$  的连续性, 故知存在  $c > 0$ , 使当  $x \in [0, c]$  时,  $f(x) > 0$ . 设  $f(c) = a$ . 下面分两种情况讨论:

1° 当  $0 < a \leqslant 1$  时,

于是存在  $\theta$ :  $0 \leqslant \theta < \frac{\pi}{2}$ , 使得

$$f(c) = \cos \theta. \quad (1')$$

从而

$$\begin{aligned} f(2c) &= 2[f(c)]^2 - f(0) = 2\cos^2 \theta - 1 = \cos 2\theta, \\ f(3c) &= 2f(2c)f(c) - f(c) = 2\cos 2\theta \cos \theta - \cos \theta \\ &= \cos 3\theta. \end{aligned}$$

利用数学归纳法易证, 对于一切正整数  $n$ , 均有

$$f(nc) = \cos n\theta. \quad (2')$$

又

$$\left[ f\left(\frac{1}{2}c\right) \right]^2 = \frac{1}{2}(f(0) + f(c)) = \frac{1}{2}(1 + \cos \theta)$$

$$= \cos^2 \frac{\theta}{2},$$

由于  $f(x) > 0$ , 故取正根, 则得

$$f\left(\frac{1}{2}c\right) = \cos \frac{\theta}{2}. \quad (3')$$

同样, 利用数学归纳法可得, 对于一切正整数  $n$ , 均有

$$f\left(\frac{1}{2^n}c\right) = \cos\left(\frac{1}{2^n}\theta\right). \quad (4')$$

重复应用(1')到(2')的推理过程于(4'), 可知对于一切正整数  $m$ , 均有

$$f\left(\frac{m}{2^n}c\right) = \cos\left(\frac{m}{2^n}\theta\right). \quad (5')$$

因此, 对于  $\frac{m}{2^n}$  型的正实数  $x_n$ , 有

$$f(cx_n) = \cos(\theta x_n).$$

又因任一正实数  $x$  皆可表成  $\frac{m}{2^n}$  型数列的极限, 所以利用极限过程易得

$$f(cx) = \cos(\theta x) \quad (6')$$

由于  $f(-y) = f(y)$ , 故(6')式对  $x < 0$  也成立. 至于当  $x = 0$  时,  $f(cx) = \cos(\theta x)$  显然成立. 因此, 对于  $-\infty < x < +\infty$  的一切实数, 均有

$f(cx) = \cos(\theta x)$ . 把  $cx$  换成  $x$ , 并令  $\frac{\theta}{c} = a$ , 则得

$$f(x) = \cos ax.$$

2° 当  $a > 1$  时, 于是存在这样的  $\theta$ , 使得

$$f(c) = a = \operatorname{ch}\theta.$$

根据双曲余弦的关系式, 再重复上面的推理过程, 可得

$$f(x) = \operatorname{ch} ax.$$

当  $a = 0$  时,  $f(x) \equiv 1$ .

综上所述, 所求的函数为

$$f(x) = \cos ax \text{ 或 } f(x) = \operatorname{ch} ax.$$

819. 求对于  $x$  和  $y$  的一切实数值满足方程组:

$$f(x+y) = f(x)f(y) - g(x)g(y)$$

$$g(x+y) = f(x)g(y) + f(y)g(x)$$

及

$$f(0) = 1 \text{ 和 } g(0) = 0$$

的一切有界连续函数  $f(x)$  和  $g(x)$  ( $-\infty < x < +\infty$ ).

解 考虑函数

$$F(x) = f^2(x) + g^2(x),$$

则

$$\begin{aligned} F(x+y) &= f^2(x+y) + g^2(x+y) = [f(x)f(y) \\ &\quad - g(x)g(y)]^2 + [f(x)g(y) + f(y)g(x)]^2 \\ &= F(x)F(y), \end{aligned}$$

由于  $F(0) = 1$  及  $F(x) \neq 0$ , 故

$$F(x) = a^x \quad (-\infty < x < +\infty),$$

式中  $a = F(1)$  为正的常数<sup>1)</sup>.

由于  $f(x)$  及  $g(x)$  有界, 故只能有  $a = 1$ . 因此, 对于一切实数  $x$ , 有  $f^2(x) + g^2(x) = 1$ .

因为

$$0 = g(0) = g(x-x) = f(x)g(-x) + f(-x)g(x)$$

及

$$\begin{aligned} 1 &= f(0) = f(x-x) \\ &= f(x)f(-x) - g(-x)g(x). \end{aligned}$$

上面二式分别乘以  $g(-x)$  及  $f(-x)$ , 然后相加, 得  
 $f(-x) = f(x) \cdot [f^2(-x) + g^2(-x)] = f(x)$ ;  
 如果上面二式分别乘以  $f(-x)$  及  $g(-x)$ , 然后相减, 得  
 $g(-x) = -g(x)[g^2(-x) + f^2(-x)] = -g(x)$ .  
 从而可得

$$\begin{aligned} f(x+y) + f(x-y) &= f(x)f(y) - g(x)g(y) \\ &\quad + f(x)f(-y) - g(x)g(-y) = 2f(x)f(y). \end{aligned}$$

于是, 考虑到  $f(x)$  的有界性, 可得

$$f(x) = \cos ax^{*)},$$

再由  $f^2(x) + g^2(x) = 1$  可得

$$g(x) = \pm \sin ax,$$

\* ) 利用 812 题的结果.

\*\*) 利用 818 题的结果.

820. 设

$$\Delta f(x) = f(x + \Delta x) - f(x)$$

及

$$\Delta^2 f(x) = \Delta(\Delta f(x))$$

分别为函数  $f(x)$  的一阶、二阶有限差.

证明: 若函数  $f(x)$  ( $-\infty < x < +\infty$ ) 是连续的且

$$\Delta^2 f(x) \equiv 0,$$

则此函数是线性函数, 即

$$f(x) = ax + b,$$

式中  $a$  和  $b$  为常数.

证 由  $\Delta^2 f(x) \equiv 0$  得

$$\begin{aligned} f(x + \Delta_1 x + \Delta_2 x) - f(x + \Delta_2 x) \\ \equiv f(x + \Delta_1 x) - f(x). \end{aligned}$$

令  $x = 0$ , 得

$$f(\angle_1 + \angle_2) - f(\angle_2) \equiv f(\angle_1) - f(0).$$

令  $\angle_2 = n\angle_1$ , 得

$$f((n+1)\angle_1) - f(n\angle_1) \equiv f(\angle_1) - f(0).$$

利用数学归纳法, 可得

$$f((n+1)\angle_1) - f(0) \equiv (n+1)[f(\angle_1) - f(0)]. \quad (1')$$

关系式(1')可写成

$$f(\angle_1) - f(0) = \frac{1}{n}[f(n\angle_1) - f(0)].$$

在上式中令  $n\angle_1 = m$ , 再利用(1')即得

$$f\left(\frac{m}{n}\right) - f(0) = \frac{m}{n}[f(1) - f(0)],$$

所以

$$f\left(\frac{m}{n}\right) = a \cdot \frac{m}{n} + b,$$

式中  $a = f(1) - f(0)$  及  $b = f(0)$  均为常数.

于是, 对于有理数  $x$ , 均有

$$f(x) = ax + b.$$

对于无理数  $x$ , 利用  $f(x)$  的连续性, 即可证得上式仍成立. 事实上, 取有理数列  $x_n \rightarrow x$ , 则

$$\lim_{x_n \rightarrow x} f(x_n) = f(x).$$

另一方面

$$\lim_{x_n \rightarrow x} f(x_n) = \lim_{x_n \rightarrow x} (ax_n + b) = ax + b.$$

因此, 对于一切实数  $x$ , 均有

$$f(x) = ax + b.$$